

6-2 배변 이상(설사)

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
설사가 시작된 시점을 확인하였다.			
설사의 양과 횟수에 대해서 질문하였다.			
설사의 성상(지방변 / 점액질 / 수양성 / 혈액성)에 대해서 질문하였다.			
평소 배변 습관에 대해서 질문하였다.			
탈수 정도를 확인하였다(목마름, 소변량 감소, 어지럼).			
전신 증상에 대해서 질문하였다(발열, 오한, 체중 감소).			
소화기 증상에 대해서 질문하였다(복통, 구토, 혈변, 변비, 복부 팽만).			
내분비계 증상을 확인하였다(두근거림, 더위불내성).			
최근 평소와 다른 음식을 섭취한 적이 있는지 확인하였다.			
스트레스 및 식사와 설사와의 관련성에 대해서 물어보았다.			
유제품 섭취 후 반응에 대해서 물어보았다.			
항문 증상(배변통, 덩이)에 대해서 물어보았다.			
병력 청취(기본)	예	아니오	
현재 복용 중인 약물에 대해서 확인하였다(제산제, 항생제).			
음주력(양과 횟수)과 흡연력에 대해서 물어보았다.			
최근의 여행력에 대해서 질문하였다.			
평소와 다른 음식을 섭취했는지에 대해서 물어보았다.			
대장 질환의 가족력에 대해서 물어보았다(소화기암, 염증성 장질환).			
비슷한 증상을 가진 사람들이 있는지 물어보았다.			
복부 외상력 및 수술력에 대해서 질문하였다.			
환자의 과거 소화기 질환 여부를 확인하였다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.			
빈혈 정도를 확인하기 위해 결막을 확인하였다.			
경부 림프절 촉진을 하였다.			

환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
갑상샘 촉진 을 통해 내분비계 질환 여부를 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			
배를 만지기 전에 청진을 복부 5군데에서 3초 이상 실시해 연동 운동 이상 유무 를 확인하였다.			
촉진 시 약하게 촉진한 후에 깊게 촉진 하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
복부 촉진 시 압통, 종괴, 간 및 비장비대를 확인하였다.			
피부에 물린 자국 등이 있는지 확인하였다.			
직장수지검사를 시행 하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
정맥주사 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 질환을 3가지 이상을 설명하였다.			
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
탈수 및 전해질 이상 교정 의 필요성에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
병원을 꼭 방문하여야 하는 경우(발열, 혈변, 심한 복통 등)에 대해서 설명하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

