

6-1 배변 이상(변비)

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
변비가 시작된 시점 을 확인하였다.		
변비의 빈도와 양상(과도한 힘주기, 딱딱함, 잔변감, 막힌 느낌, 손가락 사용)에 대해서 질문하였다.		
변의 (대변이 보고 싶은 느낌) 의 유무 를 물어보았다.		
배변 후증 유무 를 물어보았다.		
변비의 악화 및 완화 요인 에 대해서 질문하였다.		
위험 요인 을 평가할 수 있다.		
전신 증상(체중 증가) 에 대해서 질문하였다.		
소화기 증상(복통, 배변 후 통증 완화, 설사) 및 배변 습관(변 굵기, 혈변, 항문 통증) 에 대해서 질문하였다.		
내분비계(추위불내성) 를 확인하였다.		
스트레스 및 식사 와 변비와의 관련성에 대해서 물어보았다.		
항문 증상(배변통, 덩이) 에 대해서 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다.		
최근의 식습관 에 대해서 질문하였다.		
변비와 대장암의 가족력 에 대해서 물어보았다.		
복부 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.		
환자의 과거 소화기 질환 여부를 확인하였다(항문 질환 : 치질, 치열 포함).		
동반 가능한 내분비 질환(갑상선기능저하, 당뇨병, 고칼슘혈증) 중 한 가지 이상 물어보았다.		
직업과 운동 에 대해서 질문하였다.		

신체 진찰	질함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			

환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
갑상샘 촉진 을 통해 내분비계 질환 여부를 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .			
배를 만지기 전에 청진을 복부 5군데에서 3초 이상 실시해 연동 운동 이상 유무 를 확인하였다.			
촉진 시 약하게 촉진한 후에 깊게 촉진 하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
복부를 촉진하여 압통, 종괴 및 간비대 를 확인하였다.			
[직장류 의심 시] 골반 내진 을 시행하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
항문 직장 진찰 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
변비를 개선시킬 수 있는 생활 습관 및 배변 습관에 대해서 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

