

9 실신

채점표 예시


병력 청취(주제 관련)	예	아니오
실신과 발작을 구별할 수 있다.		
실신이 나타난 시점, 상황, 빈도, 지속 시간 에 대해서 확인하였다.		
실신 당시 의식 상태와 자세 에 대해서 물어보았다.		
전조 증상 에 대해서 확인하였다(눈 앞 캄캄, 메스꺼움, 식은땀).		
실신 발작 중의 상태 에 대해서 확인하였다(경련, 대소변 실금, 혀깨물).		
실신 이후의 증상 을 파악하였다(두통, 피로, 손발저림).		
출혈 경향 및 탈수 여부에 대해서 확인하였다.		
기절 전후로 순환기계 증상 (가슴 통증이나 두근거림), 신경계 증상 (두통, 팔다리 마비, 말 어둔해짐 등)에 대해서 질문하였다.		
과거에도 실신 한 적 있었는지 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
사용 중인 약물 (고혈압약, 전립선비대증약)에 대해서 확인하였다.		
음주력 (양과 횟수)과 흡연력 에 대해서 물어보았다.		
과거 실신 경험 이 있는 경우 그 당시 상황에 대해서 물어보았다.		
심혈관 질환 및 뇌졸중의 가족력 에 대해서 물어보았다.		
두부 외상 에 대해서 질문하였다.		
환자의 과거 심혈관 질환 및 공황장애 에 대해서 확인하였다.		
전신 증상 (열, 체중 변화)에 대해서 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			

결막을 시진하여 창백한지 확인하였다.			
양쪽 목동맥을 숨을 참으라고 지시한 후 청진하였다.			
심음을 5군데 이상 올바른 위치에서 2초 이상 청진하였다.			
신경학적 검사(뇌신경검사, 팔다리 근력 및 감각 확인)를 시행하였다.			
두경부 외상 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
혈압 측정에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
실신이 일어나는 상황에서 낙상 예방에 대한 교육을 실시하였다.			
실신에 따라 예방할 수 있는 방법을 설명하였다.			
응급 치료가 필요한 환자를 감별하고 치료 계획을 수립하였으며, 응급 조치에 대해 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘



Memo