

산부/여성/소아

유방통/유방덩이

질분비물/질출혈

월경 이상/월경통

산전 진찰

성장/발달 지연

예방접종

시험 관경 코멘트



유방통이나 멍울로 내원한 환자는 문진에서 **월경력**(폐경 여부, 초경 시기)과 **산과력**(모유수유 여부)을 물어보는 것을 잊지 말아야 합니다.

산부/여성 파트의 CPX 항목은 특히 '여성력'에서 물어볼 것이 많고 중요하기 때문에 이를 'Factor'에서 먼저 물어볼 수 있게 구성하였습니다. 또한 신체 진찰 시 환자를 배려하여 **상의 탈의 및 유방, 유두 촉진에 대한 동의를 잘 구해야** 환자-의사 관계에서 점수를 얻을 수 있습니다. 교육에서 **유방암 검진 주기와 자가진단법**을 교육해야 하므로 교육에서 시간을 충분히 배분하는 것이 좋습니다.



유방덩이는 환자의 나이와 임신력이 감별 진단에 매우 중요합니다. 유방덩이에서 30세 미만이면 섬유선종, 30~40대면 섬유낭병과 낭종, 40~50대에 혈성 유두분비물이면 관내유두종과 유방암을 의심할 수 있습니다. 방에 들어가기 전에 추정 진단을 세우고 이에 집중해서 물어봅시다.

폐경 전의 젊은 여성이라면 대부분이 생리 주기와 관련된 유방통으로 이는 자연적으로 없어지므로 생활 습관 교육(카페인 줄이기, 온열요법, 유방의 움직임을 줄일 수 있는 속옷 착용)을 시행하고, 경우에 따라 약물 처방을 고려해 볼 수 있습니다. 유방의 신체 진찰 자체를 어려워하는 경우가 많기 때문에 유방진찰법을 정확히 숙지하여 자세를 빠르고 정확하게 말하여 환자가 실행할 수 있도록 하는 것이 가장 중요합니다. 교육 시 자가 진단과 정기 진찰을 자세하고 꼼꼼히 설명해야 하여 시간 분배가 중요한 항목입니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
유방 덩이	섬유낭병 (fibrocystic change)	[병력] 30~40대, 월경 전 주기적 유방통, 압통 [검진] 치밀하고 단단하게 만져지는 조직	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 경과 관찰, 절제 생검
	유방 낭종 (breast cyst)	[병력] 30~40대, 월경 주기에 따른 크기 변화 및 주기적 유방통, 월경 직전까지 커지다 월경 후 감소 [검진] 낭종 촉진 시 물렁함	[검사] 유방촬영술, 유방초음파, 세침 흡인 [치료] 경과 관찰
	섬유선종★ (fibroadenoma)	[병력] 30세 미만, 몇 달 간에 걸쳐서 점점 커지는 딱딱하고 단일한 종괴, 무통성으로 주기에 따른 변화 없음 [검진] 촉진 시 쉽게 미끄러짐	[검사] 유방촬영술, 유방초음파, 세침 흡인, 절제 생검 [치료] 절제 생검

유방 덩이	유방암★ (breast cancer)	[병력] 멍울, 피부 함몰, 주기적 변화 없음, 혈성 유두분비물, 대부분 무통성 [검진] 한쪽 유방의 단단한 종괴	[검사] 유방촬영술, 유방초음파, Core needle biopsy [치료] 수술, 방사선 치료, 항암 치료
	관내유두종 (intraductal papilloma)	[병력] 혈성 유두분비물, 단일 유두관, 유륜 하부 주위의 작은 종괴 [검진] 유두에서 혈성분비물 확인	[검사] 유방촬영술, 유방초음파, 세침 흡인 [치료] 유륜 주위 절개를 통한 전절제
	젖낭종 (galactocele)	[병력] 수유 중단 후 6~10개월 [검진] 둥글고 경계 명확하며, 유방 내에서 쉽게 움직여지는 유즙(회백색 액체) 으로 찬 낭종	[검사] 유방촬영술, 유방초음파, 세침 흡인 [치료] 세침 흡인
유방통	주기유방병증★ (cyclo mastopathy)	[병력] 월경 시작과 함께 발생한 유방통, 양쪽 유방, 다발성의 덩이도? [검진] 유방조직이 덩이 형태로 두꺼움?	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 안심, 심하면 진통소염제
	피임약, 호르몬 대체요법	[병력] 양쪽 유방이 부풀어 오르는 느낌, 폐경 이후에는 통증이 없다, 호르몬 쓰면서 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 안심
	유방울혈 (breast engorgement)	[병력] 통증, 열감, 출산 후 3~5일 양쪽 유방의 전체적 종창 [검진] 빨갛게 부어 있음	[검사] 대개 필요 없음 [치료] 핫팩, 아이스팩, 마사지, 경구진통제
	유선염★ (mastadenitis)	[병력] 발열, 통증, 모유수유, 대개 한쪽 유방 [검진] 발적, 열감과 압통 있음	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 수유를 좀 더 자주하기, 진통제, 핫팩 or 아이스팩, 항생제
	유방 농양★ (breast abscess)	[병력] 통증, 열감, 멍울, 발열, 오한 [검진] 압통, 발적이 보임, Fluctuation, 빨갛게 부어 있고 스쳐도 아파함	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 절개 배농, 광범위 항생제
	유방 외상	[병력] 유방 외상 병력 [검진] 외상에 의한 소견 외엔 정상	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 수술, 항생제
	카페인에 의한 유방통★	[병력] 커피, 카페인 음료를 자주 마심 [검진] 정상	[검사] 유방촬영술, 유방초음파 [치료] 카페인 끊기



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 취취

☞ 먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

	멍울	통증
O	언제부터 멍울이 생겼나요? 갑자기 생겼나요?	언제부터 아프기 시작했나요? 갑자기 그랬나요?
L	어디에 생겼나요? 움직이나요?	어디가 아픈지 짚어주실 수 있나요? 통증이 다른 부위로 뻗어나요? (방사통)
D	월경 주기에 따라 크기가 변하나요?	통증은 한번 시작되면 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 아픈가요? 통증에 주기가 있나요?/아팠다 안아팠다 하나요?
Co	점점 더 크기가 커지나요? 개수는 많아졌나요?	점점 더 통증이 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? → 치료는?	
C	멍울은 몇 개나 만져지나요? 멍울이 얼마나 딱딱한가요? 멍울이 만져지는 경계가 명확한가요? 멍울 크기가 얼마만 한가요? [유방통] 아프지는 않나요? → 아프다면, 주기에 따라 변하나요?	어떻게 아픈지 구체적으로 설명해 주시겠어요? NRS 0~10 [유방 멍울] 만져지는 멍울은 없나요? → 있다면, 몇 개 있나요? 주기에 따라 크기가 변하나요? 딱딱한가요?/움직이나요?
A	[전신] 발열/오한/체중 감소/피로 [유방] 피부 발적/부종/열감/피부 함몰 암기법 유방이 함 빨갛게 부어 열이 아니면 알겠지? [유두] 유두 함몰/유두분비물(색갈, 편측/양측?) [림프절] 겨드랑이 멍울/겨드랑이 압통 [정신] 우울/스트레스/수면장애 암기법 전방에 두꺼운 림프가 있어 정신이 없네.	

F = 여	[월경력] 현재 월경 중이신가요?/평소 규칙적/주기/LMP/임신 가능성/월경량/월경통 [산과력] 결혼하셨나요?/아이는 몇 명 있으신가요? (만-조-유-생) [위험 인자] 현재 수유 중이신가요?/첫 아이 출산 나이는 언제였나요?/모유수유하셨나요? 초경은 언제 하셨나요? → 나이 많은 경우 폐경은 언제 하셨나요? → 폐경 이후 두근거림, 안면홍조 등의 증상이 있으셨나요? 증상이 뚜렷하게 나타나는 시기가 있나요?
E	이전에 유방 검진/산부인과 검진(난소, 자궁 문제)
외	최근에 가슴 부분을 부딪히거나 다치지는 않았나요? 수술 받은 적 있으세요? (유방보형물을 삽입하신 적 있나요?)
과	이전 유방암이나 유방 질환을 진단 받은 적 있나요?/다른 산부인과 질환 진단 받은 적 있나요?
약	복용 중인 약물이 있으신가요? → 피임약, 호르몬 대체요법 등
사	직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받나요? 음주는 하세요?/흡연은 하세요? 커피는 하루에 몇 잔 드시나요?/커피 외에 카페인 음료는 자주 드시나요? 지방이 많은 음식을 자주 드시나요?/식습관
가	가족 중에 유방암, 난소암, 자궁암 등 여성암을 진단 받은 분이 있나요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 유방을 제가 직접 보고 촉진해보기 위해 상의 탈의가 필요합니다. 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 시진★ : 가만히/머리 뒤로 손 올려주세요. 허리에 손 올려주세요. 제 어깨 위에 양손을 올려주시고 힘을 줘서 밀어주세요. 2. 촉진 : 겨드랑이 림프절 촉진(검사자 오른손으로 환자 오른팔 들면서 왼쪽 겨드랑이 촉진, 반대쪽도 동일), 쇄골 상부 림프절 촉진 [누워서] 3. 외측 유방 촉진★ : 오른손을 이마에 대고, 오른다리를 왼쪽 다리 위로 넘겨 골반을 살짝 틀어주세요. 4. 내측 유방 촉진★ : 다리는 풀어서 곧게 펴주시고, 오른손은 목 옆에 놓아주세요. 5. 반대쪽도 똑같이 촉진 6. 유두 : 이제 유두의 분비물이 있지 않은지 확인하기 위해 유두를 여러 방향으로 만져 보겠습니다. 괜찮으실까요? (환자 동의 구하기) → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

	유방 멍울	유방통
공감	유방에서 멍울이 만져져서 불편하고 걱정돼 되겠습니다.	그동안 유방에 통증이 있으셔서 많이 힘드셨 겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 환자분의 ○○쪽 유방의 ○○시 방향에 ○○cm 크기의 유방 멍울이 만져 지는 것으로 보아 유방암의 가능성을 완 전히 배제할 수는 없을 것 같습니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 모유수유 중이시고, 열감이 있고, 전반적으로 통증을 호소하고 계신 것 으로 보아 유선염의 가능성이 가장 높아 보 입니다.
감별 진단	그러나 유방에 멍울이 만져지는 원인은 단 순히 생리 주기에 의해서 일시적으로 그 릴 수도 있고, 감염에 의해서도 발생할 수 있습니다.	그러나 유방 통증은 생리 주기에 따라서도 발 생할 수 있고, 감염이나 염증 등 다양한 원 인에 의해서 가능합니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해서는 유방초음파 와 유방촬영술을 시행해 보고 덩이가 확 인되면 조직검사를 통해 이상 소견이 있 는지 확인해 보도록 하겠습니다. 괜찮으 신가요?	따라서 정확한 진단을 위해서 간단한 혈액검 사와 유방촬영술, 유방초음파가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?
치료	치료로는 수술이 필요할 수도 있고, 단순히 약물 치료만 시행할 수도 있습니다.	검사 후에도 유선염으로 진단이 되면 현재 수 유 중이신 것은 중단하지 마시고 오히려 수 유를 더 자주 해주셔야 증상이 완화될 것 입니다. 또한 카페인이 들어간 음료는 삼가 주시고, 아이스팩이나 핫팩으로 마사지를 하시는 것도 도움이 됩니다. 그래도 호전이 안된다면 통증을 덜어드릴 진통제를 처방 해드리고, 필요 시 항생제를 처방해드릴 수 있습니다.
예후	아직 정확한 것은 없으니 검사 전에 미리 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.	-

교육	[자가검진 권유(30세 이상)] 30세 이상의 여성의 경우 유방자가검진이 매우 중요합니다. 매달 샤워하시면서 제가 가까웠던 검진과 동일한 방식으로 거울을 보면서 유방자가검진을 시행해 주세요. 자가검진은 비용도 들지 않고 위험성도 없는 정말 좋은 검사 방법입니다. 매달 확인하는 습관을 만드시길 권해드립니다. [정기검진 권유(35세 이상)] 35세부터는 자가검진과 함께 2년 간격으로 병원에 오셔서 의사에게 검사를 받으시는 것이 좋습니다. [정기검진 권유(40세 이상)] 40세 이후부터는 1~2년마다 유방촬영술을 해주시는 것이 권고됩니다. [생활 습관 개선] 지방이 많이 함유된 음식과 술은 줄여 주시고, 적절하게 운동을 해주시는 것이 증상 완화에 도움이 되실 것입니다. 또한, 카페인도 통증을 유발할 수 있기 때문에 카페인 음료는 되도록 안 드시는 것이 좋습니다.	[정기검진 권유] 오늘은 유방의 통증 때문에 오셨지만, [자가검진 권유(30세 이상)] 30세 이상의 여성의 경우 유방자가검진이 매우 중요합니다. 매달 샤워하시면서 제가 가까웠던 검진과 동일한 방식으로 거울을 보면서 유방자가검진을 시행해 주세요. 자가검진은 비용도 들지 않고 위험성도 없는 정말 좋은 검사 방법입니다. 매달 확인하는 습관을 만드시길 권해드립니다. [정기검진 권유(35세 이상)] 35세부터는 자가검진과 함께 2년 간격으로 병원에 오셔서 의사에게 검사를 받으시는 것이 좋습니다. [정기검진 권유(40세 이상)] 40세 이후부터는 1~2년마다 유방촬영술을 해주시는 것이 권고됩니다. [생활 습관 개선] 지방이 많이 함유된 음식과 술은 줄여 주시고, 적절하게 운동을 해주시는 것이 증상 완화에 도움이 되실 것입니다.
	질문	궁금하신 것 있으신가요?

당이	
섬유낭병	경과 관찰, 절제 생검
유방 낭종	경과 관찰
섬유샘종	절제 생검
관내유두종	전절제
유방암	수술/방사선/항암
유방 농양	절개 배농, 항생제
유방염	핫팩/아이스팩/항생제
젖낭종	세침 흡인

통증	
월경 주기	안심
약	안심
유방 울혈	마사지, 진통제
유선염	수유 더 자주, 진통제
유방 농양	절개 배농, 항생제
유방 외상	수술, 항생제
카페인	카페인 끊기

❖ 기본적 진단 계획

- ① 유방촬영술(mammography), 유방초음파
- ② 임신반응검사
- ③ 혈액검사 : 혈중 prolactin
- ④ 발열이 있어 유방 농양이 의심되면 전혈구검사

❖ 치료 계획

- ① 유선염 : 핫팩, 아이스팩, 마사지, 진통제, 항생제
- ② 유방 농양 : 항생제, I & D
- ③ 유방암, 섬유샘종 : 조직검사, needle aspiration

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 자가검진은 자신의 유방을 스스로 만져 보아 유방덩이나 다른 이상이 없는지 확인하는 것으로 비용이 들지 않고 위험성도 없는 좋은 방법이므로 자가검진을 하도록 교육
- ② 유방 통증 원인 설명 : 고지방식 피하기, 카페인 섭취 줄이기
- ③ 유방 자가검진에 대해 교육 : 30세 이후부터, 월경 후 3~4일째에 시행
- ④ 유방 정기검진에 대해 교육
 - 의사의 유방 촉진은 35세 이후 매년
 - 유방촬영술/초음파 : 40세 이상 → 2년마다
- ⑤ 편한 브래지어 착용, 엎드려 자지 말기, 수유 전 or 유방 만지기 전 손씻기



keyword

유방덩이 : 나이 별 추정 진단 예상하기

월경력, 산과력(모유수유 여부) 꼭 물어보기

유방 진찰 : 상의 탈의 및 유방, 유두 촉진에 대한 동의 구하기

유방통, 유방덩이가 꼭 암을 의미하는 것이 아님을 설명하며 안심시키기

교육 : 유방 자가 검진(30세 이상), 정기 검진(35세 : 2년, 40세 : 1~2년)

STEP 3 신체 검진

앉아서	누워서
1. 네 가지 자세로 유방 시진 (가만히 → 머리 뒤에 손 → 허리에 손 → 검사자 어깨 밀어보기) 2. 겨드랑이 림프절 촉진 (검사자의 오른손으로 환자의 오른팔 들어 주면서, 왼쪽도 같이) 3. 쇄골 상부 림프절 촉진	1. 오른손을 이마 위에 올리게 하고 오른쪽 다리를 왼쪽 다리 위로 꼬게 해서 유방을 'ㄷ'자 모양으로 촉진할 것 2. 오른손을 목 옆에 올리게 하고 다리 펴게 해서 유방을 'ㄷ'자 모양으로 촉진할 것 3. 왼쪽도 마찬가지로 할 것 4. 유두, 유륜분비물 확인(환자의 동의 구할 것) (두 손가락으로 여러 방향에서 짜 볼 것)

