

24. 산전진찰

● 중요 포인트

- 1. 산과적 과거력, 임신 분기별 평가, 임신 증상, 임신 위험성 평가, 응급 상황 파악
- 2. 1) 정상임신 확인하러 온 임신 초기 산모, 2) 임신 도중 증상 발생하여 온 환자 모두 가능. 임신 후기 산모는 레오폴드 모형 착용하고 있을 가능성 높으므로 모형 위에 복부진찰 시행
- 3. 산모와의 rapport 중요 – 유산 설명 시 놀라지 않도록 부드럽게 표현 (임신 1 분기 질출혈/혈성분비물 나오면 절박유산 가능성)
- 4. 제시문은 산전 진찰을 위해 내원했다고 적혀 있지만 주 호소 물어보면 질 출혈/분비물, 두통, 복통 등 증상 말할 수 있음. 증상이 있으면 각 증상에 대한 평가도 필요 (L D Co Ex C 간단하게)

● 평가 목표

| 원인                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정상 임신                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 임신험병증                                                                        |                                  | 절박유산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 고위험 임신                                                                       |                                  | 고령산모                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 평가목표                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1) 산전 진찰이 필요한 산모에게 병력청취와 신체진찰을 통해 모체와 태아의 건강한 상태를 구별하여 정기적인 산전관리 일정을 세울 수 있음 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) 치료가 필요한 산모 감별                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 구체적인 성과                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 병력<br>청취                                                                     | 임신여부,<br>현재 임신주수,<br>분만예정일<br>확인 | [임신여부] 임신반응검사 언제, 소변검사 키트에서 두 줄 확실히 보였는지<br>[현재 임신주수]<br>[분만예정일] LMP 확인 -> 월 -3/+9 일+7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | 임신의 정상반응<br>vs<br>비정상 증상         | [정상반응]<br>1. 초기: 입덧(구역/구토), 유방 압통(유선 발달), 피로<br>2. 중기: 허리통증, 가벼운 부종 (자궁 무게중심 이동 및 혈액량 증가)<br>3. 후기: 빈뇨, 숨참 (태아가 방광과 횡격막 압박), 가진통<br><br>[비정상 증상 - 위험증상]<br>질출혈(유산, 태반조기박리), 하복부의 심한 복통(주기적, 찌르는 듯 – 유산 / 지속 - 박리)<br>심한 두통, 시야 흐림, 급격한 부종, 우상복부 통증(간 손상) – 전자간증, 임신 고혈압<br>고열(감염), 물 같은 질분비물(양막 파수), 태동 강도/빈도 저하                                                                             |
|                                                                              | 산모와 태아의<br>건강상태 확인               | [키/체중]<br>[월경력] 규칙적/주기/기간/월경량/월경통<br>[산과력] 만조유생(TPAL), 자연분만/제왕절개(이유)<br>[주산기] 이전 임신 시 산모 질환 / 출산 시 문제 / 유전병, 선천기형 자녀 있는지<br>[수술력] 부인과 시술/수술: 자궁 수술(근종, 제왕) 확인 -> 분만 방식 결정<br>[과거력] 기저질환: HTN, DM, 갑상샘, 알레르기, 뇌질환 등<br>[약물력] 경구피임약 / 엽산 (임신 전~초기까지) / 철분제(임신 20 주 이후부터)<br>[사회력] 술담커 / 직업 (방사선, 유해물질 등 환경적 위험요소 있는지, 어린아이 돌보는지?)<br>[가족력] 선천 기형 / 유전 질환<br>[예방접종] 풍진, B 형간염 (임신 3 개월 전 완료했어야) |
|                                                                              | 임신 분기별 비정상<br>징후 확인, 설명          | 1 삼분기: 심한 질출혈(유산), 심한 하복부 통증(자궁외임신), 심한 구토, 38℃ 이상 고열<br>2 삼분기: 통증 없는 질출혈(전치태반), 급격한 부종, 투명한 물 같은 질 분비물<br>3 삼분기: 태동의 급격한 감소/소실(태아 가사), 심한 두통/시야장애/상복부통증(혈압↑),<br>지속적이고 딱딱한 복통(태반조기박리)                                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신<br>체<br>진<br>찰      | 임신 단계 / 분만<br>진행단계 확인하는<br>골반진찰     | [골반내진]<br>1. 질과 자궁의 구조적 이상, 통증, 분비물 평가<br>2. 자궁경부 개대(cm), 소실(%), 하강도(ischial spine (0) 기준 아래 +1~+5/위 -1~-5), 태위, 태향, 양막 파열 등 확인                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|                       | 태아와 임신 단계<br>확인하는 복부진찰              | Leopold maneuver: 태아의 위치 파악                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|                       | 태아의 심음상태<br>확인                      | 도플러 초음파로 태아 심박수 확인<br>(보통 초음파 기계 제공하는 경우는 거의 없으므로 신체 진찰 시 언급만 하면 소견 적힌 종이 제공)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| 진<br>단<br>및<br>치<br>료 | 삼분기별 검사계획                           | 처음 방문 시                                                                                                                                                                                                                               | 혈액검사(CBC), 소변검사(단백뇨), 소변배양검사(세균뇨), 혈액형(ABO, Rh), B 형간염 항원/항체검사, 매독검사, 풍진 항체검사, HIV 검사                                                 |
|                       |                                     | 매 방문 시                                                                                                                                                                                                                                | 산모 혈압, 체중, 자궁 크기, 수축 정도, 태아 심박수, 태아 움직임, 출혈 및 양막 파열 유무                                                                                |
|                       |                                     | 제 1 삼분기<br>(~14 주)                                                                                                                                                                                                                    | 8 주~ 초음파(태아 및 태아 심박동 확인)<br>11~14 주 목둘레투명대 측정(태아 염색체 이상 선별검사)<br>10~13 주 (유전질환 가족력 or 목덜미투명대 ↑) 용모막용모생검 – 침습적                         |
|                       |                                     | 제 2 삼분기<br>(15~28 주)                                                                                                                                                                                                                  | 16~20 주 양수검사(염색체 이상 확진검사)<br>20~24 주 정밀초음파 검사(해부학적 구조 이상 확인)<br>24~28 주 임신성 당뇨 선별검사(50g OGTT)<br>28 주 Rh- 산모에게 적혈구항체검사 시행하고 면역글로불린 투여 |
|                       |                                     | 제 3 삼분기<br>(29~출산)                                                                                                                                                                                                                    | 초음파                                                                                                                                   |
|                       | 추후 진료계획                             | 정기적 산전관리 계획<br>28 주까지는 4 주마다, 36 주까지는 2 주마다, 그 이후부터는 매주 검사                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| 환<br>자<br>교<br>육      | 임신 중 필요한<br>영양소 공급                  | 1. 엽산: 임신 전 ~ 임신 초기 / 하루 400 µg 씩 / 엽산 부족 시 태아 신경관 결손 (척수를 둘러싼 척추 및 피부에 결함이 생겨 신경조직이 노출되는 것)<br>2. 철분제: 임신 20 주부터 / 하루 30mg                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|                       | 생활습관 교육<br>(흡연 등)                   | 1. 술 담배 절대 금지<br>2. 병원 진료 받을 때 반드시 현재 임신 중임을 알리기<br>3. 식이요법<br>1) 임신 전 기간에 걸쳐 먹고 싶은 음식 골고루 먹기<br>2) 임신 초기 입덧 심해 잘 못 먹는 경우 많으나 대부분 별 문제 없음. 적은 양 여러번 먹기<br>But 산모 체중 감소, 소변량 감소 수준이면 수액치료<br>3) 임신 후반 6 개월 동안 1kg 단백질 보충 필요 (하루 5~6Kg) |                                                                                                                                       |
|                       | 임신 중 약물복용,<br>신체운동, 성생활,<br>예방접종 교육 | 1. 약물복용: 꼭 의사와 상담<br>2. 신체운동: 매우 피로하거나 임신에 영향 줄 정도가 아니면 운동/직장생활 제한할 필요 X<br>가벼운 조깅, 산책 정도 운동은 아기, 산모 모두에게 좋음<br>3. 성생활: 분만 전 4 주 ~ 분만 후 2 주까지 금욕<br>4. 예방접종: 생백신 접종 절대 금기 (MMR, Varicella, Polio PO 등)                                |                                                                                                                                       |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            | <div>1분기<br/>(~14wk)</div> <p>임신 시 약물 복용에 주의해야 하므로 꼭 저와 상담하시고 약물을 복용하세요.<br/>음주, 흡연은 금기입니다.<br/>속옷에 묻는 정도의 질출혈/경미한 하복부 통증은 있을 수 있으나 심하고 지속되면 꼭 저와 상의하세요.<br/>평소에 하던 운동이라면 계속하셔도 됩니다(심장병, 위축성 폐질환, IIOC는 No).</p> | <div>2분기<br/>(15~28wk)</div> <p>5개월 정도에 태아의 청각이 완성되므로 태교가 도움이 됩니다.<br/>아기에게 끊임없이 말을 걸고 교감을 나누세요.</p> | <div>3분기<br/>(29~출산)</div> <p>목욕 시에 미끄러지지 않게 조심하세요.<br/>임신 36주까지는 여행할 수 있으나 장시간 앉아 있는 경우 1시간마다 쉬세요.<br/>부담스런 중노동은 피하고, 노동 기간 중 적절히 쉬세요.<br/>요통 발생 시 쭉그려 앉으시고, 앉을 때는 베개를 허리에 지지하세요.<br/>굽이 높은 신발은 신지마세요.</p> |
| 윤리   | 태아 성감별에 대한 법적인 규정을 설명할 수 있다                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| PPI  | 환자가 수치심을 느끼지 않도록 배려할 수 있다                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 임상술기 | 산부인과 진찰(분만 진행 단계 진찰, 자궁경부파바름 검사, 질 분비물 검사) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |

● 원인 질환 정리 **정상임신 2, 정상진통 1**

| 질환             |                                              | 병력청취                                | 질환 설명                                                                                                        | 검사                                                                          | 치료                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 산모<br>건강<br>상태 | <b>입덧<br/>1+1</b>                            | 구역, 구토<br>식욕부진,<br>음식물에 대한<br>기호 변화 | 병이라기보다는 일종의<br>생리적인 현상<br>임신 11-13 주에 가장 심하고<br>대부분 14-16 주면 사라짐                                             | 전해질검사                                                                       | 식습관 교정<br>탈수 심하면 수액                                                             |
|                | <b>고령 임신</b>                                 | 35 세 이상                             |                                                                                                              | 선별검사 X,<br>용모막 용모<br>표본채취/양수천자                                              | 산전 관리 철저                                                                        |
|                | <b>임신 고혈압<br/>0+1<br/>/<br/>전자간증<br/>2+1</b> | 부종, 두통,<br>Rt. 상복부 통증,<br>시야장애      | 임신 <b>20 주 이후</b> 새로 발생한<br>고혈압, 단백뇨 없음, 분만 후<br>정상화<br>분만 12 주 후에도 정상화되지<br>않으면 만성고혈압                       | 혈액검사(빈혈,<br>혈소판 수치,<br>신기능),<br>소변검사(단백량),<br>간기능검사                         | 경과관찰,<br>≥160/110 시<br>고혈압약                                                     |
|                |                                              |                                     | 임신고혈압+단백뇨/두통/시야<br>흐림/신,간기능 ↓                                                                                |                                                                             | 혈압약, 경련예방약<br>34 주 이상 – 분만                                                      |
|                | <b>임신 당뇨병</b>                                | 소변검사에서<br>당이 나옴                     | 임신 전에는 없던 당뇨병이<br>임신 <b>20 주 이후</b> 에 생긴 것.<br>출산하면 혈당 돌아옴                                                   | 경구<br>당부하검사+당화혈<br>색소                                                       | 식이요법, 인슐린                                                                       |
| 출산             | <b>유산</b>                                    | 질출혈                                 | 절박유산: 임신 <b>20 주 이전</b><br>자궁경부 닫혀있는 상태에서<br>질출혈이 있는 것<br>계류유산: 자궁경부가<br>닫혀있는 상태로 사망한 임신<br>산물이 자궁 내에 남아있는 것 | 질초음파+혈중<br>hCG+혈청 FSH                                                       | 절대 안정<br>태아 죽어서<br>계류유산 시<br>약물치료(자궁수축,<br>임신산물 배출 돕는<br>약) / 자궁소파수술            |
|                | <b>태반 조기<br/>박리 1+1<br/>/<br/>전치태반<br/>1</b> | 과도한 질출혈<br>복통(+) 조기박리<br>복통(-) 전치태반 | 박리: 태반이 분만 전에 먼저<br>떨어진 것<br>전치: 자궁 위쪽에 있어야 하는<br>태반이 비정상적으로 아래로<br>내려와 자궁경부 입구<br>근처/위에 부착된 상태              | CBC+질초음파+복<br>부초음파                                                          | 수혈,<br>응급제왕절개수술                                                                 |
|                | <b>조기 양막 파수<br/>1</b>                        | 물같이 흐르는<br>질분비물 나옴                  | 양막파수: <b>진통 전</b> 에 양막이<br>파열되어 양수가 흐르는 것                                                                    | 자궁경부검사<br>니트라진검사: 질<br>분비물이 양수인지<br>확인<br>비수축검사(NST):<br>아기 심박수와<br>움직임을 확인 | 24 주 미만-<br>생존가능성 없음<br>24~34:<br>스테로이드+<br>항생제<br>34 주 이상<br>진통있으면 분만 +<br>항생제 |
|                | <b>조기 산통<br/>1+1</b>                         | 조기에 규칙적<br>산통                       | 만삭이 되기 전( <b>20 주~37 주</b> )에<br>규칙적 자궁수축과 함께<br>자궁경부가 열리는 것                                                 | 자궁경부검사<br>비수축검사(NST):<br>아기 심박수와<br>움직임을 확인                                 | 34 주 이전:<br>스테로이드 +<br>자궁수축억제제<br>(48 시간까지 delay)<br><br>34 주 이후<br>그냥 분만       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인사/손씻기/환자확인/비밀보장 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| O                | <정상임신><br>임신반응검사 언제 -> 소변검사 키트에서 두 줄 확실히 보였는지<br>원하는 임신 (준비해서 한 임신)?<br>LMP -> 출산예정일 계산 (월 -3/+9, 일 +7)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| L                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| D                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Co               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Ex               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| C<br>=여          | [산모평가] 키 / 체중 / 혈액형(아빠도) / 예방접종(HBV 수두 풍진)<br>[월경력] 규칙적/주기/기간/월경량/월경통<br>[산과력] 만조유생(TPAL) (몇 주에 유산/조산), 자연분만/제왕절개(이유)<br>[성관계] 유무 / 성관계 후 질출혈, 질분비물 / 성교통<br>[주산기] 이전 임신 시 산모 질환 / 출산 시 문제 / 유전병, 선천기형 자녀 있는지<br>[피임] 피임하고 있었나요 -> 어떤 방식 |                                                                                                                                                                             |
| A                | [OPEN] 다른 불편한 곳은 없으세요? 암기법: 응전 유산소 전자갑당                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|                  | 전신                                                                                                                                                                                                                                       | 발열 / 오한 / 피로 / 체중변화 / 부종                                                                                                                                                    |
|                  | 응급                                                                                                                                                                                                                                       | 어지럼증 / 호흡곤란                                                                                                                                                                 |
|                  | 유산                                                                                                                                                                                                                                       | 질출혈 / 질분비물 -> 색 / 양 / 통증 / 물같은분비물 r/o 유산, 박리, 파수<br>복통 -> L 위치(하복부, 우상복부) / D 지속 or 주기적 / C 양상, NRS / Co 심해지는지<br>태동 감소 (태동은 20 주경부터 느껴짐)                                   |
|                  | 소화기(입덧)                                                                                                                                                                                                                                  | 구역 / 구토 r/o 입덧                                                                                                                                                              |
|                  | 전자간증                                                                                                                                                                                                                                     | 두통 / 시야흐림 / 거품뇨 r/o 전자간증                                                                                                                                                    |
|                  | 갑상샘                                                                                                                                                                                                                                      | 더위불내성 / 두근거림 / 체중감소                                                                                                                                                         |
|                  | 당뇨                                                                                                                                                                                                                                       | 다음 / 다뇨 / 다갈                                                                                                                                                                |
| F                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| E                | 건강검진 - 결과 / 산부인과 검진 (자궁경부검사) / 이전 산전진찰 -> 얼마나 자주 or 왜 안 했는지<br>6 개월 내 X-ray, CT 찍은 적 있는지                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 외                | 부인과 시술/수술(근종, 제왕절개)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| 과                | HTN / DM / 갑상샘 / 알레르기 / 뇌전증 / 성병(매독, 임질, 에이즈)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| 약                | 약물 (경구피임약, 엽산 임신 2 달 전~임신 4 개월, 철분 임신 20 주 이후)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 사                | 술담커 / 직 (어린이 돌보는지, 방사선, 유해물질 접촉) / 식사 / 스트레스 / 운동 / 해외여행                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 가                | 선천 기형 / 유전 질환                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| PEx              | 동의 구하기<br>손 씻기                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|                  | 기본                                                                                                                                                                                                                                       | V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온)<br>1 눈: 빈혈, 황달 + 전자간증 의심 시 시야검사<br>2 입: 탈수<br>3 목: 갑상샘 촉진<br>4 사지 : 피부 긴장도, 오목부종                                                                   |
|                  | 복부                                                                                                                                                                                                                                       | 1 분기) 복부진찰 - 골반진찰 / 2, 3 분기) 레오폴드 모형 위에 복부진찰 - 분만진행단계<br>복부: 시-청-타-촉<br>**환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기                                                                         |
|                  | 분만 진행 단계 (2 분기 이상)<br>검사 설명<br>동의구하기                                                                                                                                                                                                     | 1. 산모에게 태아 상태 평가를 위한 검사를 하겠다고 말하고 동의 구하기<br>* 복부진찰(태아 위치 확인) - 도플러 초음파(태아 심박수 평가) - 골반진찰(자궁경부 개대 및 소실 정도, 태아 선진부, 양막 파열 여부 확인)<br>2. 손위생 후 임신부의 우측에 선다. (남자는 반드시 여성 보조자 대동) |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>손씻기</b></p> | <p>3. 양해 구하고 치골 부위 가려주면서 누운 상태에서 복부 노출</p> <p>1. 임신부의 다리쪽에서 머리를 바라보고 Fundal grip -&gt; Umbilical grip -&gt; Pawlicks grip<br/>2. 반대 방향(머리 쪽에서 다리를 바라보고 Pelvic grip)</p> <div data-bbox="497 241 1184 1240"> <div> <p>Fundal grip : 자궁 윗쪽 파악. 자궁저부 촉진</p>  <p>양손 -<br/>super<br/>손가락<br/>const<br/>를 확<br/>• 태아<br/>파악<br/>• 태아<br/>통과</p> </div> <div> <p>Umbilical grip : 자궁 옆면 촉진</p>  </div> <div> <p>Pawlicks grip : 자궁 하부 촉진</p>  </div> <div> <p>Pelvic grip : 방향 바뀌어서 자궁 전반 촉진</p>  </div> </div> |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>손씻기</p> <p>Vertex Breech Face position / 양막파열</p> <p>2. 상황에 맞는 치료 및 관리 계획 설명</p> <p>3. 불편한 점, 궁금한 점 있는지</p> <p>4. 손 씻기</p>                                                             |
|    | Pap/Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 질출혈 / 질분비물 있을 때                                                                                                                                                                           |
|    | <p>협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요?</p> <p>손씻기</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|    | 기본!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>혈액검사(CBC, 전해질, 혈당, 간수치)</p> <p>소변검사 (임신반응검사)</p> <p>초음파검사</p>                                                                                                                          |
|    | 정상임신                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>처음 방문 시</p> <p>혈액검사(CBC), 소변검사(단백뇨), 소변배양검사(세균뇨), 혈액형(ABO, Rh), B 형간염 항원/항체검사, 매독검사, 풍진 항체검사, HIV 검사</p>                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>매 방문 시</p> <p>산모 <b>혈압</b>, <b>체중</b>, 자궁 크기, 수축 정도, 태아 <b>심박수</b>, 태아 움직임, 출혈 및 양막 파열 유무</p>                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>제 1 삼분기 (~14 주)</p> <p>8 주~ <b>초음파</b>(태아 및 태아 심박동 확인)<br/> 11~14 주 <b>목덜미투명대</b> 측정(태아 염색체 이상 선별검사)<br/> 10~13 주 (유전질환 가족력 or 목덜미투명대 ↑) 용모막용모생검 - 침습적</p>                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>제 2 삼분기 (15~28 주)</p> <p>16~20 주 양수검사(염색체 이상 확진검사)<br/> 20~24 주 정밀<b>초음파</b> 검사(해부학적 구조 이상 확인)<br/> 24~28 주 임신성 <b>당뇨</b> 선별검사(50g OGTT)<br/> 28 주 Rh- 산모에게 적혈구항체검사 시행하고 면역글로불린 투여</p> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>제 3 삼분기 (29~출산)</p> <p><b>초음파</b></p>                                                                                                                                                  |
|    | 산모 건강상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>고령 임신</p> <p>선별검사 X,<br/> 용모막 용모 표본채취/양수천자</p> <p>산전 관리 철저</p>                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>임신 고혈압/전자간증</p> <p>혈액검사(빈혈, 혈소판 수치, 신기능), 소변검사(단백량), 간기능검사</p> <p>경과관찰,<br/> <math>\geq 160/110</math> 시 고혈압약<br/> 혈압약, 경련예방약<br/> 34 주 이상 - 분만<br/> 산모/태아 상태 악화 시 주수 상관없이 분만</p>      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>임신 당뇨병</p> <p>경구 당부하검사+당화혈색소</p> <p>식이요법 -&gt; 인슐린</p>                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|    | 질출혈/분비물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>유산</p> <p>질초음파+혈중 hCG+혈청 FSH</p> <p>절대 안정<br/> 태아 죽어서 계류유산 시 약물치료(자궁수축, 임신산물 배출 돕는 약) / 자궁소파수술</p>                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>태반조기박리/전치태반</p> <p>CBC+ 질초음파+복부초음파</p> <p>수혈, 응급제왕절개수술</p>                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>조기양막파수/조기 산통</p> <p>자궁경부검사<br/> 니트라진검사: 질 분비물이 양수인지 확인<br/> 비수축검사(NST): 아기 심박수와 움직임을 확인</p> <p>절대안정, 상황에 따라 출산,<br/> 글루코코르티코이드</p>                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 교육 | <p>임신을 확인하기 위해서는 기본적으로 혈액검사와 소변검사가 필요하고 자궁 내 임신 여부를 확인하기 위해 질초음파검사가 필요합니다.</p> <p>(임신 확실한 경우) 출산 예정일은 O 월 O 일입니다. 축하드립니다. 앞으로 정기적으로 병원에 오셔서 산전 관리를 받으셔야 합니다. <b>28 주까지는 4 주마다, 36 주까지는 2 주마다, 그 이후부터는 매주</b> 검사 받으러 오시면 됩니다.</p> <p>임신 중반기에는 기형아 선별검사를 할 예정이고, 임신 24 주 이후 당뇨병 선별검사를 하게 됩니다. 또 방문하실 때마다 OO 님의 혈압, 체중을 측정하고 태아 심음을 확인할 것입니다.</p> <p>[응급]</p> |                                                                                                                                                                                           |



질출혈, 물처럼 흐르는 질분비물, 지속되는 두통, 시야 흐려짐, 고열, 심한 복통, 태동 강도나 빈도 저하 시 응급 상황이니  
바로 병원 내원

[생활습관] 술담식영약운성에

**1. 술 담배 절대 금지**

**2. 영양소 공급**

1) 엽산: 임신 전 ~ 임신 초기 / 하루 400 µg 씩

부족 시 태아 신경관 결손 (척수를 둘러싼 척추 및 피부에 결함이 생겨 신경조직이 노출되는 것)

2) 철분제: 임신 20 주부터 / 하루 30mg

3. 병원 진료 받을 때 반드시 현재 임신 중임을 알리기

**4. 식이요법**

1) 임신 전 기간에 걸쳐 먹고 싶은 음식 골고루 먹기

2) 임신 초기 입덧 심해 잘 못 먹는 경우 많으나 대부분 별 문제 없음. 적은 양 여러번 먹기

But 산모 체중 감소, 소변량 감소 수준이면 수액치료

3) 임신 후반 6 개월 동안 1g/kg 단백질 보충 필요

5. 약물복용: 꼭 의사와 상담

6. 신체운동: 매우 피로하거나 임신에 영향 줄 정도가 아니면 운동/직장생활 제한할 필요 X

가벼운 조깅, 산책 정도 운동은 아기, 산모 모두에게 좋음

7. 성생활: 12 주까지, 분만 전 4 주 ~ 분만 후 2 주까지 금욕

8. 예방접종: 생백신 접종 절대 금기 (MMR, Varicella, Polio PO 등)

[절박유산]

절대 안정. 태아가 반드시 죽은 것은 아님을 설명하고 위로하기

[당뇨]

임신 시 정상적으로 요당이 검출될 수 있음. 추가 검사 필요 (갑상샘도 마찬가지)


마무  
리

다음 진료는 ○ 주 뒤에 하도록 하겠습니다.

(28 주까지는 4 주마다, 36 주까지는 2 주마다, 그 이후부터는 매주)

PPI

궁금하신 점 있으실까요?

| 내진 모형 |              |              |      |                                                                                     |      |
|-------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 개대           | 소실           | 하강도  | 사진                                                                                  | 특징   |
| 1     | 10cm<br>(완전) | 100%<br>(완전) | +3/3 |  | 단차 X |
| 2     | 8cm          | 90%          | +1/3 |  | 단차 0 |
| 3     | 3cm          | 75%          | -1/3 |  |      |
| 4     | 1cm          | 50%          | -3/3 |  |      |



## ● 기타

- ① **운동** : 하루에 30분 이상 중등도의 신체적 활동, 넘어지기 쉬운 운동은 자제
- ② **여행** : 건강한 여성은 여행이 임신에 영향을 주지 않음, 급할 때 찾아갈 병원을 알아봐둘 것
- ③ **목욕** : 탕목욕도 나쁘다는 증거는 없으나 샤워를 권장함, 낙상 위험 주의
- ④ **세척** : 질세척은 임신 전과 동일하게(더 자주 하면 감염의 위험)
- ⑤ **의복** : 실용적이고 몸을 죄지 않는 옷
- ⑥ **변비** : 식습관 개선, 적절한 운동, 약물 사용(아기에게는 해 없음)
- ⑦ **속쓰림** : 나누어서 조금씩 식사, 바로 눕지 않음
- ⑧ **치질** : 좌욕, 변비 치료, 분만 후에 대부분 좋아짐
- ⑨ **성관계** : 유산 위험 있거나 조기분만진통 의심되는 경우 말고는 상관 없음