

2-2. 성폭력

- Overview

- PPI 를 위한 멘트들을 준비해놓고, 입에 많이 바르는 것이 중요해 보입니다.
- 교육 부분이 중요합니다

- 평가 목표

평가목표		
1) 성폭력으로 인한 신체적, 정신적 손상을 평가하여 응급조치를 시행		
2) 객관적인 증거물을 수집하고 법적 의무를 이행		
구체적인 성과		
병력 청취	가해자 정보를 확인	
	성폭행의 상황 파악	
	성폭력 이후의 피해자 행동을 확인	피해자 대처 확인
	산부인과 병력을 확인	여성력/과거력
	심리상태와 지원체계를 평가	사회력
신체 진찰	손상의 정도를 확인	멍/상처/외상 확인을 위한 전신 피부 시진 및 촉진
	성폭력 응급키트를 사용하여 법적 증거물을 채집	골반내진 및 질분비물 검사, 증거용 사진 촬영, 체모나 정액등 증거물 수집
진단	임신, 성병, 기타 감염성 질환을 확인하는 검사계획 수립	-임신반응검사 -골반내진+질분비물검사
치료	손상에 대해 응급조치	멍이나 상처에 대해 드레싱
	성병 치료 및 임신예방조치	임신반응검사 시행, 응급피임약 처방, 예방적 항생제 처방
	사회지원체계와 연결 및 정신건강의학과와 협력진료 시행	해바라기 센터 연결
환자 교육	임신과 성병예방 교육	임신가능성, 임신반응검사 설명 및 그에 따른 처치 설명, 응급피임약에 대해 교육 성매개감염질환에 대해 교육 및 예방적 항생제 사용 교육
윤리적 법적 고려	성폭력과 관련된 진료 동의를 구할 수 있다	PPI 와 비밀보장을 잘하자
	성폭력 신고의 의무를 이행할 수 있다	노인성폭력/아동성폭력 신고 의무
	진료기간동안 제 3 자(간호사) 동반을 확인할 수 있다	
의사소 통/환자 의사관 계	환자가 수치심이나 자책감을 느끼지 않도록 적절한 질문기법 사용	
	환자의 협조와 동의를 얻고 상세한 설명을 하며 진료를 시행	
	환자에게 공감하고 배려하는 면담	

방문 목적	관계 형성	병원까지 오느라 고생 -> 면담 진행하려는데 ㅜㅜ? -> 병원 어쩌다 오셨을까요?
감별	* 성폭력 환자는 대부분 성 폭력을 당했다고 오기 때문에 바로 면담 진행	
문진 진입을 위한 비밀 보장 + PPI	PPI 멘트 + 비밀 보장 [PPI 멘트] 1) 용기내셔서 말씀해주셔서 감사합니다. 환자분의 상태가 걱정이 많이 되고 진심으로 도와드리고 싶습니다. 2) 오늘 이렇게 말씀하시는 것이 얼마나 힘들고 용기가 필요한 일인지 잘 알고 있습니다. [비밀 보장 멘트] 말씀해 주시는 것이 많이 힘들고 어려울것이라 생각 되지만, 오늘 저에게 말씀한 내용은 법적 제출이 필요한 경우와 치료 목적으로 불가피한 경우 외에는 법적으로 비밀이 보장되며, 절대 누군가에게 누설되지 않습니다. 이건 단순히 제가 약속 드리는게 아니라, 법으로 보장된 000 님의 권리이자 의사로서 저희의 의무이기도 합니다.	
문진 진입	1) 진료 과정 설명 + 동의서 받기 + 2) 제 3 자 동반 확인 + PPI -> 문진 진입 [진료 과정 설명] 진료 과정에 대해 간단히 설명을 드리겠습니다. (면담) 먼저 환자분께 있었던 상황에 대한 질문들을 몇 가지 할겁니다. (신체 진찰) 그 이후 성적 접촉이 있었던 부위를 포함해 전신을 진찰한 뒤, (사진촬영) 증거를 남기기 위해 사진을 촬영하고, (검체 채취) 검체를 채취하겠습니다. (환자존중) 사진 촬영과 검체 채취는 원치 않으실 경우, 시행하지 않을 것이며, 이 경우 진찰만 시행한 뒤 추가적으로 필요한 검사와 치료를 시행하도록 하겠습니다. 이 모든 과정을 의무기록지에 기록 됩니다. [동의서 받기] 이 모든 과정에 동의 하시면, 동의서에 서명하여 주세요 -동의서 받기- [제 3 자 동반] 진료 중에는 간호사, 상담사가 함께 있을 것이고, 면담을 함께 진행하기 원하는 믿을 만한 분이 있으시다면 함께 진료받으셔도 됩니다. + [PPI] 지금 자리는 편하신가요? 힘들면 언제든지 말해 주십시오. [문진 진입] 오늘 여쭙는 내용 중에 직설적이고 민감하게 느껴질 수 있는 부분도 있을 수 있는데요, 000 님의 정확한 상태 파악을 위해 꼭 필요한 질문들이니 최대한 답변해주시면 진료에 많은 도움이 될 것 같습니다. 물론 답변을 원치 않는 내용이 있으시면 그렇게 말씀하셔도 괜찮습니다. 최선을 다해 돕도록 할 테니 부담 없이 말씀해주세요.	
가해 상황	누가	가해자가 어떤 사람이었습니까? 아는 사람이었나요? → 모르는 사람이면 인상착의 몇 명이었나요? 목격자가 있었나요?
	언제	언제? 이전에도?
	어디서	어디서?
	어떻게	성적 접촉이 어디에 있었나요 -> 구강/질내/항문 가해자가 사정을 하였는지/질내사정인지 질외인지/콘돔을 사용하였는지 [물건] 물건을 사용하기도 했는지 [의식] 의식을 잃었는지/기억은 있었는지 [기타 폭력] 물리적 폭행이 동반되었는지/무기나 도구를 사용하였는지
가해자 정보 확인	(가해자가 아는 사람이라면) 전/중/후 전 - [성격] 평소 성격/주변 사람들과의 관계 중 - 술이나 약물 오남용 여부 후 - 폭력 행사 후 태도	
피해자 대처	사건 이후에 어떤 조치를 취하셨나요? - 경찰 신고	

	- 샤워나 목욕 - 옷 갈아입기 - 이 닦기 - 대변이나 소변 - 병원/사후 피임약 복용		
피해자	A	Open q	다른 아프거나 불편한 곳?
		우울증	우울/불안/자살사고 + 식욕저하/의욕/집중력저하
		타살사고	복수에 대해 생각 → 가해자를 죽이고 싶다는 생각이 든 적 있나요?
	(요약 ~)		
	외	수술/외상	
	과	과거 성폭력을 당한 적이 있습니까? 기저 질환 정신건강의학과 진료	
	약	복용 중인 약물	
	사	주위에 믿고 의지할 만한 사람 있는지?	
	가	-	
여	LMP/주기/규칙적/피임/ (애인) 마지막 정상적 성관계/이전 임신 여부		
최종 요약	대답하기 힘들셨을텐데 잘 대답해주셔서 큰 도움이 되었습니다. 지금까지 말씀하신 것을 정리해보면~		

Cf) 문진 진입 전 멘트들은 시간 분배상 조금 더 간략하게 해야 할 수도...

PEx	동의 구하기, 손 씻기 “이제 앞서 말씀드린대로 신체 진찰을 하고 증거물 채취와 사진 촬영을 하겠습니다. 외음부와 항문 진찰을 위해 노출이 필요합니다. 괜찮을까요? 이 모든 과정은 간호사를 동반하여 진행하겠습니다.”
	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈 2 입: 구강 내 상처 3 사지: 멍/상처/외상 꼼꼼히 사진 + 압통 여부 확인 + 골반내진: 외음부 사진 및 내진, 체모나 정액 등 증거물 채취 + 질분비물 검사 + DRE “협조해 주셔서 감사합니다. 진찰 중 불편하신 부분이 있었을까요?”

도입 및 PPI	오늘 면담에 응해주셔서 다시 한번 감사드립니다.		
마무리	진단 검사 및 치료	[진단]지금까지 말씀해주신 것을 종합해본 결과, 현재 OO 님이 겪고 계신 상황은 심각한 폭력에 해당합니다.오늘 000 님의 몸 상태를 확인해보니,--와 같은 손상이 있습니다. [검사] 그밖에 지금 감염이 있는지, 임신 가능성이 있는지 확인하기 위해 피를 뽑아 확인하고, 채취한 질 내 분비물 역시 균이나 다른 물질이 확인 되지 않는지 검사를 해볼 예정입니다. 검사를 진행해도 괜찮을까요? [치료]또한 000 님이 호소하시는 (정신과적 증상)의 경우 정신건강의학과 상담이 많은 도움이 될 것으로 보이는데, 상담을 한번 받아보시겠습니까? 오늘 입으신 상처에 대해서도 처치를 진행하여 빨리 아물 수 있도록 도와드리겠습니다. 또한 10 년내에 파상풍 예방접종을 맞은 적이 없다면, 파상풍 예방접종도 시행하겠습니다.	
		기본 검사	혈액검사(HBV, 매독혈청, HIV), 질분비물 검사, 소변임신반응검사
		우울	항우울제, 정신건강의학과 진료 자살사고 (+) -> 입원 권유
		멍/상처	상처 드레싱, 파상풍 주사, 전신 X ray, CT
	폭력의 부당함	다시 작성!!!	

	교육	임신	우선 많은 분들이 임신 가능성을 걱정하시기 때문에 이 부분부터 말씀을 드리겠습니다. 오늘 바로 임신반응검사를 해서 임신이 아닌 상태를 확인한 후에 응급피임약을 처방해 드리도록 하겠습니다. [용법] 성교 후 72 시간 이내에 복용해야 되고, 되도록 빨리 먹는 것이 좋습니다. 하지만 72 시간 내에 복용해도 3% 정도의 여성에서는 피임 실패가 있기도 합니다. 72 시간이 넘어가더라도 효과가 있을 수 있으니 먹는 것이 좋습니다. [부작용] 호르몬 약이기 때문에 몸에 영구적인 피해가 가는 것은 아니지만, 일시적으로 속이 메스껍거나 토할 수 있습니다. [주의사항] 약이 소화되는데 2 시간 정도 걸리는데, 소화되기 전에 토를 하셨다면 새로 한 알을 드셔야 합니다.
		성병	성병에 대해서는 모든 환자에게 예방적 치료를 시행합니다. 클라미디아. 임질, 편모충이 가장 흔하므로 예방할 수 있는 항생제를 드릴 예정입니다.
		에이즈	高.. 에이즈는 한 번의 성관계로 감염될 확률이 높지 않습니다. 항문성교가 감염 위험성이 가장 높으나 성교 1 회당 0.008~0.032 회 정도의 빈도로 알려져 있습니다. 성기 부위에 상처가 있거나 여러 번 성교하였거나 하면 감염 가능성이 더 높아질 수 있습니다. 바이러스 감염을 바로 확인할 수 있는 검사는 없습니다. 예방 치료는 비용이 비싸고 부작용이 있을 수가 있으므로 모든 환자분에게 권하지는 않습니다. 감염 여부는 6 개월이 지나야 확인이 가능하므로 그 시기에 다시 검사 여부를 여쭙겠습니다.
		트라우마	큰 일을 겪으셨기 때문에, 앞으로 한동안 갑자기 깜짝 놀라거나, 반대로 갑자기 멎해지는 일이 있을 수 있습니다. 비슷한 일을 겪은 사람 중에는 잠을 못 자거나 밥을 제대로 못 먹는 사람들도 있습니다. 이는 마음에 난 상처와 같습니다. 몸에 큰 상처가 나도 시간이 지나고 치료를 받으면 결국 아물 듯, 시간이 지나고 적절한 정신건강의학과 진료를 받으시면 충분히 나아지실 수 있는 증상들입니다. 000 님께서 다시 회복하여 일상으로 복귀하실 수 있도록, 저희가 최선을 다해 돕겠습니다.
	대처법		[지원체계] 지금 당장 어떻게 할지 모르겠다면 전문가의 도움을 받으실 수 있는데요, 국가에서 운영하는 기관인 해바라기센터에 연결해드리도록 하겠습니다. 해바라기센터는 00 님과 같은 일을 겪으신 분들을 대상으로 전문가들이 상담을 제공하고, 치료비와 소송 비용도 지원해주는 기관입니다. 분명 000 님께 많은 도움이 될 것입니다. [신고] 신고를 아직 못하셨다면 제가 도움을 최대한 드리겠습니다.
	법적 의무		[노인/아동성폭력] 특히 이 경우는 노인학대/아동학대에 해당하며, 노인학새/아동학대는 피해자를 가해자로부터 지키고 피해자의 안전은 위해서 의료진이 경찰에 신고할 의무가 있으며, 가해자는 수사 결과에 따라 처벌 받을 수 있습니다.
마무리	[재방문] 오늘 상처에 대해 필요한 처치를 해드릴텐데, 상처 드레싱 상태 확인하고 검사 결과에 대해 상의하기 위해 2 주뒤에 다시 오시길 바랍니다. 그 전에라도 상의하고 싶으신 내용이 있다면 언제든지 병원에 찾아와주세요. 마지막으로 오늘 병원에 너무 잘 오셨고 앞으로 저를 비롯해 많은 사람들이 00 님 도움 준비가 되어있으니 혼자서 걱정하지 마시고 언제든지 도움을 요청해주세요. 저를 믿고 어려운 말씀해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 더 궁금한 사항 있으신가요?		