

시험 과정 코멘트



보통 키가 작아서 온 케이스에서는 책상 위에 성장 발달 곡선이 제시되어 있습니다. 이에 맞춰서 보호자에게 현재 환자의 상태가 몇 %인지 설명하면 됩니다. 1년에 4cm 이상 자랐는지 여부를 확인하기 위해 보호자에게 물어보면 그 동안 키와 체중을 기록한 기록지를 제시해 줄 수 있습니다.

전반적 발달 지연이 의심되어 온 케이스에서는 소아과에서 배운 연령별 발달표가 주어질 수 있습니다. 따라서 이 표와 환자의 현 상태를 비교하며 설명해 주면 됩니다. 저신장의 정의는 같은 연령 및 성별 소아 표준 평균치의 -2.0SD 이하이거나 3백분위수 이하를 의미하므로 키가 작아서 온 환아가 이에 해당하는지 여부를 먼저 확인한 후에 문진을 하는 것이 좋습니다.

성장 /발달 지연 항목에서는 환자의 보호자가 매우 걱정하며 내원하는 경우가 많기 때문에 안심하도록 정확하게 설명하고, 질문 사항이 있는지 물어보도록 합니다. 조부모가 주 양육자인 경우에는 언어 자극이 적을 수 있기에 부모와 아이가 함께 하는 시간 동안은 충분히 아이와 놀아주고, 언어 자극을 제공할 수 있도록 교육합니다. 또한 이유식의 경우 4~6개월 사이에 시작하도록 교육하며, 늦은 경우 빨리 시작하도록 보호자를 교육합니다.

주소가 성장 지연인 경우 발달표 안 주는 경우가 있습니다. 이러한 경우를 대비해서 대략적인 발달 과정 외워두는 것이 좋을 것 같습니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

1차성 성장 장애 : 골격계의 내인적 결함으로 발생하는 저신장

- 골연령이 역연령에 비해 지연이 없음
- 성장 지연이 태생 전에도 존재하며, 태생 후에도 지속됨

2차성 성장 장애 : 외부의 환경적 인자에 의해 발생하는 저신장

- 성장 장애가 후천적으로 발생
- 원인 질환이 교정되면 성장 장애가 회복
- 골연령이 역연령에 비해 의미있게 저하됨

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
성장 지연	1차성	골격 형성 장애	[병력] 이유 없는 골절(osteogenesis imperfecta) 등 골격의 이상	[검사] 전신 단순 방사선 촬영 [치료] 정형외과적 수술, 운동, 물리 치료
		염색체 이상 (chromosomal abnormality) (터너증후군)	[병력] 생후 첫 3년간은 성장 정상, 이후 성장 속도 감소, 익상경, 작은턱, 외반주, 요로 기형, 골연령은 정상	[검사] 염색체검사 [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테린 공급
		선천대사 이상 (inborn errors of metabolism)	[병력] 신생아 대사 이상 선별검사에서 이상, 쥐오줌 등 특이적 병력	[검사] 혈중 암모니아 농도검사 이후 개별 대사체 검사 [치료] 부족한 대사체 보충/과잉한 대사체를 만드는 음식 섭취 제한
		자궁 내 성장 지연 (intrauterine growth retardation)	[병력] 난산의 병력, 신생아 중환자실 입원력, 임신 시의 문제	[검사] Brain 초음파, Brain MRI [치료] 태아 상태에 따라서 치료
		가족성★ 저신장	[병력] 부모님이 키가 작음, 성장 곡선의 이탈 없음, 골연령 감소 없음	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 경과 관찰
	2차성	영양 결핍	[병력] 영양을 제대로 공급받지 못함(Marasmus, Kwashiorkor, 비타민 결핍)	[검사] 혈중 영양소 측정 [치료] 영양 공급
		만성 전신성 질환	[병력] 장질환, 호흡기 질환, 신질환	[검사] 각 질환에 맞는 지표검사 [치료] 전신 질환에 맞는 치료
		정신사회성 저신장	[병력] 정서 박탈	[검사] 심리검사 [치료] 심리 치료
		성장 호르몬 결핍증★ (growth hormone deficiency)	[병력] 정상적인 신체 균형을 가진 병적 왜소증, 골연령 감소, 비정상적 성장 속도, 소하 약증	[검사] 혈중 IGF-1 농도검사, 인슐린 유발 저혈당검사 [치료] 성장 호르몬 투여
		갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 황달, 변비, 수유 지연, 피부가 두껍고 얼룩덜룩, 허두꺼움, 짧은 사지와 목, 지능 저하	[검사] 갑상샘기능검사(T3, T4, TSH, fT4) [치료] Levothyroxine 투여

성장 지연	2차성	거짓부갑상샘 저하증★ (pseudohypoparathyroidism)	[병력] 경련, 손목과 발의 경축 동근 얼굴, 짧은 목, 짧은 손과 발가락	[검사] 혈청 칼슘, PTH 농도 측정 [치료] Calcium gluconate
		체질성 성장 지연★	[병력] 늦은 사춘기 발현의 가족력, 성장 속도는 정상, 골연령 감소	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 안심

- 같은 연령, 같은 성의 어린이의 평균 신장보다 3백분위 수 미만인 경우 저신장
- 유전적으로 키 기대치 : 부모 키 평균 $\pm 6.5\text{cm}$ (남자는 +, 여자는 -)
- 3세 이상 사춘기 이전 소아의 성장률은 1년에 4cm 이상이 된다.
→ 가족성 저신장, 체질성 성장 지연은 모두 정상 범위 성장 속도
- 1년에 4cm도 못 자란다면 성장 호르몬 결핍을 의심
- 성장 속도가 매우 증가하고 골연령도 앞서 있다면 성조숙증을 의심

전반적 발달 지연 : 운동, 언어, 사회성 모두 발달 저하

국소적 발달 지연


① 언어발달 지연 : 언어, 사회성 발달 저하

② 운동발달 지연 : 운동만 발달 저하

자폐장애 : 언어, 사회성 발달장애

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
발달 지연	전 반 적	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 황달, 변비, 수유 지연, 두텁고 얼룩덜룩, 허두꺼움, 짧은 사지와 목, 지능 저하	[검사] 갑상샘기능검사 (T3, T4, TSH, fT4) [치료] Levothyroxine 투여
		저산소뇌병증 (hypoxic en- cephalopathy)	[병력] 난산의 병력, 신생아 중환자실 입원력, 임신 시의 문제	[검사] Brain 초음파, Brain MRI [치료] 산소 공급, 영양 공급 등 보존적 치료
		태아 알코올 증후군 (fetal alcohol syndrome)	[병력] 눈꺼풀의 틈새가 작고 소안 구증, 안검하수, 코가 짧고 위로 향함, 윗입술이 얇음	[검사] 임신 시 검사일듯 [치료] 임신 기간 동안 금주하여 예방

발달 지연	전 반 적	다운 증후군 (Down syndrome)	[병력] 등글고 납작한 얼굴, 낮은 코, 양 눈 사이가 멀어 보임, 지능 저하, 비만	[검사] 염색체검사 [치료] 주기적 검진, 예방접종
		터너 증후군 (Turner syndrome)	[병력] 생후 첫 3년 간은 성장 정상, 이후 성장 속도 감소, 익상경, 작은턱, 외반주, 요로 기형, 골연령 정상	[검사] 염색체검사 [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테인 공급
	언어 발달	발음장애 (dyslalia)	[병력] 말은 할 수 있으나 발음이 정확치 않음	[검사] 후두경으로 성대 이상 확인 [치료] 안면 구강 기형 있음, 치료, 언어 치료
		의사소통장애 (communication disorder)	[병력] 대근육, 소근육, 적응 발달은 정상이나 언어 발달만 느림	[검사] 청력검사, 뇌파검사 [치료] 언어 치료
		청력장애★ (hearing impairment)	[병력] 큰 소리가 나도 잘 돌아보지 못함, 신생아 청력검사 이상 소견	[검사] 청력검사 [치료] 중이염 관련 수술, 언어 교육
		자폐 스펙트럼 장애★ (autism spectrum disorder)	[병력] 친구들과 잘 놀지 못함(사회성 저하) 언어장애, 상동성 및 특이한 행동 반복	[검사] 청력검사, 뇌파검사, [치료] 부모 및 가족 교육 상담, 행동 치료
		체질 지연★	[병력] 부모가 사춘기가 늦었음, 말만 느리고 나머지는 다 정상적 소견	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 안심
	운동 능력	뇌성마비 (cerebral palsy)	[병력] 경직성 양측 운동 마비, 편마비형 보행 등	[검사] 뇌초음파, 자기공명영상 [치료] 재활 운동, 후방신경근절개술
		척수근위축증 (spinal muscular atrophy)	[병력] 심한 대칭적 근력 저하, 근육 긴장 저하, 개구리 다리 자세	[검사] 혈액 내 SMA 유전자 결손 확인 [치료] 보존적 요법



STEP 1 병력 청취

인적 사항	아이 생년월일이 언제인가요? (만 나이 확인)
성장	[현재] 키/몸무게/머리둘레 → 성장 곡선에 대입 [출생 시] 키/몸무게/머리둘레×출생 시 평균 : 키 50cm, 몸무게 3.3kg, 머리둘레 35cm 작년 한 해 동안 얼마나 컸나요? (증가 속도 확인하여 1년에 4cm 이상인지 확인) [청소년] 2차 성징은 있나요? (음모, 유방, 턱수염, 겨드랑이털, 목소리 변화)
발달	O (소아의 정상 발달표 보면서) 언제부터 발달이 느린 것 같나요?
	Co 이전에 할 수 있었던 것 중에서 지금 못하는 게 있나요? (퇴행성 뇌질환) 처음 증상이 그대로 인가요?/점점 심해지나요?
	발달이 어떻게 느린가요? (운동/언어/사회성 영역에서 어느 것이 느린지) 왜 느리다고 생각하시나요? <발달 과정 중 부모가 기억하기 쉬운 특징적인 것에 대해 묻기> [대운동] 아이가 잘 활동하나요?/고개를 언제 가누었나요? (3mo) 뒤집기를 언제했나요? (4mo)/배밀이나 기어가기는 언제했나요? (5mo) 혼자 앉을 수 있었던 것은 언제인가요? (7mo) 불잡고 서기는 언제했나요? (9mo) 돌 뜰 때는 걸음마를 떴었나요?(11mo)/두 돌 때는 뛰 수 있었나요? (2세) 암기법 운동 삼고 사둔 뒤 5밀리(밀리) 움직인 안찰현이 겨우 불잡구(9) 걸기(11) 시작했다. 설명 고개(3mo)/뒤집기(4mo)/배 밀이(5mo)/혼자 앉기(7mo)/불잡구 서기(9mo)/걸기(11mo)/뛰기(2세) C [적응] 물건을 손으로 칠 수 있나요? (4mo)/다른 손으로 옮겨 주나요? (7mo) 엄지와 검지를 이용해 집나요? (10mo) 달라고 하면 손에 쥐던 것을 주나요? (12mo) 블록놀이를 몇 개까지 쌓나요? (15mo)/낙서를 할 줄 아나요? (2세) [언어] 아이가 어느 정도까지 말하나요?/응알이는 언제했나요? (7mo) 마마빠빠 정도는 언제 말했나요? (10mo)/10개 단어 정도를 말하나요? (18mo) 간단한 문장을 구사할 수 있나요? (2세) [사회] 엄마 얼굴을 보면 웃나요? (2mo)/“까꿍”, “짜까꿍”은 잘했나요? (10mo) 옷을 입힐 때 자세를 맞추나요? (12mo)/원하는 것을 가리키나요? (15mo) 손가락질을 하나요? (2세)/세수를 할 수 있나요? (4세) 혼자 옷을 입고 벗을 수 있나요? (5세) 또래와 잘 어울리나요?/엄마나 다른 사람과 눈맞춤이 잘 안 되나요? (자폐증) 한 가지 물건에 집착하거나, 제한되고 반복적인 행동을 하나요? (자폐증)

	A	[청력] 큰 소리가 나면 깜짝 놀라나요? 소리가 나는 쪽으로 고개를 돌리나요?
주산기 문제		임신 시 어머니 나이가 몇 살이었나요?
		임신 중 산전 진찰에서 이상 소견 없었나요? (DM/HTN/태아 저산소증/선천성 감염)
		임신 중 약물이나 술, 담배, 커피를 드셨나요?
		임신 중 엽산, 철분제는 잘 드셨나요?
		분만 시 몇 주에 태어났나요? (미숙아)
		분만 시 자연분만이었나요?/제왕절개였나요? → (제왕절개 시) 왜 제왕절개하셨나요? 분만 시 아기에게 별 문제는 없었나요? (출산 질식)/선천성 기형이 있었나요? 분만 시 엄마에게 별 문제는 없었나요?
신생아 문제	외	입원하거나 수술한 적 있나요? 아기가 머리를 세게 부딪히거나 다친 적이 있나요? Catch down이 있는 경우, 두통/구토/다뇨/계단에서 넘어짐
	과	[검사] 신생아 대사이상검사/유전자검사/청력검사는 했나요? → 했다면 결과는 어땠나요? (갑상샘기능저하, 선천대사 이상, 청력 이상) [PMHx] 출생 후 지금까지 아픈 적 있나요? (CNS 감염, 중이염) → 황달로 치료 받은 적 있나요? → 경련으로 치료 받은 적 있나요? [접종] 예방접종은 제 때 맞고 있나요?
약		아기가 이전에 혹은 현재 복용하는 약이 있나요?
사		[성장 환경] 아기는 누구와 함께 사나요?/누가 아기를 돌보나요? (환경적 방치와 무관심) [식습관] 지금 모유/분유/이유식 먹고 있나요?/식습관은 어떤가요? (편식, 스트레스) [운동] 아기가 운동을 꾸준히 하나요? [수면] 아기가 잘 자나요?/몇 시에 자서 몇 시에 일어나나요?
가		형제/자매가 있나요? → 발달이 늦었던 아이가 있나요? (유전성 발육 지연)/지금은 어떤가요? (체질성 발육 지연) 엄마, 아빠 중 성장이 늦었던 사람이 있나요? (아빠의 사춘기/엄마의 초경) 엄마, 아빠의 현재 키와 체중은 어떤가요? → 예상 키(평균 $\pm 6.5\text{cm}$) 계산하기 가족 중 지적장애나 신경학적 질환이 있으신 분 계신가요?
PE		→ 소아 표준화 환자가 올 수 없으므로 생략합니다.

STEP 2 환자 교육

	성장 지연	발달 지연
	소아 발달은 한두 번의 검사로 정확히 알 수 있는 사항은 아닙니다(즉각적 결론 내리면 안 됨). 따라서 추적 관찰, 반복검사, 중재가 필요하므로 다음에 꼭 내원하셔야 합니다.	
공감	아이의 키가 작다고 생각하시어 많이 걱정이 되셨겠습니다.	아이의 발달이 느리다고 생각하시어 많이 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 지금 아이의 체중은 10백분위, 키는 5백분위로 작고, 성장 속도가 1년에 2cm 정도로 느린 편이므로 성장호르몬결핍증이 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 00이는 운동 발달은 나이에 맞게 발달 중이지만 언어나 사회적인 발달은 또래에 비해 다소 느리게 발달 중입니다. 또한 아이가 또래와 잘 어울리지 않고 혼자 있고 싶어하는 점도 생각해보면 조심스럽지만 자폐성 스펙트럼 장애를 배제할 수는 없을 것 같습니다.
감별 진단	하지만 부모님 분들의 키가 평균보다 작기 때문에 체질적인 성장 지연의 가능성도 배제할 수 없습니다.	하지만 청력장애나 의사소통장애 등 다른 질환도 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 손목 엑스레이를 찍어 성장판을 확인해 보고, 성장호르몬에 대한 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 정밀검사가 필요합니다. 문진만으로는 자폐성 스펙트럼 장애를 확진할 수 없고, 청력검사와 뇌파검사, 뇌 MRI 등이 꼭 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에 성장호르몬결핍증이 확진되면 성장 호르몬 주사를 주기적으로 맞았을 때 아이의 키가 크게 데에 도움을 줄 수 있습니다.	만약 자폐성 스펙트럼 장애라고 진단이 되더라도 언어 치료와 행동 치료를 받고, 부모님께서도 가족 교육을 받으시면 아이가 충분히 좋아질 가능성이 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 빠른 시기에 병원에 오셨기 때문에 좋은 결과를 기대해 볼 수 있습니다.	아직 나이가 어리기 때문에 치료를 받을 수 있고, 빠른 시기에 병원에 잘 오셨습니다.

교육	안심 [식이(아유식 점차 고형)] 아이가 골고루 영양을 섭취하여 잘 자랄 수 있게 도와주세요. [예방접종] 적절한 시기에 필요한 예방접종을 다 맞을 수 있도록 해주세요. [다양한 자극에 노출] 아이들은 자라는 시기에 다양한 자극이 필요합니다. 외부 활동을 많이 하며 운동도 적절히 하고, 또래 친구들과 어울려 놀 수 있도록 해주세요.	[자책하지 말 것] 가장 중요한 것은 아이의 발달이 느린 것이 부모님의 잘못이 아니라는 점입니다. 자책하지 마시고 치료 과정에 적극적으로 참여해 주세요. 저도 앞으로의 과정 속에서 최선을 다해 도와드리겠습니다.
질문	마지막으로 궁금한 점이 있으신가요?	

❖ 기본적 진단 계획

- ① 성장 지연 : 혈중 성장 호르몬 농도, Hand X-ray(골연령 측정)
- ② 발달 지연 : **한국형 영유아 발달검사, 조기언어 선별검사, 청력검사, 지능검사, 신경학적 이상검사**
- ③ 머리둘레 작으면 Brain CT/MRI
- ④ 혈액 : CBC, 전해질, 혈당검사, 소변검사, TFT
- ⑤ 대사이상검사, 뇌파검사, 근전도검사

❖ 치료 계획 : 언어 치료, 물리 치료, 작업 치료, 상담

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① ★ 소아 발달은 한두 번의 검사로 정확히 알 수 있는 사항이 아닙니다(즉각 결론 내리면 ×). 꾸준한 추적 관찰과 반복검사, 중재가 필요합니다.
- ② 치료는 장기적이고 주기적인 치료가 필요합니다. 원인 질환을 먼저 파악한 후 치료를 시작할 것이고, 재활 치료나 특수교육이 필요할 수도 있습니다. 유전 질환인 경우에는 유전 상담도 함께 할 수 있습니다.
- ③ **[안심]** 하지만 아이의 경우 조기 진단이 중요하므로 일찍 잘 오셨습니다. 조기에 치료를 시작한다면 장애 정도를 줄여서 삶의 질을 높일 수 있습니다.

- ④ 발달 도울 수 있는 조언 해줘야 함 : 할머니랑 같이 살면 바쁘더라도 외부 활동 시키고, 또래 친구 만날 수 있게 도와주세요.
(성장 지연) 제2급 성장기가 있으므로 성장 방해 요인을 제거(스트레스, 영양 불균형)



keyword

저신장/발달 지연으로 와도 각각을 모두 확인하기

성장 문진 : 현재, 출생 시의 신체 계측이 3분위수 미만/연 성장 속도 4cm 이상

발달 문진 : 대운동/적응/언어/사회적 발달 단계 및 퇴행 여부 확인하기

환자 교육 : 추적 검사의 필요성 강조 및 적절한 영양 및 자극 필요 강조

의사-환자 관계 : 정확한 사실을 기반으로 안심, 조기 진단의 중요성 강조

*의미있는 성장 지연 : 키, 체중 ≤ 3 percentile

저신장	일차성(골연령 정상)		이차성(골연령 감소)	
	가족성	유전 질환	가족성	유전 질환
골연령	정상	정상	↓	↓
사춘기 발현	정상		↓	↓
성장 속도 (NR : 4cm/yr)	정상	↓	↓	정상
특징	양친 신장 작음	염색체검사	넓은 얼굴, 이마 돌출, 복부 비만, 소약증	가족력(+) 성인 때 정상 신장

*기대 최종 신장

남아 = (아버지 키(cm) + 어머니 키(cm) + 13) / 2 $\pm$ 10cm

여아 = (아버지 키(cm) + 어머니 키(cm) - 13) / 2 $\pm$ 10cm

[소아의 정상행동발달표]


연령	운동 (Motor behavior)	적응 (Adaptive behavior)	언어 (Language behavior)	사회적 행동 (Social behavior)
~4주	팔다리를 구부리고 있다. Moro 반사, 파악 반사가 활발하다.	얼굴이나 불빛을 응시 한다.	목소리에 반응을 보인다.	사람의 얼굴을 선호한다.
4주 (1mo)	엎어 놓으면 턱을 들고, 머리 를 좌우로 돌린다. 긴장목반사의 자세로 누워있 는다.	사람을 쳐다본다. 움직이는 물체를 따라 본다.	미소 짓기 시작한다.	목소리에 반응하여 몸을 움찔거린다.
8주 (2mo)	엎어 배를 받쳐 들어올리면 머리를 몸과 수평이 되도록 든다. 긴장목반사의 자세로 누워있 는다.	움직이는 물체를 180°까 지 따라 본다.	다른 사람의 목소리를 듣 고, 자신의 목소리를 낸 다.	주위의 자극에 반응하여 미소 짓는다(social smile).
12주 (3mo)	엎어 놓으면 머리와 가슴을 든다. 수직인 자세가 된다. 팔을 펴고 있다. 머리를 가늠다. 엎어 배를 받쳐 들어 올리면 머리를 몸 위치보다 위로 든다.	물체를 보면 접근하지만 잡지는 못한다. 장난감을 보면 손을 흔 든다.	음악 소리에 귀 기울인다. “아~” 소리를 낸다.	사회적 반응 시간이 길어 진다.
16주 (4mo)	엎어 놓으면 머리와 가슴을 들어 머리가 수직인 자세가 된다. 다리를 펴고 있다. 머리를 가운데로 하고 대칭 자세로 누워 있다. 바로누운자세에서 불잡아 일 으켜 얹으면 머리를 가늠다.	물체에 손을 뻗어 잡고, 입으로 가져 간다. 작은 물체를 보기는 하나 잡으려 하지는 않는다.	크게 소리내어 웃는다.	먹을 것을 보면 좋아한다.
28주 (7mo)	뒤집는다. 엎어 놓으면 혼자앉아 있다. 배 밑이 뜨는 네 발로 걷다. 세우면 다리를 뻗어 몸을 지 탱한다.	다른 손으로 물건을 옮겨 친다. 작은 물체를 보면 갈고리 모양으로 손에 움켜친다.	여러 음절의 모음 소리를 낸다. “마~”, “바~”와 같은 소리를 낸다. 의미 없이 재잘거린다.	엄마를 더 좋아한다. 거울을 좋아한다. 상대방의 감정 변화에 반응한다.

40주 (10mo)	혼자 일어나 앉는다. 기어 다닌다. 붙잡고 일어선다. 가구 등을 붙잡고 걷는다.	엄지손가락과 집게손가락을 사용한다. 손수건 밑에 장난감을 감추면 찾아낸다.	반복되는 자음 발음을 한다(마마, 뽀뽀). 이름을 부르면 반응을 한다.	'까꿍', '찍찍꿍', '뽀이뽀이' 놀이를 한다.
12개월	혼자 일어선다. 혼자 걷는다.	알약 크기의 작은 물건을 엄지와 집게손가락을 사용한다. 달라고 하면 손에 쥐고 있던 물건을 손을 펴서 놓아 준다.	"마마", "뽀뽀" 외에 다른 말을 몇 개 정도 말한다.	간단한 공놀이를 한다. 옷을 입힐 때 자세를 맞춘다.
15개월	혼자 잘 걷는다. 계단을 기어 올라간다.	종이에 그리는 시늉을 한다. 입방체를 2개 쌓아 올린다.	뜻을 알 수 없는 말을 지껄인다. 친숙한 물건의 이름을 말한다. 간단한 것으로 한 가지를 지시하면 맞게 수행한다.	원하는 것을 손가락으로 가리키며 손가락질을 한다.
18개월	한 손을 잡고 층계를 올라간다. 뒤뚱거리며 뛴다.	입방체를 2개 쌓아 올린다. 흘려쓰기, 수직선을 흉내 내어 그린다. 병을 꺼꾸로 하여 작은 물체를 꺼낸다.	10개의 단어를 말한다. 신체 부위를 1개 이상 말한다.	혼자 먹는다. 소변을 보고 알려 준다. 문제가 있으면 도움을 청한다. 부모에게 입을 오므려 뽀뽀한다.
2년	잘 뛴다. 계단을 오르내린다.	6개의 정육면체를 쌓는다. 수평선을 그린다.	짧은 문장을 말한다. 그림책을 읽어주면 귀기울여 듣는다.	손가락질을 잘 한다. 간단한 웃은 혼자 뱉는다.
3년	세발자전거를 탄다. 한 발로 잠깐 서 있다.	원을 보고 그린다. 입방체 3개로 다리 모형을 만든다.	자신의 성별, 이름을 말한다. 셋까지 센다.	양말과 신발을 신는다. 손을 씻는다. 단추를 풀고 옷을 입는다.
4년	가위질하여 그림을 오려 낸다. 한쪽 발로 뛴다.	십자형과 사각형을 보고 그린다. 몸의 세 부분을 그린다.	줄거리가 있는 말을 한다. 전치사를 안다. 반대말을 안다.	양치질, 세수를 한다. 다른 아이와 협조적으로 논다. 혼자 용변을 해결한다.
5년	한 발을 번갈아 올리고 뛴다. 줄넘기를 한다.	몸의 여섯 부분을 그린다. 삼각형을 보고 그린다. 둘 중 더 무거운 것을 가려낸다.	기본 색을 안다. 단어의 의미를 물어본다. 열까지 센다.	혼자 옷을 입고 벗는다. 다른 아이와 경쟁적 놀이를 한다. 소꿉놀이를 한다.



[주의] 실제 시험장에서 표가 낡아서 헤멜 수 있으니 반드시 여러 번 연습하도록 합니다.

[남아(2~18세)]



[여아(2~18세)]

