

상담 상황

상황		상황(예시)
대상	배우자 학대★	우울하고 불안해 보임, 눈 주위 멍 및 회음부 상처, 여러 군데 멍자국 넘어지고 나서 배가 아프고 얼굴에도 멍이 들어 있음, 아이들도 때릴 수 있음
	노인 학대	거동이 불편한 당뇨병 걸린 노인을 아들이 고의로 약을 숨겨 놓고 주지 않음 의욕이 없어 보이고 불안함, 아들이 자꾸 양로원으로 보낸다고 협박
	아동 학대	잘 걷지 못하는 아이가 우측 허벅다리다리가 붓거나 여기저기 꼬집힌 흔적 엮어졌는데 온몸에 멍이 들고 쇄골 골절이 됨
신체적 학대		물리적인 힘이나 도구를 이용하여 직접 때리는 것 물건을 집어던지거나 어깨나 목 움켜쥐기, 가재도구를 부수는 것도 해당 됨
정신적 학대		폭언, 무시, 모욕/위협, 협박
성적 학대		원치 않는 성행위 강요/기타 유사 성교 관련 행위
경제적 학대		생활비를 주지 않는 행위, 재산의 사용에 대한 통제 등
방임		자식이 나이 든 부모나 어린 자식에게 밥 안주거나 더러운 데 두거나, 병원 안 데리고 가는 것

상담 플로우

STEP 1 병력 청취

	가정 폭력	성 폭력
관계 형성	병원까지 오시느라 고생 많이 하셨습니다. 지금부터 약 10분 정도 환자분과 면담을 진행해 볼텐데 괜찮으실까요? 진료 중에 불편한 점이 있으면 언제든지 말씀해 주세요.	

폭력 의심	가정 폭력 환자는 보통 멍과 상처를 주소로 오고, 넘어져서 부딪쳐서 등의 핑계를 댈다. - 상처를 한번 살펴보도록 하겠습니다. - O : 상처는 언제 생긴 건가요? - L : 상처가 어디어디에 있나요? - C : 상처가 어떻게 생기게 되었나요? - 제가 상처를 꼼꼼히 살펴보았는데, 상처들이 생긴 위치가 넘어지거나 부딪쳐서 생기기 어려운 곳인 것 같습니다. 그리고 발생한 시기도 제 각각이네요. 이러한 상처를 갖고 내원하시는 많은 분들은 누군가에게 폭력을 당하고 계신 경우가 많습니다. 혹시나 환자분께서 이런 어려운 일을 겪고 계시지는 않으신가요?	성 폭력 환자는 대부분의 경우 성 폭력을 당했다고 오기 때문에 바로 면담을 진행하면 된다.
비밀 보장	말씀해 주시는 것이 많이 힘들고 어려우실거라 생각이 되지만, 오늘 저에게 말씀하신 내용은 법적 제출이 필요한 경우와 치료 목적으로 불가피한 경우 외에는 비밀이 보장되며, 절대 누군가에게 누설되지 않습니다. 의무 기록은 법적으로 비밀이 보장됩니다.	
걱정 표현	저는 현재 환자분의 상태가 걱정이 많이 되고, 환자분을 진심으로 도와드리고 싶습니다. 저에게 부담 없이 말씀해 주시면 제가 알고 있는 것들을 바탕으로 최선을 다해 돕도록 하겠습니다.	
진료 과정 설명	힘드셨을텐데 솔직하게 말씀해 주셔서 감사합니다. 환자분께서 겪고 계신 상황에 대해 먼저 상담을 해드린 뒤에 상처에 대한 치료를 진행해보고자 하는데 괜찮으실까요? 지금 자리는 편하신가요? 힘들면 언제든지 말해 주십시오.	진료 과정에 대해 간단히 설명을 드리겠습니다. [면담] 먼저 환자분께 있었던 상황에 대한 질문들을 몇 가지 할 것입니다. [사진 촬영] 증거용으로 사진 촬영을 하게 됩니다. [신체 진찰] 또한 폭행당한 부위를 포함하여 전신과 생식기를 진찰하게 됩니다. [증거물 채취] 그리고 성적 접촉이 있었던 모든 부위에서 검체를 채취합니다. 폭행당한 지 72시간 이내이면 환자분 몸에 남아 있는 가해자의 증거를 찾을 가능성이 높기 때문입니다.

진료 과정 설명		증거물 채취를 원하지 않으면 하지 않을 것입니다. 그렇더라도 기본적인 병력에 대해 여쭙고 손상 부위 치료를 위해 필요한 검사와 치료는 시행하게 됩니다. 이 경우 의무기록지에 기록을 남기며, 역시 기밀이 보장됩니다. 어떠신가요? 동의하신다면 동의서에 서명하여 주세요. 암기법 비밀스러운 면담으로 사진 증거물 채(체)/증에 동의 설명 비밀 → 면담 → 사진 촬영 → 신체 진찰 → 증거물 채취 → 동의서 작성
존중	-	진료 중에는 간호사, 상담사가 함께 있을 것이고, 원하시면 믿을 만한 분과 함께 지내면서 진료받을 수 있습니다. 지금 자리는 편하신가요? 힘들면 언제든지 말해 주십시오. 충격이 크실 터이기에 말씀하시기 어려울 수도 있습니다. 그러나 환자분의 신체적 피해를 줄이고 가해자에 대한 법적 처벌을 위한 기본 자료로 활용되기 때문에 정확하게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 진료를 시작해도 되겠습니까?
폭력 상황 및 가해자 정보 확인	누가	누가 폭력을 행사하나요? 가해자는 어떤 사람이었습니까? (인상 착의, 특징)/아는 사람이었나요? 몇 명이었나요?/ 목격자가 있었나요?
	언제	언제 처음 때리기 시작하였나요? 언제 이런 일이 일어났나요?
	어디서	주로 어디서, 어떤 상황에서 폭행이 일어나나요? 어디서, 어떤 상황에서 성 폭행이 발생하였나요?
	횟수	얼마나 자주 때리나요? -
	양상	어떻게 때리나요?/도구를 사용해서 때리지는 않나요? 욕설(언어 폭력), 강제적 성관계(성 폭력), 밥을 굶김(경제적 폭력) 등이 동반되나요? ① 성적 접촉이 어디에 있었는지(질내 삽입, 구강, 항문성교) ② 콘돔을 사용하였는지? ③ 가해자가 사정을 하였는지, 어디에 하였는지? ④ 물건을 사용해서 성 폭행을 하였는지? 암기법 어둠사물

폭력 상황 및 가해자 정보 확인	기타 폭력	아이나 다른 가족들에게도 폭력을 행사하나요? ① 의식을 잃었는지?/기억은 있으신가요? (예) 음료나 음식 먹고 중독 증상 경험 or 자고 일어나 보니 옷이 벗겨져 있거나 성기 통증) ② 무기나 도구를 통한 위협이 있었나요? ③ 다른 신체적 폭행으로 인한 고통이 있었나요? 암기법 의무신고
	가해자 정보 (가해자가 아는 사람이라면) - 폭력이 없을 때 평소 성격은 어떤가요? - 주변 사람들과의 관계는 어떤가요? - 술이나 약물을 남용하고 있지는 않나요? - 폭행 후의 태도는 어떠한가요?	
환자의 대처 확인	폭행 상황에서 어떻게 대처하시나요? / 저항을 하시나요? 주변 사람들에게 폭행 사실을 알리셨나요?/도움을 청할 사람이 있나요? 어디 피해 있을 만한 장소가 있으신가요?	사건 이후에 어떤 조치를 하였는지? ① 샤워, 목욕, 좌욕 ② 옷갈아 입기 ③ 이닦기 ④ 대변, 소변 ⑤ 사후피임약
환자의 의학적 상태 확인	신체 증상 평가(환자가 호소하는 증상 중심으로) → 복통/흉통/두통/골절 정신적 상태 평가 → 우울/불안/불면/식욕 저하/집중력 저하 자살 사고/타살 사고(가해자를 죽이고 싶다)	
외	수술, 외상력	
과	평소 앓고 있는 질환이 있으신가요? (당뇨, 고혈압, 간염, 결핵, 알레르기) 이전에 정신건강의학과 진료 보신 적 있을까요?	
약	복용 중인 약물이 있으신가요?	
사	결혼 과정에서 문제가 있지는 않았나요? 경제적 어려움을 겪고 있지는 않나요?/의지할 만한 사람이 있나요?	
가	어렸을 때 가정 폭력을 당하신 적이 있나요?	
여	성 폭력이 없는 상황이라면 생략 가능	생리 : 마지막으로 생리하신 게 언제인지?/ 평소 월경 주기?/규칙성? 피임 : 피임을 하고 있는지? 최근 성관계 : 마지막으로 성관계를 가진 게 언제인지?

STEP 2 신체 검진

P / E	*가정 폭력의 경우 생략되는 경우가 많습니다. 이제 신체 진찰을 할텐데 괜찮으시겠어요?/앞서 말씀드린 대로 증거용 사진 촬영 및 증거물 채취를 시행해야 하며, 간호사를 동반하여 외음부 및 항문 진찰을 해야 합니다. [앉아서] 1. G/A : 전반적인 영양, 위생 상태 확인 2. 눈 : 빈혈, 충혈 3. 입 : 구강 성교의 흔적 확인 4. 사지 : 외상 부위 확인
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 골반 내진, 질분비물검사 - 외음부 시진 및 내진, 체모나 정액 등 증거물 채취 - 질분비물의 양상을 확인하고 및 채취하여 도말검사를 통해 감염을 확인 - Cervical motion tenderness 등 성병의 증거 확인 2. DRE : 항문 열상 등 항문 성교의 증거 확인 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 3 환자 교육

가정 폭력

공감	오랜 시간 동안 혼자서 많이 힘드셨겠네요. 000씨는 이 문제에 대해 어떻게 하실 생각하신가요?
폭력의 부당함	그 어떤 누구도 이런 대우를 받을 이유는 없습니다. 000씨는 충분히 가치 있는 사람입니다.
주변에 알리기	우선 폭력 사실을 주변에 알리고 도움을 요청해야 합니다. 계속 숨기시면 나머지 가족들에게까지도 해가 될 수 있습니다.
신고	또한 남편분의 행동은 법적으로 잘못된 행동입니다. 근본적인 해결을 하는 것이 가장 좋습니다. 원하신다면 현재 상태를 사진으로 찍어서 증거 자료로 제출하여 신고할 수 있습니다.

대처법	비슷한 상황이 다시 발생하였을 때 대처할 수 있는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 위급 상황에는 112나, 보건복지부 129, 여성긴급전화 1366 등에 전화하시면 도움 받으실 수 있습니다. 이것은 심각한 문제이고, 가정에 국한된 문제가 아니라 사회 문제이므로 근절을 위해 모두가 노력해야 합니다. 가족상담 등의 치료도 진행할 수 있습니다. 또한 피신할 곳이 없으시다면 제가 쉼터를 소개해 드릴테니 자녀분과 함께 남편과 떨어져서 그곳에 계시는 것이 좋을 것 같습니다. 암기법 ▶ 앞의 두 숫자 <11, 12, 13>으로 외우기!
마무리	많이 힘드셨을텐데 이번 기회에 병원에 오셨으니 제가 도움을 드리고 싶습니다. 혼자서 걱정하지 마시고 주위에 도움을 요청해 주세요. 병원에 오시면 상처 부위에 대해서는 치료해 드리도록 하겠습니다. 저를 믿고 어려운 말씀해 주셔서 감사합니다.
질문	더 궁금한 사항 있으신가요?

성 폭력

공감	이런 일을 당하셔서 많이 놀라고 힘드셨겠습니다./어떤 점이 가장 걱정되시나요? 하지만 그 어떤 누구도 이러한 대우를 받을 이유는 없습니다. 000님은 가치 있는 사람입니다.
임신	우선 많이 걱정되는 부분일 임신 예방에 대해 알려드리겠습니다. 오늘 바로 임신반응검사를 해서 임신이 아닌 상태임을 확인한 후에 응급피임약을 처방해 드리도록 하겠습니다. 성교 후 72시간 이내에 복용해야 하고, 되도록 빨리 먹는 것이 좋습니다. 하지만 72시간 내에 복용해도 3% 여성에서는 피임 실패가 있기도 합니다. 72시간이 넘어도 효과가 있으니 먹는 것이 좋습니다. 욕지기질이 나거나 토하는 부작용도 있을 수 있음을 알려드립니다.
성병 예방	성병에 대해서는 모든 환자에게 예방적 치료를 시행합니다. 클라미디아, 임질, 편모충 등이 가장 흔하므로 예방할 수 있는 항생제를 드릴 예정입니다.

에이즈	에이즈는 한 번의 성관계로 감염될 확률이 높지 않습니다. 항문성교가 감염 위험성이 가장 높으나 성교 1회당 0.008~0.032회 정도의 빈도로 알려져 있습니다. 성기 부위에 상처가 있거나 여러 번 성교하였거나 하면 감염 가능성이 더 높아질 수 있습니다. 바이러스 감염을 바로 확인할 수 있는 검사는 없습니다. 예방 치료는 비용이 비싸고 부작용이 있을 수가 있으므로 모든 환자분에게 권하지는 않습니다. 감염 여부는 6개월이 지나야 확인이 가능하므로 그 시기에 다시 검사 여부를 여쭙겠습니다.
치료 방침	상처 치료제도 드릴 것이고, 파상풍 예방주사를 맞지 않으셨다면 이 또한 시행하도록 하겠습니다.
해바라기 센터 및 마무리	국가에서 관리하는 해바라기 센터에 의뢰해 드리겠습니다. 여기에서 추가로 필요한 조치도 취할 수 있고, 피해자에 대한 치료비 지원이나 소송 비용까지도 지원을 받을 수 있습니다. 상처 치료를 위해서 2주 후 다시 방문해 주십시오.

❖ 검체 채취

- ① 우드등검사로 sperm 검출
- ② 회음부 빗질하여 체모 따로 보관(가해자 체모 섞여 있을 수도 있기 때문)
- ③ 질액 채취(정액)/손톱 밑/채혈(매독, 혈중 β -hCG, 혈액형, 알코올, 약물 농도)/소변(정자, 외상)
- ④ 질, 회음부, 직장 혹은 구강 및 비강에서 도말 채취 : Acid phosphatase, ABO 항원, Sperm precipitins 측정

❖ 초기 검사

- ① 임신반응검사/Hepatitis B/Cervix, mouth, rectum 배양(N. Gonorrhoeae, Chlamydia, HSV)
- ② Wet smear for trichomonas
- ③ Syphilis serologic test
- ④ HIV 항체검사