

44-1 음주 상담

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
환자의 음주량과 빈도 에 대해서 질문하였다.				
음주의 양 이 점차 늘어나는지 물어보았다.				
음주를 시작한 시기 및 이유에 대해서 질문하였다.				
금주를 결심하게 된 계기 에 대해서 질문하였다.				
CAGE(Cut, Annoyed, Guilty, Eye-opener)에 대해서 질문하였다.				
과거 금주 를 시도한 경험과 실패 이유 에 대해서 질문하였다.				
의존/금단 증상 에 대해서 질문하였다(불안, 불면, 손떨림, 구토).				
알코올 남용 으로 인한 증상에 대해서 질문하였다.				
현재 신체 증상(소화기, 정신, 신경계)에 대해서 물어보았다.				
음주로 인해 기억 이 끊긴 적 있는지 물어보았다.				
음주로 인하여 일상 생활에 지장 이 있는지 물어보았다.				
간질환이나 정신 질환의 가족력 에 대해서 질문하였다.				
복용하는 약물 에 대해서 질문하였다.				
과거에 앓았던 질환 이나 앓고 있는 질환 에 대해서 질문하였다.				
음주의 단점 과 금주의 장점 에 대해서 물어보았다.				
술로 인해 법적인 문제가 있었는지 확인하였다.				
신체 진찰(필요 시)		잘함	보통	미흡
환자에게 황달이 있는지 피부와 공막을 확인하였다.				
안구진탕이 있는지 확인하였다.				
Flapping tremor와 손바닥에 땀이 있는지 확인하였다.				
복부 진찰을 순서에 맞게 시행하고 간비대 및 복수 여부를 확인하였다.				

신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
알코올 의존에 대한 신체적, 정신적 문제에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			
금주 계획을 세우고 실천하도록 교육하였다.			
금단 증상을 줄여주고 금주를 도와줄 약물 치료 에 대해서 설명하였다.			
주기적인 상담을 위해 다음 내원 일 을 설정하였다.			
환자에게 음주의 단점과 금주의 장점에 대해서 물어보았다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			



Memo