



### CHCMU

## 临床常见问题

- ✓ 支气管肺炎的典型临床表现?
  发热、咳嗽、气促、发绀、肺部固定细湿罗音。
- ✓ 没有发热、咳嗽,只是有点儿吐奶、呛奶,就是肺炎了? 新生儿肺炎,尤其是疾病初期,临床表现不典型,气促、唇周微绀是较常见的临床表现。如果咳嗽,或/和肺部啰音明显,通常提示病情较重。
- ✓ 昨天只是有点儿呛奶,已经输液、吃药了,怎么今天咳嗽更明显,还 发热、奶量下降?

由于新生儿免疫功能及呼吸道结构等特点,新生儿肺炎易并发呼吸衰竭、 败血症等严重情况。



## 新生儿肺炎

## 褫 述

- ✓ 普遍性: 新生儿期常见疾病
- ✓ 危害性:引起新生儿死亡的重要原因
  - ✓ 病死率: 5%-20%
- ✓ 复杂性:
  - ✔ 发生时机: 宫内、产时、生后
  - ✓ 病因多样: 吸入(羊水、胎粪、奶汁), 感染 (细菌、病毒、衣原体、真菌)
  - ✓ 病情与转归不一






## 新生儿肺炎

### 临床表现


- ✓ 进展快, 易累及多器官系统
  - ✓ 呼吸窘迫(气促、发绀、 鼻扇、三凹征)、呼吸衰竭、 肺出血; 气胸、胸腔积液
  - **✓** PPHN、心力衰竭、休克
  - ✓ 内环境紊乱(低钙血症、低血糖、酸中毒)、凝血功能 障碍、DIC、脑损伤、败血症
  - ✓ 可致命: 死胎









# 胎養吸入性肺炎 核 述 ✓ 发生率: ✓ 羊水粪染发生率: 5%-15%, 其中5%-10%发生 MAS; MAS中10%-20%并发气胸, 5%死亡。 ✓ 多见于过期产儿、足月儿 ✓ 胎龄34周以下少见 ✓ 羊水粪染发生率: 过期产儿/足月儿 ≥ 2/1 ✓ MAS发生率: 过期产儿/足月儿 = 8/1



## 



## 新生儿感染性肺炎 病原体 ✓ 与感染途径有关: ✓产前感染(宫内感染、先天性肺炎) ✓ 血行感染: CMV、HSV、风疹病毒等 ✓ 上行感染: 产道内细菌, e.g. 大肠杆菌、GBS、支原体 ✓产时感染: 胎腺早破、滞产、产道检查过多 ✓ 上行感染: 产道内细菌 ✓产后感染: 日常护理不当、血行感染、医源性("手"、VAP) ✓ 大肠杆菌、葡萄球菌,警惕机会致病菌











## 新生儿肺炎 辅助检查 ✓ 实验室检查 ✓ 胸部影像学

✔ 肺炎较重、治疗困难时

- ✓ 心脏彩超检查:
  - ✓ 有无基础疾病(先天性心脏病)、并发症(PPHN)

www.chcmu.com

# ★ 生 儿 肺 炎 格 床 诊 斯 ✓ 是否新生儿肺炎: ✓ 全面采集病史: 孕产期情况、新生儿症状 ✓ 细致查体: 生命体征、心肺情况 ✓ 新生儿肺炎病情评估: ✓ 临床表现, 铺证估: ✓ 临床表现, 有无并发症? ✓ 新生儿肺炎的病因诊断: ✓ 吸入性肺炎, 感染性肺炎? ✓ 有无基础疾病?



