

T-PMTH-402 – Math. appliquées à l'info.

Chapitre 5 – Induction

Jean-Sébastien Lerat
Jean-Sebastien.Lerat@heh.be



Haute École en Hainaut

2019-2020

Plan

- 1 Introduction
- 2 Induction faible
- 3 Induction forte
- 4 Induction généralisée
- 5 Exercices

Introduction

Induction

L'**induction** permet de définir des éléments ou propriété par récurrence.

Cas de base prouve que la démonstration est vérifiée sur les premières valeurs possibles.

Cas général prouve que la démonstration est vraie pour le cas général en s'appuyant sur le(s) cas de base.

Plan

- 1 Introduction
- 2 Induction faible**
- 3 Induction forte
- 4 Induction généralisée
- 5 Exercices

Induction faible

Objectif

Prouvez qu'une propriété P est vraie $\forall n \in \mathbb{N}$

Cas de base $P(0)$.

Cas général prouvez que $\forall n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ est vrai, alors $P(n+1)$ est vrai.

Induction faible

Exemple d'induction faible

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0, \sum_{i \in N}^{i=n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cas de base $n = 1$, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$

Cas général On suppose que

$$n-1 \in \mathbb{N}, n-1 > 0, \sum_{i \in N}^{i=n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}$$

est vrai pour $n-1$. Prouvons que c'est vrai pour n :

$$\underline{n} : \underbrace{\frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}}_{\text{par hypothèse}} + n$$

Induction faible

Exemple d'induction faible

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0, \sum_{i \in N}^{i=n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cas de base $n = 1$, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$

Cas général On suppose que

$$n-1 \in \mathbb{N}, n-1 > 0, \sum_{i \in N}^{i=n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}$$

est vrai pour $n-1$. Prouvons que c'est vrai pour n :

$$\underline{n} : \underbrace{\frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}}_{\text{par hypothèse}} + n = \frac{(n-1)n}{2} + \frac{2n}{2}$$

Induction faible

Exemple d'induction faible

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0, \sum_{i \in N}^{i=n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cas de base $n = 1$, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$

Cas général On suppose que

$$n-1 \in \mathbb{N}, n-1 > 0, \sum_{i \in N}^{i=n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}$$

est vrai pour $n-1$. Prouvons que c'est vrai pour n :

$$\begin{aligned} n : & \underbrace{\frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}}_{\text{par hypothèse}} + n = \frac{(n-1)n}{2} + \frac{2n}{2} \\ &= \frac{(n+1)n + 2n}{2} \end{aligned}$$

Induction faible

Exemple d'induction faible

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0, \sum_{i \in N}^{i=n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cas de base $n = 1$, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$

Cas général On suppose que

$$n-1 \in \mathbb{N}, n-1 > 0, \sum_{i \in N}^{i=n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}$$

est vrai pour $n-1$. Prouvons que c'est vrai pour n :

$$\begin{aligned} n : & \underbrace{\frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}}_{\text{par hypothèse}} + n = \frac{(n-1)n}{2} + \frac{2n}{2} \\ & = \frac{(n+1)n + 2n}{2} = \frac{n(n-1+2)}{2} \end{aligned}$$

Induction faible

Exemple d'induction faible

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0, \sum_{i \in N}^{i=n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cas de base $n = 1$, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1$

Cas général On suppose que

$$n-1 \in \mathbb{N}, n-1 > 0, \sum_{i \in N}^{i=n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}$$

est vrai pour $n-1$. Prouvons que c'est vrai pour n :

$$\begin{aligned} n : \underbrace{\frac{(n-1)((n-1)+1)}{2}}_{\text{par hypothèse}} + n &= \frac{(n-1)n}{2} + \frac{2n}{2} \\ &= \frac{(n+1)n + 2n}{2} = \frac{n(n-1+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

Plan

- 1 Introduction
- 2 Induction faible
- 3 Induction forte**
- 4 Induction généralisée
- 5 Exercices

Induction forte

Objectif

Prouvez qu'une propriété P est vraie $\forall n \in \mathbb{N}$

Cas de base $P(0)$.

Cas général Sous l'hypothèse que $P(0), \dots, P(n)$ soient vraies, prouvez que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vrai.

Induction forte

Exemple d'induction forte

$$\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

Cas de base $n = 0, n = 0 \times 2^0 = 0 \times 1 = 0$

Cas général On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

est vrai pour n .

$k > n$:

- si k est pair alors $k = \frac{k}{2} + \frac{k}{2}$, or $\frac{k}{2} < k$ car $\frac{k}{2} \in \mathbb{N}$

Induction forte

Exemple d'induction forte

$$\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

Cas de base $n = 0$, $n = 0 \times 2^0 = 0 \times 1 = 0$

Cas général On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

est vrai pour n .

$k > n$:

- si k est pair alors Par hypothèse, $\forall n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i$

en particulier $\frac{k}{2} = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i,$

Induction forte

Exemple d'induction forte

$$\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

Cas de base $n = 0, n = 0 \times 2^0 = 0 \times 1 = 0$

Cas général On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

est vrai pour n .

$k > n$:

• si k est pair alors Par hypothèse, $\forall n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i$

$$\text{en particulier } \frac{k}{2} = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad \frac{k}{2} + \frac{k}{2} = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i + \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_j 2^i$$

Induction forte

Exemple d'induction forte

$$\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

Cas de base $n = 0, n = 0 \times 2^0 = 0 \times 1 = 0$

Cas général On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_j \in \{0, 1\}$$

est vrai pour n .

$k > n$:

- si k est pair alors $\frac{k}{2} + \frac{k}{2} = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i + \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i$

$$= 2 \times \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i = \sum_{j \in \mathbb{N}}^{j=d+1} a_j 2^j$$

Induction forte

Exemple d'induction forte

$$\forall n \in \mathbb{N}, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

Cas de base $n = 0$, $n = 0 \times 2^0 = 0 \times 1 = 0$

Cas général On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < k, n = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i, \quad a_i \in \{0, 1\}$$

est vrai pour n .

$k > n$:

- si k est impair $k - 1$ est pair donc prouvé précédemment.

$$(k - 1) + 1 = \left(\sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i \right) + 1 = \left(\sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i \right) + 2^0 = \sum_{i \in \mathbb{N}}^{i=d} a_i 2^i$$

de $k - 1$ à k , a_0 passe de 0 à 1 (pair à impair)

Plan

- 1 Introduction
- 2 Induction faible
- 3 Induction forte
- 4 Induction généralisée
- 5 Exercices

Induction généralisée

Objectif

Utiliser le principe d'induction sur tous les types d'ensemble.

Pour cela, il faut définir le type d'objets à l'aide d'un schéma d'induction.

Schéma d'induction

Un **schéma d'induction** ($\underbrace{B}_{\text{Ensemble de base}}$, $\underbrace{R}_{\text{Ensemble de règles}}$) définit un ensemble

E s'il est construit comme :

- ❶ $\forall e \in B, e \in E$
- ❷ $\forall r \in R, \text{ si } e_1, \dots, e_n \in E \text{ et } e_1, \dots, e_n \rightarrow e, (^a) \text{ alors } e \in E.$

$a.$ Peut être vu comme une fonction $r(e_1, \dots, e_n)$

Induction généralisée

Schéma d'induction

Un **schéma d'induction** ($\underbrace{B}_{\text{Ensemble de base}}$, $\underbrace{R}_{\text{Ensemble de règles}}$) définit un ensemble

E s'il est construit comme :

- 1 $\forall e \in B, e \in E$
- 2 $\forall r \in R$, si $e_1, \dots, e_n \in E$ et $e_1, \dots, e_n \rightarrow e$, (a) alors $e \in E$.

a. Peut être vu comme une fonction $r(e_1, \dots, e_n)$

Induction de \mathbb{N} , $E = \mathbb{N}$

E	B	R
\mathbb{N}	<ul style="list-style-type: none"> $B = \{0\}$ $B_1 = \{0\}$ $B_2 = \{0, 1, p\}$, p est premier 	$R : n \rightarrow n + 1$ $R_1 : n \rightarrow 2n$ $n \rightarrow 2n + 1$ $R_2 : n, m \rightarrow nm$

Plan

- 1 Introduction
- 2 Induction faible
- 3 Induction forte
- 4 Induction généralisée
- 5 Exercices

Exercices

Prouvez par induction :

❶ a) $\sum_{k=0}^n (2k+1) = (n+1)^2$, dans \mathbb{N}

b) $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$, dans \mathbb{N}

❷ $\forall n \in \mathbb{N}, n < 2^n$

❸ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4, 2^n < n!$

❹ $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ est divisible par 3

❺ $\forall n \in \{m \in \mathbb{N} | m \geq 2\}, n$ est le produit de nombres premiers

Soit le schéma d'induction (B, R) où $B = \{\epsilon\}$ et R contient les règles suivantes :

$$u, v \rightarrow uavb$$

$$u, v \rightarrow ubva$$

Montrez que

❶ le schéma permet d'engendrer les mots de formes **xayb**

❷ le schéma engendre exactement les mots ayant autant de **a** que de **b**

❸ il y a deux manières d'engendrer **baba**

Solution

Prouvez par induction :

❶ a) $\sum_{k=0}^n (2k + 1) = (n + 1)^2$, dans \mathbb{N}

Induction faible, cas de base $n = 0$:

$$\sum_{k=0}^0 (2k + 1) = 2 \times 0 + 1 = 1 \Leftrightarrow (0 + 1)^2 = 1^2 = 1$$

Cas général n : sous l'hypothèse de $\sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1) = (n - 1 + 1)^2 = n^2$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (2k + 1) &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1)}_{\text{par hypothèse d'induction}} + (2n + 1) = n^2 + (2n + 1) = \\ &= (n + 1)(n + 1) = (n + 1)^2 \end{aligned}$$

Solution

Prouvez par induction :

❶ b) $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$, dans \mathbb{N}

Induction faible, cas de base $n = 0$:

$$\sum_{k=0}^0 2^k = 2^0 = 1 \Leftrightarrow 2^{0+1} - 1 = 2^1 - 1 = 1$$

Cas général n : sous l'hypothèse de $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^{(n-1)+1} - 1 = 2^n - 1$:

$$\sum_{k=0}^n 2^k = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k}_{\text{par hypothèse d'induction}} + 2^n = (2^n - 1) + 2^n = 2 \times 2^n - 1 =$$

$$2^1 \times 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$$

Solution

Prouvez par induction :

② $\forall n \in \mathbb{N}, n < 2^n$

Cas de base 0 : $0 < 1$,

Cas de base 1 : $1 < 2$.

Cas général n :

$$\overbrace{n - 1 < 2^{n-1}}$$

par hypothèse d'induction faible

Lorsque l'on ajoute 1 de chaque côté de l'inégalité, elle est préservée :

$$n - 1 + 1 < 2^{n-1} + 1, \quad \text{somme d'entiers positifs}$$

Montrons que $2^{n-1} + 1 < 2^n$ et par transitivité $n - 1 + 1 (= n)$ sera $< 2^n$. Nous savons que

$$2^{n-1} \leq 2^{n-1} \quad (1)$$

$$1 < 2^{n-1} \quad \text{car } n \geq 2 \text{ sinon cas de base} \quad (2)$$

En sommant les inégalités (1) et (2) (sens préservé car somme d'entiers positifs) on obtient :

$$2^{n-1} + 1 < 2^{n-1} + 2^{n-1} \Leftrightarrow 2^{n-1} + 1 < 2 \times 2^{n-1} \Leftrightarrow 2^{n-1} + 1 < 2^n$$

Solution

Prouvez par induction :

$$\textcircled{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4, 2^n < n!$$

Cas de base 4 : $2^4 < 4! \Leftrightarrow 16 < 24$.

Cas général n : $\underbrace{2^{n-1} < (n-1)!}_{\text{par hypothèse d'induction faible}}$

On veut montrer que pour n , la propriété est vérifiée. Nous savons qu'en multipliant par 2, la propriété de $n-1$ est toujours valide car multiplication entière > 0 :

$$2^{n-1} \times 2 < (n-1)! \times 2, \quad \text{car multiplication par un entier positif}$$

Or $2^{n-1} \times 2 = 2^{n-1+1} = 2^n$ et $(n-1)! \times 2 < (n-1)! \times n$ car $n \geq 4$ et $4 > 2$. Or $(n-1)! \times n = n!$ d'où :

$$2^n < n!$$

Solution

Prouvez par induction :

❶ $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ est divisible par 3

Cas de base 0 : $0^3 - 0 = 0$ div. par 3.

Cas de base 1 : $1^3 - 1 = 0$ div. par 3.

Cas de base 2 : $2^3 - 2 = 6$ div. par 3.

Notons que $n^3 - n = n[(n-1)(n+1)]$

Cas général n :

Par hypothèse $n-1$, $(n-1)^3 - (n-1)$ est divisible par 3.

$\Rightarrow (n-1)[((n-1)-1)((n-1)+1)] = (n-1)[(n-2)(n)]$

\Rightarrow Soit $n-2$, soit $n-1$, soit n est divisible par 3.

- **si n est divisible par 3** alors $n^3 - n = n[(n-1)(n+1)]$ est divisible par 3 car multiple d'un multiple de 3.
- **si $n-1$ est divisible par 3** alors divisible par 3 (même raison)
- **si $n-2$ est divisible par 3** alors tout multiple de 3 additionné à $n-2$ est divisible par 3 car multiple de 3. En particulier $n-2+3$ est divisible par 3. Or $n-2+3 = n+1$ donc $n+1$ est divisible par 3, ce qui implique que $n^3 - n = n[(n-1)(n+1)]$

Solution

Prouvez par induction :

- ⑤ $\forall n > 1, n \in \mathbb{N}, n$ est le produit de nombres premiers

Cas de base 2 : $2 = 1 \times 2$.

Hypothèse d'induction forte, cas général n :

Si n est divisible par q , alors n est de la forme $n = p \times q$

- Soit $q < n$ alors $p < n$ car division/multiplication entière. Par hypothèse d'induction forte, on sait que p et q sont décomposables en un produit de nombres premiers :

$$p = \prod_{i \text{ premier}} i, q = \prod_{j \text{ premier}} j$$

$$\text{alors } n = p \times q = \prod_{i \text{ premier}} i \prod_{j \text{ premier}} j$$

- Soit $q = n$ et n n'est pas divisible par un nombre plus petit que lui-même. Alors n est de la forme $n = 1 \times n$ où n est premier (non divisible par un autre nombre).

Solution

Soit le schéma d'induction (B, R) où $B = \{\epsilon\}$ et R contient les règles suivantes :

$$u, v \rightarrow uavb$$

$$u, v \rightarrow ubva$$

Montrez que

- ❶ le schéma permet d'engendrer les mots de formes $x\mathbf{a}y\mathbf{b}$ **règle 1**
- ❷ le schéma engendre exactement les mots ayant autant de **a** que de **b** **B contient le mot vide ϵ . Le mot de base ne se compose donc d'aucun a et d'aucun b . La règle 1 ajoute exactement un a et un b tout comme la règle 2. Il est possible de montrer par récurrence que le nombre de a = nombre de b .**
- ❸ il y a deux manières d'engendrer **baba** **Prenons $u = \epsilon$ et $v = \epsilon$, $u, v \in B$.**
 - ❶ $mot_1 = \epsilon, \epsilon \rightarrow \epsilon a \epsilon b = ab$
 $u = \epsilon, v = mot_1, \quad mot_2 = \epsilon, ab \rightarrow \epsilon b ab a = baba$
 - ❷ $mot_1 = \epsilon, \epsilon \rightarrow \epsilon b \epsilon a = ba$
 $u = mot_1, v = \epsilon, \quad mot_2 = ba, \epsilon \rightarrow ba b \epsilon a = baba$