

Chapter 7

Bilinear and Quadratic Forms

10/18: • **Bilinear form:** A function $L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$L(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) = \alpha L(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \beta L(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) \quad L(\mathbf{x}, \alpha \mathbf{y}_1 + \beta \mathbf{y}_2) = \alpha L(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \beta L(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2)$$

– $L(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (A\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

• **Quadratic form:** A bilinear form $L(\mathbf{x}, \mathbf{x})$.

– (\mathbf{x}, \mathbf{x}) is a polynomial of degree 2 in $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$:

$$L(\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}) = (\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}) = \lambda^2 (\mathbf{x}, \mathbf{x})$$

• We have that

$$(A\mathbf{x}, \mathbf{x}) = (A\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}) = \lambda^2 (A\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \sum_{j,i=1}^n \alpha_{j,i} \mathbf{x}_i \mathbf{x}_j$$

• The general form of a quadratic form:

– Can any quadratic form on \mathbb{R}^n be written as $(A\mathbf{x}, \mathbf{x})$?