
A Bulk network
(4 modules; 0 at FDR < 0.05)
bulk_M2 (247)
bulk_M4 (35)
bulk_M1 (2410)
bulk_M3 (100)
−0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
r with non-healing (95% CI)
B Single-cell pseudobulk network
(11 modules; 0 at FDR < 0.05)
sc_M9 (43)
sc_M6 (64)
sc_M2 (757)
sc_M11 (32)
sc_M4 (158)
sc_M1 (774)
sc_M10 (36)
sc_M8 (45)
sc_M3 (444)
sc_M5 (64)
sc_M7 (45)
−0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
r with non-healing (95% CI)
C Module overlap between networks
(* FDR < 0.05; 5 of 44 pairs)
bulk_M1
bulk_M2
bulk_M3
bulk_M4
sc_M1 sc_M2 sc_M3 sc_M4 sc_M5 sc_M6 sc_M7 sc_M8 sc_M9 sc_M10 sc_M11
Jaccard overlap
0.200 0.175 0.150 0.125 0.100 0.075 0.050 0.025 0.000
D 129-gene candidate panel
(125 recovered in the full dataset)
109/113
13/13
3/3
panel genes
recovered in the full dataset
genes
0 20 40 60 80 100
3 4 5
discovery evidence sets
supporting the gene