Uw naam: Naam van arts (die filgotinib heeft voorgeschreven): Telefoonnummer van arts:

De datum waarop u begon

met filgotinib:

Draag deze kaart tijdens gebruik van filgotinib altijd bij u en laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die betrokken is bij uw zorg of behandeling, zoals een apotheker of spoedarts.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www. lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Bijwerkingen met betrekking tot filgotinib kunnen ook direct worden gemeld bij de houder van de handelsvergunning van het product via email: DrugSafety,Benelux@glpg.com.

Meer informatie

- Deze informatie is ook terug te vinden op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
- Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
- Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

www.jyseleca.eu

Patiëntenwaarschuwingskaart

Let op bij gebruik van filgotinib. Filgotinib is het werkzaam bestanddeel in het medicijn.

Draag deze kaart altijd bij u.

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor patiënten over de veiligheid van filgotinib. Lees de bijsluiter voor meer informatie.

Infecties

- Filgotinib kan een bestaande infectie verergeren of uw kans op een nieuwe infectie vergroten. Vertel het uw arts meteen als u ziek wordt of verschijnselen merkt van een infectie, zoals:
 - koorts of koude rillingen, kortademigheid, hoesten, vermoeider voelen dan normaal - dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking
 - koorts, zweten, gewichtsverlies of een hoest die niet weggaat - dit kunnen tekenen zijn van tuberculose (tbc)
 - een pijnlijke huiduitslag met blaren - dit kan een teken zijn van gordelroos (herpes zoster)
- Vraag uw arts voordat u met filgotinib begint of u getest moet worden op tbc, waaronder inactieve infecties
- Vertel het uw arts als u onlangs in nauw contact bent geweest met een persoon met the

Bloedstolsels in de aderen van uw been of longen

 Vertel het uw arts meteen als u symptomen krijgt van bloedstolsels in uw benen of longen, zoals een pijnlijk gezwollen been, pijn op de borst of kortademigheid

Cholesterol

 Een hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen. Terwijl u filgotinib inneemt, zal uw arts uw cholesterolgehalte controleren. Dit zal helpen beslissen of u een behandeling nodig heeft om uw cholesterolgehalte te verlagen

Vaccins

- U mag bepaalde (levende) vaccins niet krijgen (bijvoorbeeld Zostavax[™], een middel ter voorkoming van gordelroos) wanneer u filgotinib inneemt
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u filgotinib inneemt. Mogelijk willen zij controleren of al uw vaccinaties in orde zijn

Zwangerschap, anticonceptie en borstvoeding

Filgotinib mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen

- Gebruik effectieve anticonceptiemiddelen terwijl u filgotinib inneemt en gedurende 1 week na inname van uw laatste dosis
- Als u zwanger wordt terwijl u filgotinib inneemt of denkt dat u mogelijk zwanger bent, stop dan met de inname van filgotinib en raadpleeg onmiddellijk uw arts
- Praat eerst met uw arts als u van plan bent om zwanger te worden

Geef geen borstvoeding terwijl u filgotinib inneemt

Effect op de mannelijke vruchtbaarheid

De kans bestaat dat filgotinib zorgt voor een verlaging van het aantal zaadcellen of nadelige invloed heeft op de kwaliteit van de zaadcellen. De effecten op het kunnen verwekken van kinderen, en de omkeerbaarheid van mogelijke effecten, zijn onbekend. Praat met uw arts als u nu of in de toekomst een kind wilt verwekken