

**Oma nimi:**

---

---

**Jyseleca-valmistetta määränneen  
lääkärin nimi:**

---

**Lääkärin puhelinnumero:**

---

---

**Jyseleca-hoidon aloituspäivämäärä:**

---

---

Pidä tämä kortti aina mukana Jyseleca-hoidon aikana ja näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi apteekkihenkilökunnalle ja ensihoitolääkärille.

▼ Tähän lääkevalmisteseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. Ks. pakkausselosteesta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

**www.sivusto:**

[www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)

Jyseleca-PAC-v2.0-09-2021  
FI-UC-JY-202112-00002



# Potilaskortti

**Pidä tämä kortti aina mukanas.**

▼ JYSELECA® valmisteen (filgotinibi) turvallisuutta koskevaa tietoa potilaille.



Tämä kortti sisältää tärkeää tietoa potilaille Jyseleca-valmisteen turvallisuudesta. Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

**Galápagos**

## Infektiot

- JYSELECA saattaa pahentaa olemassa olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion todennäköisyyttä. Kerro heti lääkärille, jos sairastut tai havaitset infektion merkkejä, kuten:
  - kuumetta tai vilunväristyksiä, hengenahdistusta, yskää, tavallista voimakkaampaa väsymystä – nämä voivat olla keuhkokuumeen oireita.
  - kuume, hikoilu, laihtuminen tai yskä, joka ei parane – nämä voivat olla tuberkuloosin oireita.
  - kivulias rakkulainen ihottuma – tämä saattaa olla vyöruusun oire.
- Ennen Jyseleca-hoidon aloittamista kysy lääkäriltä, onko sinut testattava tuberkuloosin varalta, myös piilevän infektion varalta.
- Kerro lääkärille, jos olet äskettäin ollut läheisessä kosketuksessa henkilön kanssa, jolla on tuberkuloosi.

## Jalkojen laskimoiden tai keuhkojen veritulpat

- Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee jaloissa tai keuhkoissa veritulpan oireita, kuten jalkasi muuttuu kivuliaaksi ja turpoaa tai jos sinulla ilmenee rintakipua tai hengenahdistusta.

## Kolesteroli

Korkea kolesteroli on merkittävä sydänsairauden riskitekijä. Lääkäri seuraa kolesteroliarvojasi Jyseleca-hoidon aikana. Tämä auttaa päättämään, tarvitsetko hoitoa kolesteroliarvojen pienentämiseen.

## Rokotteet

- Sinulle ei pidä antaa tiettyjä (eläviä) rokotteita (esimerkiksi vyöruusua ehkäisevää Zostavax<sup>TM</sup>-rokotetta) Jyseleca-hoidon aikana.
- Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa rokotuksista ennen Jyseleca-hoidon aloittamista. He haluavat ehkä varmistaa, että rokotuksesi ovat ajan tasalla.

## Raskaus, ehkäisy ja imetys

JYSELECA-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana:

- Käytä tehokasta ehkäisyä Jyseleca-hoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.
- Jos tulet raskaaksi Jyseleca-hoidon aikana tai epäilet olevasi raskaana, lopeta Jyseleca-valmisteen ottaminen ja keskustele heti lääkärin kanssa.
- Jos suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa etukäteen.

Älä imetä Jyseleca-hoidon aikana.

## Vaikutus miesten hedelmällisyyteen

On mahdollista, että Jyseleca saattaa vähentää siittiömäärää tai vaikuttaa siittiöiden laatuun. Vaikutuksia kykyyn siittää lapsi ja mahdollisten vaikutusten palautuvuutta ei tunneta.

Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat tulla isäksi nyt tai tulevaisuudessa.