

**Uw naam:**

.....

.....

**Naam van arts**  
(die JYSELECA® heeft voorgeschreven):

.....

.....

**Telefoonnummer van arts:**

.....

.....

**De datum waarop u begon  
met JYSELECA®:**

.....

.....

Draag deze kaart tijdens gebruik van JYSELECA® altijd bij u en laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die betrokken is bij uw zorg of behandeling, zoals een apotheker of spoedarts.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u ervaart. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over het melden van bijwerkingen.

**Bezoek onze website**



**JYSELECA® (Filgotinib)**

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

## Patiënten- waarschuingskaart

Draag deze kaart altijd bij u.

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor patiënten over de veiligheid van JYSELECA®. Lees de bijsluiter voor meer informatie.



## Infecties

- JYSELECA® kan een bestaande infectie verergeren of uw kans op een nieuwe infectie vergroten. Vertel het uw arts meteen als u ziek wordt of verschijnselen merkt van een infectie, zoals:
  - vaker plassen dan normaal, pijn of ongemak tijdens het plassen of rugpijn – dit kunnen tekenen zijn van een urineweginfectie
  - koorts of koude rillingen, kortademigheid, hoesten, vermoeder voelen dan normaal - dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking
  - koorts, zweten, gewichtsverlies of een hoest die niet weggaat - dit kunnen tekenen zijn van tuberculose (tbc)
  - een pijnlijke huiduitslag met blaren - dit kan een teken zijn van gordelroos (herpes zoster)
- Vraag uw arts voordat u met JYSELECA® begint of u getest moet worden op tbc, waaronder inactieve infecties
- Vertel het uw arts als u onlangs in nauw contact bent geweest met een persoon met tbc

## Bloedstolsels in de aderen van uw been of longen

- Vertel het uw arts meteen als u symptomen krijgt van bloedstolsels in uw benen of longen, zoals een pijnlijk gezwollen been, pijn op de borst of kortademigheid

## Cholesterol

- Een hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen. Terwijl u JYSELECA® inneemt, zal uw arts uw cholesterolgehalte controleren. Dit zal helpen beslissen of u een behandeling nodig heeft om uw cholesterolgehalte te verlagen

## Vaccins

- U mag bepaalde (levende) vaccins niet krijgen (bijvoorbeeld het vaccin ter voorkoming van gordelroos) wanneer u JYSELECA® inneemt
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u JYSELECA® inneemt. Mogelijk willen zij controleren of al uw vaccinaties in orde zijn

## Zwangerschap, anticonceptie en borstvoeding



JYSELECA® mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen

- Gebruik effectieve anticonceptiemiddelen terwijl u JYSELECA® inneemt en gedurende 1 week na inname van uw laatste dosis
- Als u zwanger wordt terwijl u JYSELECA® inneemt of denkt dat u mogelijk zwanger bent, stop dan met de inname van JYSELECA® en raadpleeg onmiddellijk uw arts
- Praat eerst met uw arts als u van plan bent om zwanger te worden

Geef geen borstvoeding terwijl u JYSELECA® inneemt

## Effect op de mannelijke vruchtbaarheid

De kans bestaat dat JYSELECA® zorgt voor een verlaging van het aantal zaadcellen of nadelige invloed heeft op de kwaliteit van de zaadcellen. De effecten op het kunnen verwekken van kinderen, en de omkeerbaarheid van mogelijke effecten, zijn onbekend. Praat met uw arts als u nu of in de toekomst een kind wilt verwekken.