

Nome:

Nome do médico (que prescreveu Jyseleca):

N.º de telefone do médico:

Data em que iniciou Jyseleca:

Tenha este cartão sempre consigo enquanto estiver a tomar este medicamento. Mostre o cartão a todos os profissionais de saúde envolvidos nos seus cuidados ou tratamentos, por exemplo um farmacêutico ou um médico nas urgências.

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos indesejáveis que tenha. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. Consulte o folheto informativo para saber como comunicar efeitos indesejáveis.

Cartão de Alerta para o Doente



Este cartão contém informações importantes de segurança para os doentes. Leia o folheto informativo para mais informações.

Infeções graves e oportunistas

- Este medicamento pode agravar uma infecção existente ou aumentar a probabilidade de desenvolver uma nova infecção. Fale, imediatamente, com o seu médico se ficar doente ou notar sinais de infecção grave ou oportunista, tais como:
 - Febre ou arrepios, falta de ar, tosse, sentir-se mais cansado/a do que o habitual — podem ser sinais de pneumonia
 - Febre, transpiração excessiva, perda de peso ou tosse que não desaparece — podem ser sinais de tuberculose (TB)
 - Erupção cutânea dolorosa com bolhas — podem ser sinais de zona (herpes zóster)
- Antes de começar a tomar este medicamento, pergunte ao seu médico se deve fazer o teste da TB, incluindo avaliação de infecção latente
- Informe o seu médico se esteve recentemente em contacto com alguém que tenha TB

Coágulos de sangue nas veias das pernas ou dos pulmões

- Informe, imediatamente, o seu médico se tiver sintomas de coágulos de sangue nas pernas ou nos pulmões, tais como uma perna inchada dolorosa, dor no peito ou falta de ar

Colesterol

O colesterol elevado é um importante fator de risco de doença cardíaca. Enquanto estiver a tomar este medicamento, o seu médico irá monitorizar os seus valores de colesterol.

Vacinas

- Não deve tomar algumas vacinas (vivas) enquanto estiver a tomar este medicamento
- Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre as vacinas, antes de começar a tomar este medicamento. Eles poderão querer certificar-se de que tem as suas vacinas em dia

Gravidez, contraceção e amamentação

Este medicamento não pode ser utilizado na gravidez:

- Utilize um método contraceptivo eficaz enquanto estiver a tomar este medicamento e durante 1 semana, depois de tomar a última dose
- Se pretender engravidar, fale com o seu médico antes de iniciar o tratamento

Não amamente enquanto estiver a tomar este medicamento.

Efeito na fertilidade masculina

É possível que este medicamento possa diminuir a contagem de espermatozoides e que possa diminuir a sua fertilidade (diminuir a sua capacidade para ter filhos) ou causar infertilidade (incapacidade para ter filhos). O efeito na capacidade reprodutiva, bem como a reversibilidade de quaisquer potenciais efeitos, são desconhecidos. Fale com o seu médico caso tenha dúvidas ou preocupações sobre isto.