

Vaše jméno:

.....

.....

Pokud používáte přípravek Jyseleca noste tuto kartu neustále při sobě a ukažte ji každému zdravotnickému pracovníkovi, který se podílí na vaší lékařské péči, například i lékaři na pohotovosti, nebo lékárníkovi.

Karta pacienta

Tuto kartu mějte neustále u sebe

Jméno lékaře

(který přípravek Jyseleca předepsal):

.....

.....

Telefon na lékaře:

.....

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u vás vyskytnou. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto léčivého přípravku. Informaci o tom, jak hlásit nežádoucí účinky, najdete v příbalové informaci.

**Informace o bezpečnosti
léčivého přípravku
JYSELECA®▼ (filgotinib)
pro pacienty**

**Datum zahájení léčby
přípravkem Jyseleca:**

.....

Verze 1 schválená SÚKL 18.2.2022

NP-20338

Tato karta pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti léčivého přípravku Jyseleca. Přečtěte si prosím příbalovou informaci, kde získáte více informací.

Infekce

- Přípravek Jyseleca může zhoršit stávající infekci nebo zvýšit pravděpodobnost onemocnění novou infekcí. Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás rozvinou příznaky infekce jako například:
 - horečka nebo zimnice, dušnost, kašel, pocit větší únavy než obvykle – může se jednat o příznaky zápalu plic,
 - horečka, pocení, úbytek tělesné hmotnosti nebo přetrvávající kašel – může se jednat o příznaky tuberkulózy (TBC),
 - bolestivá kožní vyrážka s puchýři – může se jednat o příznaky pásového oparu (herpes zoster)
- Před začátkem léčby přípravkem Jyseleca se poraďte se svým lékařem, zda máte být otestován(a) na přítomnost TBC, včetně latentní (němé) infekce.
- Pokud jste v poslední době byl(a) v úzkém kontaktu s nemocným s TBC, informujte svého lékaře.

Krevní sraženiny v žilách nebo plicích

- Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví známky krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo plicích, jako jsou bolestivé otoky nohou, bolest na hrudi nebo dušnost.

Cholesterol

- Vysoký cholesterol je významným rizikovým faktorem pro onemocnění srdce. Během užívání přípravku Jyseleca Vám bude lékař kontrolovat hladinu cholesterolu. To pomůže rozhodnout, zda potřebujete léčbu ke snížení hladiny cholesterolu.

Očkování

- Během léčby přípravkem Jyseleca nebo bezprostředně před ní se nedoporučuje použití tzv. živých vakcín (například Zostavax™ používaný k prevenci pásového oparu).
- Před zahájením léčby přípravkem Jyseleca se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem o Vašich očkováních, aby bylo zajištěno, že všechna Vaše očkování jsou v souladu s aktuálními doporučeními.

Těhotenství, antikoncepce a kojení

- Přípravek Jyseleca se nesmí užívat v těhotenství:
 - během užívání přípravku Jyseleca a nejméně 1 týden poté, co si vezmete svou poslední dávku, musíte používat účinnou antikoncepci
 - pokud během užívání přípravku Jyseleca otěhotníte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, přestaňte přípravek Jyseleca užívat a ihned informujte svého lékaře
 - pokud plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem
- Během užívání přípravku Jyseleca nekojte.

Vliv na plodnost mužů

- Přípravek Jyseleca může snižovat počet spermií nebo ovlivňovat jejich kvalitu. Vliv na schopnost počít dítě a vratnost možných následků není znám.
- Pokud plánujete nyní nebo v budoucnu počít dítě, poraďte se se svým lékařem.