

中国科学技术大学

2004–2005学年第 1 学期考试试卷

考试科目：数值计算方法

得分：_____

学生所在系：_____ 姓名：_____

学号：_____

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将所在系、姓名、学号等填写清楚。
2. 请考生在答卷纸左侧留出装订区域。
3. 本试卷为开卷考试，只可以参看教科书。共 9 道试题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。
4. 计算中保留4位小数。

得分	评卷人

一、填空题

1. (本大题共 6 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1.1 & 2.2 & 3.3 \\ 3.1 & -2.6 & 4.9 \\ 1.2 & 2.3 & 5.6 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ _____, $\|A\|_\infty =$ _____。

2. (4分) 写出以 $(a, f(a), f'(a)), (b, f(b), f'(b)), (c, f(c))$ 为插值点构造的插值多项式的截断误差：

_____。

得分	评卷人

二、解答题

3. (12分) 给出下列函数表

x_i	-1	1	2	4
$f(x_i)$	0	5	12	9

- (1) 作出差商表；
- (2) 构造牛顿插值多项式, 并计算 $f(0)$;
- (3) 写出 $f(0)$ 的插值误差表达式。

4. (12分)用Romberg算法计算积分: $\int_{2.0}^{2.8} x^2 dx$

$$R(1,1) = 4.736$$

$$R(2,1) = 4.672 \quad R(2,2)$$

$$R(3,1) = 4.656 \quad R(3,2) \quad R(3,3)$$

5. (15分) 给出下列数据:

x_i	0.01	0.04	0.09	0.16
y_i	2.0	4.0	3.0	5.0

试对数据作出 $y(x) = a + b\sqrt{x}$ 形式的拟合函数。

6. (14分)用 LDL^T 分解求解下列方程组

$$\begin{cases} -6x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= -5 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 &= 20 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 &= 1 \end{cases}$$

7. (15分) 写出用Gauss-Seidel方法求解下列方程组

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -4 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

1) 迭代格式; 2) 迭代矩阵; 3) 讨论迭代矩阵是否收敛?

8. (10分)用幂法和反幂法分别计算下列矩阵按模最大的特征值和按模最小的特征值, 只迭代两步。(单号同学用初值(1.0, 1.0), 双号同学用初值(-1.0, 1.0))

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}$$

9. (12分) 构造线性多步法 $p=3, q=2$ 的隐式差分格式。

答案

1. 13.8 (3分), 10.6 (3分)

2. $\frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}(x-a)^2(x-b)^2(x-c), \xi \in [a, c]$ (4分)

3. (1)(4分)

(-1 0)			
(1 5)	5/2		
(2 12)	7	3/2	
(4 9)	-3/2	-17/6 (或2.8333)	-13/15(或-0.8667)

(2)(4分) $N(x) = 0 + 5/2(x+1) + 3/2(x+1)(x-1) - 13/15(x+1)(x-1)(x-2)$

$N(0) = -11/15 = -0.7333$

(3)(4分) $\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x+1)(x-1)(x-2)(x-4), \xi \in [-1, 4]$

$f(0)$ 的误差为 $\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(-8), \xi \in [-1, 4]$

4.

$R(1, 1) = 4.736$		
$R(2, 1) = 4.672$	$R(2, 2) = 4.6507(4分)$	
$R(3, 1) = 4.656$	$R(3, 2) = 4.6507(4分)$	$R(3, 3) = 4.6507 (4分)$

5. $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 3.9 \end{pmatrix}$ (12分) $\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 8 \end{pmatrix}$ (3分)

6. $L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -1/2 & 1 & \\ -1/3 & 4/13 & 1 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} -6 & & \\ & 13/2 & \\ & & 236/39 \end{pmatrix}$

或

$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -0.5 & 1 & \\ -0.3333 & 0.3077 & 1 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} -6 & & \\ & 6.5 & \\ & & 6.0513 \end{pmatrix}$ (8分)

$\begin{cases} Ly = b \\ Dz = y \\ L^T x = z \end{cases} \Rightarrow y = \begin{pmatrix} -5 \\ 35/2 \\ -236/39 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 35/13 \\ -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

或

$y = \begin{pmatrix} -5 \\ 17.5 \\ -6.0513 \end{pmatrix} z = \begin{pmatrix} 0.8333 \\ 2.6923 \\ -1.0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2.0 \\ 3.0 \\ -1.0 \end{pmatrix}$ (6分)

$$7. 1)(5分) \begin{cases} x_1^{k+1} = (-x_2^k + x_3^k + 5)/10 \\ x_2^{k+1} = (-x_1^{k+1} - x_3^k - 4)/5 \\ x_3^{k+1} = (-x_1^{k+1} - x_2^{k+1} + 2)/2 \end{cases}$$

$$2)(5分) \begin{pmatrix} 0 & -1/10 & 1/10 \\ 0 & 1/50 & -11/50 \\ 0 & 1/25 & 3/50 \end{pmatrix}$$

3) (5分) 谱半径为 $(2 \pm i\sqrt{21})/50, 0$ 或 $\|S\|_1 = 19/50 < 1$ 或 $\|S\|_\infty = 12/50 < 1$

8. (单号):

$$x_1 = (0.7, 0.7), x_2 = (0.49, 0.49) \Rightarrow \lambda_1 = 0.7 \text{ (4分)}$$

$$y_1 = (1.4286, 1.4286), y_2 = (2.0408, 2.0408) \Rightarrow \mu_1 = 1.4286 \Rightarrow \lambda_2 = 0.7$$

$$y_1 = (10/7, 10/7), y_2 = (100/49, 100/49) \Rightarrow \mu_1 = 10/7 \Rightarrow \lambda_2 = 0.7 \text{ (6分)}$$

(双号):

$$x_1 = (-0.3, 0.3), x_2 = (-0.09, 0.09) \Rightarrow \lambda_1 = 0.3 \text{ (4分)}$$

$$y_1 = (-3.3333, 3.3333), y_2 = (-11.1111, 11.1111) \Rightarrow \mu_1 = 3.3333 \Rightarrow \lambda_2 = 0.3$$

$$y_1 = (-10/3, 10/3), y_2 = (-100/9, 100/9) \Rightarrow \mu_1 = 10/3 \Rightarrow \lambda_2 = 0.3 \text{ (6分)}$$

9. $p = 3 \Rightarrow$ 积分区间为 $[x_{n-3}, x_{n+1}]$, $q = 2$ 隐格式 \Rightarrow 积分点为 $\{x_{n+1}, x_n, x_{-1}\}$

(3分)

$$\int_{x_{n-3}}^{x_{n+1}} \frac{(x - x_n)(x - x_{n-1})}{(x_{n+1} - x_n)(x_{n+1} - x_{n-1})} dx = \frac{8}{3}h$$

(3分)

$$\int_{x_{n-3}}^{x_{n+1}} \frac{(x - x_{n+1})(x - x_{n-1})}{(x_n - x_{n+1})(x_n - x_{n-1})} dx = \frac{-16}{3}h$$

(3分)

$$\int_{x_{n-3}}^{x_{n+1}} \frac{(x - x_{n+1})(x - x_n)}{(x_{n-1} - x_{n+1})(x_{n-1} - x_n)} dx = \frac{20}{3}h$$

格式为(3分)

$$y_{n+1} = y_{n-3} + \frac{8h}{3}f(x_{n+1}, y_{n+1}) - \frac{16h}{3}f(x_n, y_n) + \frac{20h}{3}f(x_{n-1}, y_{n-1})$$