## Correlations with axis ratio within redshift bins

| Property vs $q$ | All | z < 0.1 | z < 0.2 | z ≥ 0.2 | 0.2 ≤ z < 0.4 | z ≥ 0.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM_host | -0.06 (0.64; 55)<br>AD 0.20 | +0.15 (0.65; 12)<br>AD 1.00 | -0.13 (0.56; 23)<br>AD 0.89 | +0.01 (0.94; 32)<br>AD 0.43 | +0.08 (0.70; 25)<br>AD 0.44 | -0.11 (0.82; 7)<br>AD – |
| DM_host, foreground excess removed | -0.09 (0.52; 49)<br>AD 0.14 | +0.22 (0.58; 9)<br>AD 0.58 | -0.14 (0.57; 20)<br>AD 0.64 | -0.05 (0.80; 29)<br>AD 0.53 | +0.09 (0.69; 22)<br>AD 0.63 | -0.07 (0.88; 7)<br>AD – |
| log\|RM\| | -0.02 (0.91; 41)<br>AD 0.29 | -0.03 (0.93; 9)<br>AD 0.94 | +0.13 (0.61; 17)<br>AD 0.52 | -0.15 (0.48; 24)<br>AD 0.41 | +0.13 (0.57; 21)<br>AD 0.52 | – (N = 3) |
| log tau | -0.17 (0.39; 29)<br>AD 0.83 | -0.11 (0.82; 7)<br>AD – | -0.18 (0.55; 14)<br>AD 1.00 | -0.20 (0.47; 15)<br>AD 0.59 | -0.23 (0.46; 13)<br>AD 0.75 | – (N = 2) |
| Linear polarization | -0.33 (0.11; 24)<br>AD 0.49 | -0.77 (0.072; 6)<br>AD – | -0.27 (0.40; 12)<br>AD 0.58 | -0.26 (0.42; 12)<br>AD 1.00 | -0.07 (0.84; 10)<br>AD 0.92 | – (N = 2) |
| A_V, old stars | -0.46 (0.010; 30)<br>AD 0.003 | -0.43 (0.34; 7)<br>AD – | -0.37 (0.21; 13)<br>AD 0.75 | -0.48 (0.051; 17)<br>AD 0.003 | -0.24 (0.42; 13)<br>AD 0.29 | – (N = 4) |
| log M* | -0.14 (0.31; 51)<br>AD 0.99 | -0.11 (0.75; 11)<br>AD 0.60 | -0.12 (0.58; 22)<br>AD 0.39 | -0.09 (0.64; 29)<br>AD 0.98 | -0.15 (0.52; 22)<br>AD 0.87 | -0.07 (0.88; 7)<br>AD – |
| SFR | +0.12 (0.42; 46)<br>AD 0.46 | +0.76 (0.011; 10)<br>AD 0.11 | +0.38 (0.098; 20)<br>AD 0.50 | -0.07 (0.75; 26)<br>AD 0.40 | -0.09 (0.70; 20)<br>AD 0.79 | -0.03 (0.96; 6)<br>AD – |
| log sSFR | +0.14 (0.36; 46)<br>AD 0.75 | +0.50 (0.14; 10)<br>AD 0.46 | +0.26 (0.27; 20)<br>AD 0.66 | +0.02 (0.94; 26)<br>AD 0.39 | +0.06 (0.82; 20)<br>AD 0.48 | +0.09 (0.87; 6)<br>AD – |

Cells: Spearman $r_S$ (p; N), and below it the AD p (–: fewer than 4 hosts in one half).
AD p: two-sample Anderson–Darling test that y (in 'y vs x'; the property, against $q$) has the same distribution for hosts below and above the median of x (permutation p, about 5,000 shuffles).