Correlations with axis ratio within redshift bins

Property vs q	All	z < 0.1	z < 0.2	z ≥ 0.2	0.2 ≤ z < 0.4	z ≥ 0.4
DM_host	-0.06 (0.64; 55) AD 0.20	+0.15 (0.65; 12) AD 1.00	-0.13 (0.56; 23) AD 0.89	+0.01 (0.94; 32) AD 0.43	+0.08 (0.70; 25) AD 0.44	-0.11 (0.82; 7) AD –
DM_host, foreground excess removed	-0.09 (0.52; 49) AD 0.14	+0.22 (0.58; 9) AD 0.58	-0.14 (0.57; 20) AD 0.64	-0.05 (0.80; 29) AD 0.53	+0.09 (0.69; 22) AD 0.63	-0.07 (0.88; 7) AD –
log|RM|	-0.02 (0.91; 41) AD 0.29	-0.03 (0.93; 9) AD 0.94	+0.13 (0.61; 17) AD 0.52	-0.15 (0.48; 24) AD 0.41	+0.13 (0.57; 21) AD 0.52	– (N = 3)
log tau	-0.17 (0.39; 29) AD 0.83	-0.11 (0.82; 7) AD –	-0.18 (0.55; 14) AD 1.00	-0.20 (0.47; 15) AD 0.59	-0.23 (0.46; 13) AD 0.75	– (N = 2)
Linear polarization	-0.33 (0.11; 24) AD 0.49	-0.77 (0.072; 6) AD –	-0.27 (0.40; 12) AD 0.58	-0.26 (0.42; 12) AD 1.00	-0.07 (0.84; 10) AD 0.92	– (N = 2)
A_V, old stars	-0.46 (0.010; 30) AD 0.003	-0.43 (0.34; 7) AD –	-0.37 (0.21; 13) AD 0.75	-0.48 (0.051; 17) AD 0.003	-0.24 (0.42; 13) AD 0.29	– (N = 4)
log M*	-0.14 (0.31; 51) AD 0.99	-0.11 (0.75; 11) AD 0.60	-0.12 (0.58; 22) AD 0.39	-0.09 (0.64; 29) AD 0.98	-0.15 (0.52; 22) AD 0.87	-0.07 (0.88; 7) AD –
SFR	+0.12 (0.42; 46) AD 0.46	+0.76 (0.011; 10) AD 0.11	+0.38 (0.098; 20) AD 0.50	-0.07 (0.75; 26) AD 0.40	-0.09 (0.70; 20) AD 0.79	-0.03 (0.96; 6) AD –
log sSFR	+0.14 (0.36; 46) AD 0.75	+0.50 (0.14; 10) AD 0.46	+0.26 (0.27; 20) AD 0.66	+0.02 (0.94; 26) AD 0.39	+0.06 (0.82; 20) AD 0.48	+0.09 (0.87; 6) AD –

Cells: Spearman r_S (p; N), and below it the AD p (–: fewer than 4 hosts in one half).
AD p: two-sample Anderson–Darling test that y (in 'y vs x'; the property, against q) has the same distribution for hosts below and above the median of x (permutation p, about 5,000 shuffles).