

Hp 相关慢性胃炎胃肠症状及中医证候分布特点*

刘海华 林唐唐 唐 杨 谢 云 邓六香 方金英 汪胜军

(赣南医科大学第一附属医院中医科,江西 赣州 341000)

摘要:目的 探讨幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, Hp)相关慢性胃炎的胃肠症状及中医证候分布特点。**方法** 通过问卷调查,分析 Hp 相关慢性胃炎患者胃肠症状及中医证候分布特点。**结果** Hp 相关慢性胃炎女性患者比男性更易脘腹痞满、胃脘喜温喜按,非 Hp 相关慢性胃炎女性患者较男性更易大便干燥($P<0.05$)。较非 Hp 相关慢性胃炎, Hp 相关慢性胃炎男性患者更易脘腹疼痛($P<0.05$),女性患者更易脘腹痞满、脘腹疼痛、胃脘喜温喜按($P<0.05$)。Hp 相关慢性胃炎及非 Hp 相关慢性胃炎患者均以肝胃不和证、脾胃虚弱证及脾胃湿热证为主,胃阴不足证及胃络瘀阻证次之,差异均无统计学意义($P>0.05$)。**结论** Hp 相关慢性胃炎患者胃肠症状及中医证候均有一定特点,且胃肠症状存在一定性别差异。

关键词:慢性胃炎;幽门螺杆菌;胃肠症状;中医证候

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2025.16.029

文章编号:1672-2779(2025)-16-0101-04

Distribution Characteristics of Gastrointestinal Symptoms and Traditional Chinese Medicine Syndromes in Hp-related Chronic Gastritis

LIU Haihua, LIN Tangtang, TANG Yang, XIE Yun, DENG Liuxiang, FANG Jinying, WANG Shengjun
(Department of Traditional Chinese Medicine, The First Affiliated Hospital of Gannan Medical University,
Jiangxi Province, Ganzhou 341000, China)

Abstract: **Objective** To explore the distribution characteristics of gastrointestinal symptoms and traditional Chinese medicine (TCM) syndromes in Helicobacter pylori (Hp)-related chronic gastritis. **Methods** Through the investigation, the distribution characteristics of gastrointestinal symptoms and TCM syndromes in patients with Hp-related chronic gastritis were analyzed. **Results** Female patients with Hp-related chronic gastritis are more likely to experience stuffiness and fullness in the epigastrium and abdomen, and their gastric cavity prefers warmth and pressure compared with male patients. Female patients with non-Hp-related chronic gastritis are more prone to dry stool than male patients ($P<0.05$). Compared with non-Hp-related chronic gastritis, male patients with Hp-related chronic gastritis are more likely to have epigastric and abdominal pain ($P<0.05$), while female patients are more likely to suffer from epigastric and abdominal stuffiness and fullness, epigastric and abdominal pain, and their gastric cavity prefers warmth and pressure ($P<0.05$). Both patients with Hp-related chronic gastritis and non-Hp-related chronic gastritis mainly present with the syndromes of liver-stomach disharmony, spleen-stomach weakness, and spleen-stomach dampness-heat, followed by the syndromes of stomach-yin deficiency and gastric collateral stasis. There is no statistically significant difference in the distribution of these syndromes ($P>0.05$). **Conclusion** The gastrointestinal symptoms and TCM syndrome of patients with Hp-associated chronic gastritis have certain characteristics, and the gastrointestinal symptoms have certain gender differences.

Keywords: chronic gastritis; Helicobacter pylori; gastrointestinal symptoms; traditional Chinese medicine syndrome

慢性胃炎即胃黏膜的慢性炎症^[1, 2]。幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, Hp)为本病的重要病因之一^[3-5]。临床对慢性胃炎患者的胃肠症状及中医证候已有初步共识^[6, 7],但对 Hp 相关慢性胃炎患者胃肠症状与中医证候分布特征的系统研究仍较缺乏,相关机制尚未明确。本研究旨在分析 Hp 相关慢性胃炎患者的胃肠症状及中医证候分布特点。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按照标准纳入 Hp 相关慢性胃炎、非 Hp 相关慢性胃炎患者各 200 例以上,两组性别、

年龄及慢性胃炎类型比较,差异均无统计学意义($P>0.05$)。见表 1、表 2。本调查获赣南医科大学第一附属医院伦理委员会批准(编号:LLSC-2022111804)。

表 1 两组慢性胃炎患者性别比较 (例)

组别	例数	男	女	χ^2 值	P值
Hp 相关慢性胃炎组	210	99	111	1.751	0.186
非 Hp 相关慢性胃炎组	204	83	121		

1.2 诊断标准 参照《中国慢性胃炎共识意见(2017 年,上海)》^[8],依胃镜确诊为慢性胃炎;参照《第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》^[9],

* 基金项目:赣南医科大学第一附属医院博士启动基金项目【No. QD069】;江西省赣州市指导性科技计划项目【No. GZ2023ZSF169】

表2 各组慢性胃炎患者年龄与慢性胃炎类型比较

序号	组别	例数	年龄/($\bar{x} \pm s$, 岁)	慢性胃炎类型/例	
				非萎缩	萎缩
1	Hp 相关慢性胃炎组	210	47.1 $\pm$ 13.9	202	8
	非Hp 相关慢性胃炎组	204	47.8 $\pm$ 13.1	194	10
2	Hp 相关慢性胃炎男性组	99	45.5 $\pm$ 14.7	98	1
	非Hp 相关慢性胃炎男性组	83	48.0 $\pm$ 13.8	82	1
3	Hp 相关慢性胃炎女性组	111	48.5 $\pm$ 13.0	104	7
	非Hp 相关慢性胃炎女性组	121	47.6 $\pm$ 12.6	112	9
4	Hp 相关慢性胃炎男性组	99	45.5 $\pm$ 14.7	98	1
	Hp 相关慢性胃炎女性组	111	48.5 $\pm$ 13.0	104	7
5	非Hp 相关慢性胃炎男性组	83	48.0 $\pm$ 13.8	82	1
	非Hp 相关慢性胃炎女性组	121	47.6 $\pm$ 12.6	112	9

注:表中5种组合分别进行检验,差异均无统计学意义($P>0.05$)。

行 ^{14}C 或 ^{13}C 呼气试验,判别是否感染Hp;参照《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》^[7]制定胃肠症状调查问卷,由3个副高级职称以上的中医学专家评判中医证候。

1.3 入选标准 纳入标准:年龄18~79周岁且能配合调查。剔除标准:近1个月服用过抗生素或质子泵抑制剂;曾经行Hp根除治疗;有严重脑血管、精神类疾病而不能配合;处于妊娠期、哺乳期及有明显绝经综合征的妇女。脱落标准:调查中出于各种原因不配合或退出。

1.4 调查方法 根据标准,选取Hp相关慢性胃炎患者、非Hp相关慢性胃炎患者各200例以上,进行问卷调查。待调查结束后,两组先行年龄、性别、慢性胃炎类型等一般情况分析,差异无统计学意义则表明研究具有可比性;而后分析胃肠症状,以得出Hp相关慢性胃炎与非Hp相关慢性胃炎患者的胃肠症状及中医证候分布特点。

1.5 统计学方法 使用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计量资料采用($\bar{x} \pm s$)表示,符合正态分布行 t 检验或单因素方差分析,不符合则行非参数检验-秩和检验;计数资料采用率(%)表示,非等级资料使用 χ^2 检验或Fisher确切概率法,等级资料采用Wilcoxon或Kruskal-Wallis秩和检验。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 胃肠症状分布 Hp相关慢性胃炎患者胃肠症状发生率最高的为脘腹疼痛(71%, 150/210),其次为胃脘胀满(57%, 120/210);非Hp相关慢性胃炎患者胃肠症状发生率最高的为胃脘胀满(59%, 121/204),其次为脘腹疼痛(44%, 89/204)、反

酸(44%, 89/204)。对于Hp相关慢性胃炎,男患者胃肠症状发生率最高的为脘腹疼痛(77%, 76/99),其次为胃脘胀满(51%, 50/99);女患者胃肠症状发生率最高的为脘腹疼痛(67%, 74/111),其次为胃脘胀满(63%, 70/111)。对于非Hp相关慢性胃炎,男患者胃肠症状发生率最高的为胃脘胀满(53%, 44/83),其次为反酸(42%, 35/83);女患者胃肠症状发生率最高的为胃脘胀满(64%, 77/121),其次为脘腹疼痛(46%, 56/121)。

Hp相关慢性胃炎脘腹疼痛、胃脘喜温喜按的发生率显著高于非Hp相关慢性胃炎,食少发生率显著低于非Hp相关慢性胃炎,差异均有统计学意义($P<0.05$)。Hp相关慢性胃炎男性患者脘腹疼痛发生率显著高于非Hp相关慢性胃炎男性患者,Hp相关慢性胃炎女性患者脘腹痞满、脘腹疼痛、胃脘喜温喜按发生率显著高于非Hp相关慢性胃炎女性患者,差异均有统计学意义($P<0.05$)。Hp相关慢性胃炎男性患者脘腹痞满、胃脘喜温喜按发生率显著低于女性,非Hp相关慢性胃炎男性组大便干燥发生率亦显著低于女性患者,差异均有统计学意义($P<0.05$)。见表3。

2.2 中医证候分布 Hp相关慢性胃炎男女患者、非Hp相关慢性胃炎男女患者均以肝胃不和证、脾胃虚弱证及脾胃湿热证为主。经Fisher确切概率法检验,各组间中医证候分布比较,差异均无统计学意义($P>0.05$)。见表4。

3 讨论

中医所述之“胃”不限于六腑中的解剖概念,其功能常关联于肠,因此“胃不和”病机可对应胃肠功能失调及相关病证^[10-12]。70%~90%的慢性胃

表 3 各组慢性胃炎患者胃肠症状分布比较 (例)

胃肠症状	各组胃肠症状频数					
	Hp 相关慢性胃炎组(210 例)	非 Hp 相关慢性胃炎组(204 例)	Hp 相关慢性胃炎男性组(99 例)	Hp 相关慢性胃炎女性组(111 例)	非 Hp 相关慢性胃炎男性组(83 例)	非 Hp 相关慢性胃炎女性组(121 例)
胃脘胀满	120	121	50	70	44	77
脘腹痞满	28	21	8	20	10	11
脘腹疼痛	150	89	76	74	33	56
胃脘胀痛	62	68	27	35	28	40
胃脘灼热疼痛	43	39	18	25	15	24
胃痛有定处	49	39	25	24	19	20
胃痛如针刺	7	6	3	4	2	4
胃痛隐隐,绵绵不休	85	71	43	42	30	41
胃痛日久不愈	46	41	25	21	19	22
胃脘喜温喜按	49	26	16	33	10	16
胃中嘈杂	41	34	18	23	16	18
似饥而不欲食	10	5	4	6	1	4
食少	26	45	9	17	14	31
纳呆	26	28	10	16	7	21
嗳气频作	72	70	33	39	30	40
反酸	80	89	35	45	35	54
泛吐清水	14	15	7	7	5	10
大便干燥	23	20	8	15	4	16
大便干结	17	21	9	8	6	15
大便溏薄	13	18	4	9	9	9
大便黏滞或溏滞	30	36	18	12	18	18
腹泻或伴不消化食物	27	20	13	14	10	10

表 4 各组慢性胃炎患者中医证候分布比较 (例)

序号	组别	例数	证候频数					P 值
			肝胃不和	脾胃湿热	脾胃虚弱	胃阴不足	胃络瘀阻	
1	Hp 相关慢性胃炎组	210	92	41	65	9	3	0.326
	非 Hp 相关慢性胃炎组	204	81	56	58	5	4	
2	Hp 相关慢性胃炎男性组	99	39	24	32	3	1	0.927
	非 Hp 相关慢性胃炎男性组	83	30	23	26	2	2	
3	Hp 相关慢性胃炎女性组	111	53	17	33	6	2	0.205
	非 Hp 相关慢性胃炎女性组	121	51	33	32	3	2	
4	Hp 相关慢性胃炎男性组	99	39	24	32	3	1	0.409
	Hp 相关慢性胃炎女性组	111	53	17	33	6	2	
5	非 Hp 相关慢性胃炎男性组	83	30	23	26	2	2	0.896
	非 Hp 相关慢性胃炎女性组	121	51	33	32	3	2	

炎患者有 Hp 感染，且 Hp 感染状态与胃黏膜活动性炎症程度密切相关^[13, 14]。本研究基于整体观，探讨了 Hp 相关慢性胃炎与非 Hp 相关慢性胃炎患者胃肠症状及中医证候分布特点。

性别是许多疾病临床症状差异的影响因素^[15-17]，但尚未见慢性胃炎胃肠症状分布与性别关

系的报道。本研究发现, Hp 相关慢性胃炎患者中女性比男性更易脘腹痞满、胃脘喜温喜按 ($P<0.05$), 非 Hp 相关慢性胃炎患者女性较男性则更易大便干燥 ($P<0.05$)。上述结果表明, 慢性胃炎患者的胃肠症状分布在不同性别间具有一定差异。

比较 Hp 根除前后胃肠症状的研究较多, 均显示 Hp 根除可改善胃肠症状^[18-20]。本研究发现, Hp 相关慢性胃炎男性患者较非 Hp 相关慢性胃炎男性患者更易脘腹疼痛 ($P<0.05$), Hp 相关慢性胃炎女性患者较非 Hp 相关慢性胃炎女性患者更易脘腹痞满、脘腹疼痛、胃脘喜温喜按 ($P<0.05$)。这说明 Hp 相关慢性胃炎与非 Hp 相关慢性胃炎胃肠分布亦具有一定差异, 慢性胃炎胃肠症状与是否有 Hp 感染具有一定关联。

临床对慢性胃炎的中医证候具有一定共识^[7], 但 Hp 相关慢性胃炎及非 Hp 相关慢性胃炎患者的中医证候分布及差异尚未清楚。本研究中, Hp 相关慢性胃炎及非 Hp 相关慢性胃炎的中医证候分布整体比较、同性别比较及不同性别比较, 差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。且二者不同性别患者的中医证候均以肝胃不和证、脾胃虚弱证及脾胃湿热证为主, 以胃阴不足证及胃络瘀阻证为辅。这说明慢性胃炎患者的中医证候分布可能与性别及是否感染 Hp 无明显相关性。

综上, 本研究结果初步揭示, Hp 相关慢性胃炎患者的胃肠症状及中医证候均具有一定分布特点, 其中胃肠症状分布存在一定性别差异。

参考文献

- [1] SPUŻAK J, JANKOWSKI M, KUBIAK K, et al. A modified Sydney system for the diagnosis of chronic gastritis in dogs[J]. Acta Vet Scand, 2020, 62(1):44.
- [2] SOLOVYOVA G, ALIANOVA T, KURYK O, et al. Morphological peculiarities of chronic gastritis in patients with functional dyspepsia[J]. Georgian Med News, 2019(289):102-107.
- [3] NAGY P, JOHANSSON S, MOLLOY-BLAND M. Systematic review of time trends in the prevalence of Helicobacter pylori infection in China and the USA[J]. Gut Pathog, 2016, 8:8.
- [4] KALACH N, MISAK Z, BONTEMS P, et al. Systematic review and meta-analysis of histological gastric biopsy aspects according to the updated Sydney system in children[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2022, 74(1):13-19.
- [5] LEJA M, GRINBERGA-DERICA I, BILGILIER C, et al. Review: Epidemiology of Helicobacter pylori infection[J]. Helicobacter, 2019, 24(Suppl 1):e12635.
- [6] DU Y Q, BAI Y, XIE P, et al. Chronic gastritis in China: a national multi-center survey[J]. BMC Gastroenterol, 2014, 14:21.
- [7] 中华中医药学会脾胃病分会. 慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(7):3060-3064.
- [8] 中华医学会消化病学分会. 中国慢性胃炎共识意见(2017年, 上海)[J]. 胃肠病学, 2017, 22(11):670-687.
- [9] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 全国幽门螺杆菌研究协作组. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告[J]. 中华内科杂志, 2017, 56(7):532-545.
- [10] 侯理伟, 苏晓兰, 郭宇, 等. 胃不和则卧不安: 魏玮教授从脾胃论治失眠的学术思想[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(9):791-793.
- [11] 张心平, 杨美霞, 张守中, 等. 《黄帝内经》不寐证的理论探讨及临床应用[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(12):5765-5767.
- [12] 芦玥, 贾跃进, 张译心, 等. 贾跃进基于“胃不和则卧不安”治疗失眠经验[J]. 中国民间疗法, 2022, 30(3):25-28.
- [13] WARREN J R. Gastric pathology associated with Helicobacter pylori[J]. Gastroenterol Clin North Am, 2000, 29(3):705-751.
- [14] SONNENBERG A, LASH R H, GENTA R M. A national study of Helicobacter pylori infection in gastric biopsy specimens[J]. Gastroenterology, 2010, 139(6):1894-1901.
- [15] 章梦琦, 丁佳豪, 郝明霞, 等. 不同性别急性缺血性卒中后抑郁患者的临床异质性[J]. 中华老年多器官疾病杂志, 2023, 22(1):47-52.
- [16] 邹毅, 张慧华, 刘波, 等. 儿科消化门诊功能性胃肠疾病诊疗现状: 一项单中心的临床报道[J]. 中国实用儿科杂志, 2021, 36(8):632-636.
- [17] 黄根. 消化性溃疡的临床特点及变化趋势: 2012-2020年住院患者的大样本统计分析[D]. 南昌: 南昌大学, 2021.
- [18] 游元明, 罗邓成, 陈文芳. Hp根除治疗慢性胃炎患者的效果及与hs-CRP的相关性[J]. 中国卫生标准管理, 2023, 14(7):178-181.
- [19] 吴城珍, 陈清智, 袁志明. 布拉氏酵母菌胶囊联合铋剂四联疗法治疗Hp阳性胃炎的疗效[J]. 临床合理用药, 2023, 16(18):82-84.
- [20] 郭六玲, 张士金, 陈涛, 等. 藿香消痞汤联合泮托拉唑四联方案治疗Hp阳性慢性胃炎效果分析[J]. 中医药临床杂志, 2023, 35(1):151-154.

(本文编辑: 贺 静 收稿日期: 2023-08-25)