

保“胃”健康，科学防治消化性溃疡

于会永

（广州同和医院内科门诊，广东广州 511340）

作者简介：于会永，主治医师，研究方向：普通内科。

目前随着大众的生活习惯及饮食习惯等的改变，使消化性溃疡的发病率逐渐上升^[1]。消化性溃疡不仅导致疼痛、不适和消化不良，严重影响患者的生活质量，还可能引发出血、穿孔等并发症，危及生命。科学防治消化性溃疡，有助于减轻症状、预防复发，对提高患者健康水平和生命质量具有重要意义。

一、消化性溃疡的基本概念

消化性溃疡是指胃或十二指肠黏膜层因多种因素受损而形成的溃疡。根据发生部位，可分为胃溃疡和十二指肠溃疡。两者在症状和治疗方法上虽有相似之处，但亦存在差异。

消化性溃疡的发病机制复杂，主要涉及胃酸、胃蛋白酶对黏膜的侵蚀作用与黏膜防御机制的失衡。幽门螺杆菌感染、非甾体抗炎药的使用、吸烟、饮酒、精神压力等都是重要的诱因。

二、消化性溃疡的症状与诊断

消化性溃疡的典型症状包括上腹部疼痛、饱胀感、反酸、嗝气等。疼痛常呈周期性发作，与饮食有一定关系。胃溃疡疼痛多在餐后 1 小时内出现，而十二指肠溃疡疼痛多在饥饿时或夜间发作。此外，部分患者可能表现为非典型症状，如胸骨后疼痛、恶心、呕吐、体重减轻等。老年人或合并其他疾病的患者，症状可能不典型，需特别注意。

消化性溃疡的诊断主要依赖于内镜检查和影像学检查。内镜检查可以直接观察溃疡的部位、大小和形态，并可进行活检以排除恶性病变。影像学检查如 X 线钡餐造影也可辅助诊断。实验室检查包括血常规、便潜血试验、幽门螺杆菌检测等。幽门螺杆菌检测是诊断和治疗方案制定的重要依据。

三、消化性溃疡的预防

尽管消化性溃疡可能由多种因素引起，但通过采取一些简单的预防措施，我们可以显著降低患病的风险。以下是一些有效的预防策略，帮助您远离消化性溃疡的困扰。

健康饮食：合理的饮食习惯是预防消化性溃疡的基石。在日常饮食中，应注重摄入富含维生素和膳食纤维的食物，如新鲜蔬菜、水果和全谷物，这些食物不仅能提供必要的营养，还能促进胃肠道的健康。同时，应尽量避免高脂、高盐和刺激性食物的摄入，因为这些食物

可能会对胃黏膜造成损伤，增加患病的风险。

规律作息：保持规律的作息对于预防消化性溃疡同样至关重要。应尽量避免熬夜和过度劳累，确保充足的睡眠和适当的休息，这样有助于维持胃黏膜的正常功能，减少因作息不规律导致的胃肠道问题。

避免滥用药物：非甾体抗炎药（如阿司匹林、布洛芬等）是导致消化性溃疡的常见药物之一。在使用这类药物时，应在医生的指导下进行，并尽量选择对胃黏膜损伤较小的药物。此外，避免长期或不必要的使用，以减少对胃肠道的潜在伤害。

定期体检：定期进行胃部检查是预防消化性溃疡的重要手段，尤其是对于那些有消化性溃疡家族史或其他高危因素的人群。通过定期体检，可以及早发现潜在的病变，及时采取治疗措施，防止病情进一步恶化。

心理健康管理：保持良好的心理状态对于预防消化性溃疡同样不容忽视。长期的精神压力和焦虑情绪可能会对胃肠道功能产生负面影响。因此，应学会调节情绪，避免过度紧张和焦虑，必要时可寻求专业的心理咨询或参加相关的支持小组，以获得心理上的支持和帮助。

四、消化性溃疡的治疗

消化性溃疡是一种常见的胃肠道疾病，其治疗需要综合考虑多种方法。通过这些方法，可以有效缓解症状，促进溃疡愈合，并预防复发。

药物治疗：药物治疗是消化性溃疡的主要治疗手段，涵盖了多种药物类别。首先，抑酸药物是其中的重要组成部分，主要包括质子泵抑制剂（PPIs）如奥美拉唑、兰索拉唑等，以及H₂受体拮抗剂如雷尼替丁、法莫替丁等，这些药物通过抑制胃酸分泌，减轻胃黏膜的损伤^[2]。其次，抗幽门螺杆菌药物如克拉霉素、阿莫西林等，旨在根除幽门螺杆菌感染，防止溃疡复发。此外，黏膜保护剂如硫糖铝、铋剂等，通过在胃黏膜表面形成保护层，促进溃疡愈合，减少胃酸对溃疡面的侵蚀。

手术治疗：对于部分患者，尤其是那些对药物治疗反应不佳或出现严重并发症（如穿孔、大出血、梗阻等）的情况，手术治疗成为必要选择。手术方式多样，包括溃疡切除、胃大部切除等，旨在彻底清除病灶，恢复胃部正常功能。

中医治疗：中医理论认为，消化性溃疡的发生与脾胃虚弱、气滞血瘀等因素密切相关^[3]。因此，中医治疗常采用黄芪、白术、甘草等中药，通过调理脾胃、活血化瘀的方法，改善患者的整体状况，促进溃疡的愈合。中医治疗注重整体调理，强调辨证施治，旨在从根本上恢复机体的平衡状态。

五、患者日常生活中的注意事项

饮食建议：为了避免一次性进食过多给胃部带来过重的负担，建议患者采取少量多餐的饮食方式，分多次进食，每次摄入量不宜过多，以减轻胃部的压力。在进食过程中，应充分咀嚼食物，使其变得更加细碎，这样不仅有助于食物的消化吸收，还能减少对胃黏膜的刺激。此外，应尽量避免摄入对胃黏膜有刺激性的食物，如咖啡、浓茶、辣椒等，这些食物可能会加重溃疡症状，影响病情恢复。

生活习惯：适当的运动如散步、慢跑等，可以促进胃肠蠕动，帮助消化，但需注意运动量不宜过大，以免加重身体负担。在日常生活中，应合理安排工作和休息时间，避免过度劳累，保证有充足的睡眠，以利于身体的恢复。此外，吸烟和饮酒都会对胃黏膜造成损伤，加重溃疡病情，因此患者应尽量避免吸烟和饮酒，以保护胃部健康。

心理调适：面对疾病，保持积极乐观的心态非常重要，避免过度焦虑和紧张，有助于病情的稳定和恢复。在心理压力较大时，可以寻求心理咨询师的帮助，或参加相关的支持小组，通过与他人的交流获得心理上的支持和安慰。

药物管理：在治疗过程中，必须严格按照医生的处方用药，不可自行增减剂量或随意停药，以确保治疗效果。同时，某些药物可能会对胃黏膜产生不良影响，加重溃疡症状，因此在用药时应咨询医生，避免药物相互作用带来的风险。

消化性溃疡虽常见，但通过科学的防治措施，可以有效地降低消化性溃疡的发病风险，减少并发症的发生。患者应积极配合治疗，调整生活方式，保持良好的心态，才能真正做到保“胃”健康。希望本文能为广大消化性溃疡患者提供有益的参考，帮助他们更好地管理自己的健康。

参考文献：

- [1] 谢晓义. 康复新液联合埃索美拉唑治疗消化性溃疡的临床效果[J]. 临床合理用药, 2024, 17(13): 68-70.
- [2] 高万欣. 药物治疗消化性溃疡新进展[J]. 临床合理用药, 2023, 16(23): 167-171.
- [3] 冯娜. 舒肝益胃汤治疗消化性溃疡临床观察[J]. 中国中医药现代远程教育, 2024, 22(19): 149-152.