

高血压是一种慢性疾病，是血液在血管中流动时对血管壁造成的压力值持续高于正常的现象。大多数患者可在没有任何症状的情况下发病。目前，高血压已成为全球范围内普遍存在的影响人类健康的疾病。在临床中，虽然治疗高血压的手段已得到普及，但是高血压的控制仍然面临挑战。因此，掌握高血压的分类及诊断标准，优化治疗和控制策略，对于高血压的管理十分重要。文章介绍高血压分类、病因、防治等知识，以提升公众对高血压的了解程度，培养其预防、控制和管理疾病的意识，守护身体健康。

别让高血压危害生命健康

文/ 宋玮 上海市虹口区江湾医院心内科，上海 200081

■ 高血压如何分类？

病因不同，高血压分类不一样。人的血压、年龄不同，高血压分类也不一样。

1.1 依据病因分类

高血压为常见的慢性健康问题，根据病因主要可以分为两大类：原发性高血压和继发性高血压。原发性高血压也被称作本原性或特发性高血压，通常与多种生活方式因素和遗传因素有着密切的关联。不健康的生活习惯，如过量摄入高盐食物、体重超标、吸烟以及饮酒等，都是导致原发性高血压的重要风险因素。继发性高血压是由其他一些特定疾病引起的，这些疾病包括慢性肾病、肾动脉狭窄以及内分泌系统疾病等。继发性高血压在所有高血压病例中的比例相对较低，大约为 5% ~ 10%。

1.2 依据血压分类

血压由收缩压和舒张压两个部分构成，分别代表了心脏在收缩和舒张时的血压水平。对于大多数健康的成年人来说，在安静休息的状态下，收缩压通常会保持在一个相对稳定的范围内，即在 100 ~ 130 mmHg（1 mmHg ~ 133.32 Pa），舒张压则通常维持在 60 ~ 80 mmHg。若机体的血压持续性地高于 130/80 mmHg 或 140/90 mmHg，这

可能是一个警示信号，表明该机体可能患有高血压，其健康状况需要加强关注和适当管理。高血压也被称为“无声的杀手”，因为其可能没有明显的症状，但长期未控制的高血压会增加心脏病、中风、肾脏疾病等多种严重健康问题的风险。因此，定期监测血压，了解自己的血压水平，对于维护整体健康十分重要。若血压读数异常，应及时咨询医生，以便及时采取必要的预防措施或治疗方案。

1.3 依据年龄分类

基于人类遗传多样性的广泛存在以及个体发育阶段的显著差异，高血压的诊断标准往往表现出一定程度的不一致性。因此，为了确保诊断的准确性和适用性，医生和医疗专家们依据血压数值（这包括收缩压和舒张压两个重要指标），针对不同年龄层的个体，制定了各自不同的高血压判定标准。这些标准的制定考虑到了不同人群的生理特点，如儿童、成年人以及老年人，他们的血压水平和对血压变化的反应各不相同。

1.3.1 成人

成年人高血压的定义是指个体的收缩压和 / 或舒张压持续性地超出了医学上所认定的正常血压范围。通常情况下，当成年人收缩压达到或超过 139 mmHg，以及舒

作者简介：宋玮，上海市虹口区江湾医院心内科主任医师，主要研究方向为心血管内科常见疾病冠心病、高血压、心律失常等的诊断和治疗。

张压达到或超过 89 mmHg 时,即可被诊断为高血压。在进行 24 h 动态血压监测或家庭血压自测时,标准则略有不同,即收缩压达到或超过 135 mmHg,或舒张压达到或超过 85 mmHg,也被视为高血压。根据相关的医学指南,即便是处于正常血压上限的较高值,也存在一定的健康风险。因此,对高血压以下的血压水平进行了更为细致的划分。临界高血压被定义为收缩压在 120 ~ 139 mmHg 和 / 或舒张压在 80 ~ 89 mmHg。收缩压低于 140 mmHg 和舒张压低于 90 mmHg 的血压水平,根据其具体数值,进一步细分为最佳血压、正常血压以及正常高值血压。高血压的分级包括一期、二期以及单纯收缩期高血压。其中,单纯收缩期高血压在老年人群中较为常见。高血压三期的定义为收缩压达到或超过 179 mmHg,或舒张压达到或超过 109 mmHg。此外,如果机体在经过药物治疗后,血压仍然无法降至正常水平,则被诊断为耐药性高血压。

1.3.2 新生儿与婴儿

新生儿高血压现象相对而言并不常见,根据统计数据,其发生率大约为 0.2% ~ 3.0%。在常规的新生儿体检过程中,通常不会包括血压的测量,因为该种状况并不普遍。然而,对于处于高风险状态的新生儿群体来说,高血压的发生概率会显著增加。在对新生儿的血压水平进行评估和监测时,医生和医疗人员必须综合考虑多个关键因素,这包括新生儿的胎龄、受孕年龄以及出生时的体重等。这些因素对于准确判断新生儿是否存在高血压的风险十分重要。需要注意的是,新生儿的血压测量需要使用专门设计的设备和方法,以确保结果的准确性。因为新生儿的血管较细,血压计袖带的尺寸和充气压力需要特别调整,以避免对脆弱的血管造成不必要的压力。

1.3.3 儿童与青少年

在儿童及青少年群体中,高血压的发病率介于 2% ~ 9%。若高血压长期得不到妥善处理,其可能会导致相关严重的健康问题,如引发心血管疾病、肾脏功能障碍等。因此,为了预防这些潜在的健康风险,建议对 3 岁以上的儿童进行定期的血压检查,以便及早发现血压异常,从而采取相应的干预措施。

相较于传统的诊所血压测量 (Office Blood Pressure Monitoring, OBPM), 24 h 动态血压监测 (24 hours Ambulatory Blood Pressure Monitoring, ABPM) 被认为是一种更为精确和全面的血压评估方法。ABPM 能够记录患者在 24 h 内的血压变化情况,包括睡眠时的血压水平,以此提供更为详尽的数据。由于高血压的诊断需要基于多次测量结果,因此在确诊前,临床通常会建议患者多次在门诊进行血压测量,以确保诊断的准确性。在诊断儿童高血压时,需要参考 3 次在不同时间点测量的平均血压值的标准。若该平均值达到或超过同性别、年龄、身高的 95%,则可以诊断为高血压。若平均血压值位于 90% ~ 95%,则被定义为高血压前期。值得注意的是,青少年的高血压诊断和分类标准可以参照成人标准,但仍然需要结合青少年的生长发育特点进行适当调整。

■ 高血压有哪些症状及其病因?

高血压往往缺乏显著的临床表现,因此其经常在人们为了检查其他健康问题而进行常规体检时被意外地诊断出来。有部分患者可能会经历头痛、眩晕、耳鸣、视力上的变化,或者出现短暂性的意识丧失等现象,这些都是高血压可能带来的症状。通过进行眼底检查,医生可以发现高血压性视网膜病变的迹象,这通常意味着患者可能患有高血压。该种病变可以分为 4 个不同的阶段,从轻微到严重。但需要注意的是,轻微的病变可能不易被察觉。检查结果可以帮助医生评估高血压的持续时间以及病情的严重程度。

2.1 原发性高血压的症状与病因

高血压并不局限于特定的年龄层,但是 40 岁以上的成年人更容易受到该种病症的影响。在所有被诊断出高血压的患者中,大约有 85% ~ 90% 的人患有原发性高血压。该种类型高血压的确切成因目前尚未完全明了。临床普遍认为,原发性高血压可能与遗传因素以及个体所处的环境因素有着密切的联系。这些环境因素可能包括饮食习惯、生活方式、压力水平以及社会经济状况等。且研究还表明,原发性高血压的风险会随

着年龄的增长而增加，这可能是因为随着年龄的增长，血管的弹性和功能逐渐下降，导致血压调节机制出现障碍。

2.2 继发性高血压症状与病因

继发性高血压是一种可能与多种症状和体征相关联的疾病，其已知的病因包括肾脏或内分泌系统疾病。如库欣综合征，这是一种身体对皮质醇等激素过度反应而引起的病症，其表现为胸腹部肥胖、葡萄糖耐受性降低、满月脸、“水牛背”以及紫色皮纹等特征性体征。甲状腺疾病，如甲状腺功能亢进或甲状腺功能减退，以及肢端肥大症，这是一种生长激素分泌过多导致的病症，也可能是高血压的诱因。

2.3 高血压相关的危象

当机体的收缩压达到或超过 180 mmHg，或者舒张压达到或超过 110 mmHg 时，这种情况下的血压在医学界被明确地定义为恶性或急进性高血压，也被称作“高血压危象”。该种血压水平极高，其所带来的健康风险是巨大的，极有可能引发严重的并发症。患者可能并不会表现出明显的症状，但与正常人群相比，他们更容易经历头痛和头晕等不适症状。高血压危象还可能导致心力衰竭而引起的视力减退或呼吸困难，以及肾功能衰竭而引起的其他身体不适。对于高血压患者来说，若血压已经升高，再遇到其他可能的诱发因素，可能会导致血压急剧升高，从而呈现为恶性或急进性高血压的状态。这种情况需要立即进行医疗干预，若不加以控制，可能会对心脏、大脑、肾脏和其他重要器官造成永久性的损害。

■ 高血压有哪些并发症？

高血压是全球范围内导致早逝的主要可预防因素之一，其可能引发多种并发症。该种病症主要与缺血性心脏病、中风、外周血管病变等心脏疾病紧密相关，也与认知障碍、痴呆和慢性肾脏病等健康问题有着密切的联系。高血压可能导致视网膜病变和肾病等并发症。这些健康问题的出现，无疑会严重影响患者的生活质量。因此，高血压的控制和管理对于预防这些并发症十分重要。

■ 高血压如何控制？

高血压是导致心血管疾病死亡的主要原因，但超过半数的高血压患者并未意识到自己的病情。这种情况的存在，不仅对个人健康构成威胁，也对公共卫生系统提出了严峻的挑战。为了有效控制血压，需要采取多种方法相结合的方式。改变生活方式和药物治疗是两种主要的方法。减轻体重、进行体育锻炼、适量摄入盐分、限制饮酒以及保持均衡饮食都有助于血压的管理。若这些方法无法有效控制血压，则需要服用药物干预，且定期监测血压，保持良好的睡眠质量，以及减少压力和焦虑，也是控制高血压的重要方面。

■ 结语

高血压这个“无声的杀手”损伤了患者的健康和生活质量，甚至有时会危及患者的生命安全。患者应根据高血压的发病原因和症状，及时预防和治疗，改变不健康的生活方式，让自己保持一个较好的健康状态。