

小儿湿疹的饮食调护

杨 斐 陈 黎[△] 姚俊丽

[内容提要] 湿疹是儿童常见的皮肤病,给患儿身心健康和家庭带来诸多影响,有针对性的饮食调护可以有效缓解患儿症状。本文通过对小儿湿疹的成因、发病特点和该病给患儿及家庭带来的影响进行阐述,让更多读者深刻认识、了解这一疾病,并详细介绍小儿湿疹的饮食注意事项、家庭护理措施,旨在减轻患儿症状,预防复发,提高患儿及家庭生活质量。

小儿湿疹是一种由多种因素引起的炎症性皮肤病,医学上也称之为“特应性皮炎”,确切病因还未完全阐明,在5岁以下学龄前儿童中高发,常见于面部、头颈、肘部和膝盖内侧等部位,表现为皮肤干燥、红肿、瘙痒、脱皮。小儿湿疹随着年龄的增长逐渐改善,早期干预和适当的护理能够减轻患儿症状,改善生活质量。

一、小儿湿疹的成因

小儿湿疹的成因多种多样,包括遗传因素、环境因素和免疫系统反应,常与过敏相关,可能对食物、环境过敏原等有敏感反应,使皮肤屏障功能降低,容易受到刺激和感染。过敏原如食物、尘螨和花粉可能引发小儿湿疹。此外,小儿自身的皮肤屏障功能差也会导致湿疹的发生。人体在免疫力弱时受到细菌、病毒等感染后,也会诱发湿疹。

[基金项目] 上海市第三届宝山区名中医传承工作室项目 (BSMZYGZS-2024-10)。

[△]通讯作者

二、小儿湿疹的发病特点

小儿湿疹的发病特点主要包括以下几点:①通常在婴儿期(3~6个月)出现,随着年龄增长,部分患儿症状可能会逐渐改善。②常见症状包括干燥、脱皮、红斑、



瘙痒和渗出,严重时可出现结痂和皮肤裂口。③皮损多见于面部、头皮、颈部、肘部和膝部,婴儿则常见于脸颊。④瘙痒是湿疹的典型特征,剧烈瘙痒导致患儿频繁抓挠,使病情加重。⑤患儿多具有过敏体质倾向,常伴有其他过敏性疾病,如哮喘、过敏性鼻炎等,家族中也可能有过敏史。⑥湿疹往往呈现反复发作的特点,受环境、气候和饮食等因素影响。

三、小儿湿疹的影响

湿疹给患儿和家庭带来不同程度的影响。湿疹会导致瘙痒、红肿、干燥和脱皮,影响患儿的日常活动和睡眠。破损的皮肤更容易感染,持续的瘙痒可能导致患儿焦虑、烦躁,影响情绪。特别是当湿疹明显可见时,患儿可能会感到自卑或受到同伴的排斥。湿疹可能影响患儿的运动、游戏和社交活动,影响其生活体验。若湿疹与食物过敏相关,可能需要对饮食进行严格控制,影响患儿的饮食习惯。湿疹需要定期的护理和管理,包括药物治疗和日常管理,增加了家庭的经济负担。总之,湿疹不仅影响患儿的身体健康,还可能对其日常生活和心理发展造成严重影响。

四、小儿湿疹的饮食注意事项

小儿湿疹的积极管理非常重要。饮食调护在小儿湿疹管理中扮演着重要角色,识别和避免过敏原,选择适合的食物可以帮助患儿减轻湿疹症状。

(一) 过敏原食物

某些食物被认为是常见的过敏原,可能导致湿疹发作或加重,主要包括牛奶(许多儿童对牛奶蛋白过敏)、鸡蛋(常见过敏原之一)、坚果(如花生、杏仁等)、海鲜(如虾、蟹等)、小麦(部分儿童对小麦中的谷蛋白过敏)等。建议家长记录孩子的饮食和湿疹症状,以便识别可能的过敏原或刺激物。推荐选择低过敏性食物、新鲜水果和蔬菜、富含 omega-3 脂肪酸食物、全谷物,补充水分。

①低过敏性食物:如米饭、燕麦、土豆等,适合敏感体质的患儿。

②新鲜水果和蔬菜:如苹果、香蕉、胡萝卜和菠菜等,富含维生素和抗氧化剂,有助于增强免疫力,改善皮肤状况。

③富含 omega-3 脂肪酸的食物:如鱼类(三文鱼、鲑鱼、沙丁鱼)和亚麻籽等,富含维生素、矿物质、omega-3 脂肪酸,有助于减轻炎症,改善皮肤的整体健康。

④全谷物:如全麦面包和燕麦,提供膳食纤维,有助于消化。

⑤补充水分:保证充足的水分摄入,保持皮肤的水分平衡。

(二) 刺激性食物

①辛辣和油腻食物:如辣椒、咖喱等,有些患儿对辛辣食物敏感,可能导致皮肤反应加重。烧烤、火锅等具有一定的刺激性,可能会加重炎症反应,尽量减少摄入。

②高糖分和加工食品:避免摄入过多高糖分和含有添加剂、防腐剂的加工食物,可能会引发炎症,加重湿疹症状。

(三) 食物引入的注意事项

注意食物过敏原,逐步引入新食物。家长在给孩子引入新食物时,建议采取逐一引入法,每次只添加一种新食物,并观察孩子是否有不良反应,持续 2~3 天再引入下一种。

五、小儿湿疹的家庭护理措施

小儿湿疹的家庭护理也非常重要,有助于缓解症状,预防复发。

(一) 保持皮肤湿润

小儿湿疹护理重要步骤之一是保湿,保湿既能增加皮肤的油脂,又有助于修复受损的皮肤屏障,缓解皮肤干燥、瘙痒、泛红等不适。选择适合婴幼儿、无香料、低过敏性的保湿霜或油,定期为孩子涂抹,尤其是在洗澡后,建议每天至少涂抹 2 次。在皮肤发痒或干燥的部位,可以用湿毛巾敷几分钟,再涂保湿霜。《欧洲 2012 年特应性皮炎指南》推荐患有湿疹的儿童每

周使用 150~200 g 保湿霜;《中国特应性皮炎诊疗指南(2020 版)》强调,儿童每周保湿霜用量要达到 100 g。

(二) 养成良好的洗澡习惯

选择温水洗澡,水温一般为 37~40℃,不宜过高,每次洗澡时间控制在 10~15 min,频率 1~2 次/周,洗后立即涂抹保湿霜。洗澡时使用无香料、无刺激性的沐浴露或肥皂,避免使用含有酒精或香料的洗浴产品。

(三) 注意穿着

衣物应以宽松舒适、柔软干净为主,选用纯棉等天然材料的衣物,避免化纤或羊毛制品,以减少皮肤刺激,加重湿疹。确保衣物舒适,避免过紧的衣物,保持衣服干燥,避免孩子衣服湿热。

(四) 环境控制

使用加湿器,保持空气湿润,避免干燥环境,一般湿度控制在 40%~60%,温度控制在 20~25℃,且每天保证一定的通风时间,一般大于半小时。保持居住环境清洁,定期清洗床单、玩具,减少尘螨、宠物毛发和花粉等过敏原,给孩子提供良好的生活环境。

(五) 减少刺激,控制抓挠

定期修剪孩子的指甲,减少抓挠造成的皮肤损伤。在睡觉时给孩子戴上棉质手套,以免孩子因皮肤瘙痒而用手抓挠,加重皮损。如果孩子出现瘙痒情况,家长可以轻轻按压或者拍打瘙痒处,帮助孩子缓解瘙痒感。

(六) 情绪和心理支持

儿童年龄较小,身体忍受疼痛和瘙痒的能力比较弱,只能通过哭闹来表达,家长可放一些舒缓的音乐或比较有童趣的动画片等吸引孩子的注意力。当孩子哭闹不止时,可以将孩子抱起及时安抚。要保证孩子睡眠充足和作息规律。随着儿童年龄增长,教会孩子如何照护自己的皮肤,嘱孩子避免抓挠,与孩子进行积极互动,给予情感支持,减少焦虑感。

(七) 定期就医,寻求专业指导

首先,家长应详细了解药物的注意事项与用法,积极向医护人员了解药物的特点,提升用药能力。对于轻度湿疹,单纯用低敏保湿润肤霜护理,患儿一般可以自愈,但对于中重度湿疹,外用激素药膏是首选。家庭自行护理湿疹时,激素药膏使用时间以 5~7 天为宜,若 7 天后湿疹症状未改善,要及时就医,寻求专业指导,评估病情和调整用药。

六、小结

湿疹会影响小儿身心健康、正常生活,通过这些日常饮食及护理措施,帮助患儿减轻痛苦。建议家长在专业医生的指导下,制订适合孩子的饮食计划及家庭护理措施,以帮助缓解湿疹症状,改善生活质量。

(作者杨斐 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心;作者陈黎、姚俊丽 上海市宝山区中西医结合医院)