

慢性肠炎的这些症状咋缓解

山东大学齐鲁医院德州医院 隋新

如果你经常在饭后或紧张时感到肚子隐隐作痛、胀气，或者动不动就拉肚子、大便不成形，有时候还夹杂着黏液，那就要警惕慢性肠炎的可能了。这种肠道问题反反复复，虽然不像急症那样来势汹汹，但长期的不舒服会严重影响生活和工作。其实，了解有哪些症状以及如何应对，是管理好慢性肠炎的第一步。

肠道的“长期不适”信号：慢性肠炎常见症状

腹部不适的“主旋律”。可能会感受到腹部隐隐作痛或绞痛，位置常在肚脐周围或下腹部，排便后有时能缓解。常伴随腹部胀气，感觉肚子里充满了气体，鼓鼓囊囊很不舒服，按压腹部也可能感觉不适。

排便习惯的“紊乱交响”。肠道功能失调是最核心的表现。腹泻很常见，粪便可能稀软、不成形，甚至带有黏液，排便次数明显增多。但也有人表现为便秘，排便费力、次数减少。更令人烦恼的是腹泻与便秘交替出现，肠道仿佛失去了规律。

排泄物的“细微线索”。细心观察有时能发现端倪。粪便中可能混有黏液，像透明的鼻涕状物质。虽然便血在慢性肠炎中不如在溃疡性结肠炎或克罗恩病中常见，但也可能出现，或表现为粪便潜血试验阳性。如果粪便带有脓液或带有明显腥臭味，通常提示炎症较重或有感染因素存在。

身体整体的“不和谐音”。肠道长期不适会波及全身，你可能感到持续的疲惫乏力，做什么都提不起精神；胃口下降、吃不下东西，或者即使吃了也感觉腹胀难受。长期的消化吸收不良，可能导致体重在不知不觉中下降。少数人还可能伴随低烧。

情绪上的“连带波动”。千万别忽视“肠脑轴”的联系！肠道不适会显著影响情绪，让人感到焦虑、烦躁或情绪低落。反过来，精神紧张、压力过大又常常成为诱发或加重肠道症状的“导火索”，形成恶性循环。

与肠道和解：实用缓解之道

饮食调整 患者需通过记录“饮食—症状”日记（连续 1~2 周记录进食内容及后续几小时的不适反应），精准识别并严格避免诱发症状的食物，如辛辣火锅、油炸食品、生冷海鲜、豆类或乳制品。日常饮食应遵循易消化、低刺激、营养均衡原则。发作期首选清粥、软烂面条、馒头、蒸蛋羹等低渣食物；蔬菜以煮熟的绿叶菜（菠菜、小白菜切碎煮烂）和瓜茄类（冬瓜、西葫芦）为主；水果选择熟香蕉、蒸苹果泥等低纤维品种；蛋白质来源以清蒸鱼、鸡胸肉等低脂瘦肉为佳。同时，需避免生冷、油炸、辛辣调味品、浓茶、咖啡、酒精。烹饪方式推荐蒸、煮、炖等低油方法，食材需切碎煮烂，以减轻肠道负担。此外，定时定量进餐（七分饱为宜）、细嚼慢咽有助于维持肠道节律。

优化生活细节为肠道减负 保证充足、高质量睡眠（建议 23 点前入睡），有利于肠道夜间自我修复。规律进行温和运动如散步、瑜伽、游泳等，可促进肠道蠕动、缓解腹胀便秘并释放压力，需注意循序渐进并长期坚持。务必戒烟，以减少对肠道的刺激和炎症反应，必要时寻求专业戒烟支持。避免自行长期服用抗生素或非甾体抗炎药（如布洛芬），此类药物可能损伤肠黏膜，用药前需咨询医生。

管理情绪压力 可以通过听音乐、阅读、外出旅行、钓鱼、户外露营等爱好转移注意力；维持社交支持网络，及时倾诉情绪。若焦虑抑郁症状显著，建议接受心理咨询或认知行为治疗。

谨慎借助药物治疗 慢性肠炎症状易与肠易激综合征、炎症性肠病等混淆，需通过肠镜等医

学检查确诊病因，严禁自我诊断。若医生确诊为慢性肠炎，将根据病因及症状开具药物：（1）调节菌群。使用双歧杆菌、乳酸杆菌等益生菌制剂恢复微生态平衡。（2）控制症状。短期应用止泻药（如蒙脱石散吸附毒素）或通便药，辅以解痉剂缓解腹痛。（3）抗炎治疗。对明显炎症者使用肠黏膜保护剂（如铋剂）或特定抗炎药。总的来说，慢性肠炎的症状可以通过饮食调整、规律作息、压力管理和遵医嘱用药来有效缓解。坚持这些简单实用的措施，能显著减轻不适并改善生活。