

肝脏是人体中一个非常重要的器官，承担着代谢、解毒、合成蛋白等多项关键任务。它就像人体的“化工厂”，负责清除体内的毒素、储存营养、生成必需的蛋白质等。但如果肝脏长期遭遇损伤，它可能会发展成肝硬化，这是一种常见且危害极大的慢性疾病。

明明白白了解肝硬化

文/黄悦 西安市第九医院，陕西 西安 710054

1 什么是肝硬化？

肝硬化是一种肝脏长期损伤引起的慢性病，表现为肝脏结构的异常改变和功能的严重受损。简单来说就是，肝脏在长期受到伤害后，原本柔软的组织逐渐变硬、纤维化，最终形成一种类似“疤痕”的组织，进而影响肝脏的功能。通常，肝硬化是长期的肝脏炎症、肝脏损伤积累引起的，早期常常没有明显症状，因此很多人直到病情严重时才发现自己患上了肝硬化。

2 肝硬化的主要原因

肝硬化是一个长期过程。日常生活中有很多因素可能导致肝脏受到损伤，从而引发肝硬化，下面是一些常见的肝硬化原因。

2.1 长期酗酒

长期过量饮酒是肝硬化的主要原因之一。酒精会直接伤害肝脏细胞，过度饮酒会使脂肪积聚，导致肝炎甚至肝硬化。一个人如果长期过量饮酒，其肝脏承受的压力就会越来越大，最终可能发展为肝硬化。

2.2 慢性病毒性肝炎

病毒性肝炎是肝硬化的另一大原因。特别是乙型肝炎和丙型肝炎，这些病毒会侵入肝脏，引起炎症，长期炎症将导致肝脏组织的损伤和纤维化。如果不及时治疗，慢性肝炎会发展成肝硬化，甚至肝癌。

2.3 脂肪肝

随着现代社会饮食习惯的变化，越来越多的人患上了脂肪肝。脂肪肝是指脂肪在肝脏中过度积累的现象，如果不加以控制，脂肪肝可能会发展成非酒精性脂肪性肝炎，最终导致肝硬化。因此，肥胖、高脂饮食、缺乏运动等因素都增加了脂肪肝的风险。

2.4 药物滥用和毒素

一些药物，尤其是长期使用的药物，比如止痛药、抗生素、降血脂药物等，可能对肝脏造成伤害。某些毒素，如某些化学物质和药物过量使用，会损害肝脏细胞，增加肝硬化的风险。

2.5 遗传因素

某些遗传性疾病也会导致肝硬化。例如，血色病和肝豆状核变性等遗传性疾病，会导致人体内的铁或铜在肝脏中积累，从而损伤肝脏，进而发展成肝硬化。

2.6 免疫性疾病

自身免疫性疾病如自身免疫性肝炎，指的是免疫系统错误地攻击肝脏组织，引发肝脏炎症并逐渐损伤肝脏。长期的免疫攻击会导致肝脏纤维化，最终发展为肝硬化。

3 肝硬化的症状有哪些？

肝硬化的症状因人而异，且早期症状通常并不明显。很多人可能在肝脏已经受损的情况下，仍然没有明显的

作者简介：黄悦，副主任医师，主要研究方向为肝胆胃肠相关。

不适。但随着病情的恶化，肝硬化的症状会逐渐显现。肝硬化常见的症状包括以下 6 项。

3.1 疲乏无力

这是最常见的肝硬化症状之一。肝硬化患者常常感到乏力、精力不足，甚至做一些轻松的活动也会感到疲惫。主要原因是肝脏受损后，无法有效地合成身体所必需的蛋白质，导致身体的代谢功能下降。

3.2 黄疸

黄疸是指皮肤和眼睛的巩膜（眼白部分）变黄。这是因为肝脏无法正常处理胆红素，胆红素在血液中积累，最终在皮肤上呈现出黄色。

3.3 腹部肿胀

肝硬化患者常常出现腹部肿胀，原因是肝脏无法有效地代谢液体，导致体内液体积聚在腹部，形成腹水。腹水让肚子变得鼓胀，甚至影响呼吸。

3.4 食欲减退和体重下降

肝硬化患者通常会食欲减退，进而导致体重下降。这是因为肝脏无法有效地合成和分泌消化所需的酶和蛋白质，影响了胃的正常消化功能。

3.5 出血和淤血

由于肝脏制造凝血因子的功能受损，肝硬化患者更容易出现皮肤淤血、牙龈出血等问题。同时，肝硬化还使得其凝血功能受损，增加了出血的风险。

3.6 意识模糊和肝性脑病

肝硬化导致肝脏功能减弱，无法清除体内的毒素，进而可能影响患者大脑的功能。此时患者会出现意识模糊、记忆力减退，甚至昏迷的症状。这种情况被称为肝性脑病。

4 如何诊断肝硬化？

肝硬化的诊断依赖于病史、体征检查和一系列的医学检查。

4.1 体格检查

体格检查是肝硬化诊断的重要一步，医生通过观察和触诊来判断患者的肝脏是否存在异常。常见的体征包括腹部膨胀（腹水）、黄疸（皮肤和眼睛发黄）以及肝脏

肿大或硬化。在检查过程中，医生还会注意到患者是否有蜘蛛痣（皮肤上出现小红点）或肝掌（手掌发红）等特殊表现，这些都是肝硬化的常见体征。

4.2 血液检查

血液检查是诊断肝硬化的重要辅助手段。通过测量一些特定的血液指标，医生可对肝脏功能的损伤情况进行评估与判断。常见的检查项目包括肝功能检查（如谷丙转氨酶 ALT、谷草转氨酶 AST、总蛋白等）、凝血功能检查（如凝血酶原时间）以及肝炎病毒的检测（乙肝、丙肝病毒抗体等）。这些检查可以帮助医生判断肝脏是否有慢性病变，是否已发展为肝硬化。

4.3 影像学检查

影像学检查，如超声波检查、电子计算机断层扫描（Computed Tomography, CT）和磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRI）等，能提供肝脏的详细图像，帮助医生观察肝脏的形态和结构变化。肝硬化的患者常常会出现肝脏大小不均、硬化和结节的症状。超声波检查是最常用的检查方法，不仅无创、方便，还能有效评估肝脏是否有腹水、肝脏大小是否变化等。

4.4 肝脏活检

肝脏活检是取少量肝脏组织在显微镜下检查，以确认肝硬化的程度。这是一种最直接、最准确的诊断方法，但由于操作过程涉及一定的创伤和风险，通常不作为常规检查使用。医生通常在其他检查无法明确诊断时，才会建议患者进行肝脏活检。

5 肝硬化的治疗方法

肝硬化是一个慢性疾病，虽然无法完全治愈，但通过科学的治疗可以控制病情，改善患者的生活质量。

5.1 药物治疗

药物治疗是治疗肝硬化的重要手段。根据病因不同，医生会选择合适的药物来缓解症状、降低肝脏损伤。

5.1.1 抗病毒药物

对于乙型肝炎或丙型肝炎病毒引起的肝硬化，抗病毒药物是治疗的关键。这些药物能够抑制病毒复制，减少病毒对肝脏的损害，从而减缓肝硬化的进程。常用的

抗病毒药物有口服药物如恩替卡韦、拉米夫定等，能够有效控制病毒感染，防止肝脏进一步受损。

5.1.2 保肝药物

保肝药物主要用于减轻肝脏炎症、改善肝脏功能。常见的保肝药物有甘草酸制剂、复合维生素等，它们能够促进肝细胞的修复和再生，减轻肝脏负担，帮助肝脏恢复功能。虽然这些药物不能完全治愈肝硬化，但在改善肝脏健康、缓解症状方面有一定的作用。

5.1.3 利尿剂

肝硬化患者常常伴有腹水和水肿，利尿剂可以有效帮助患者排除体内多余的水分，减轻腹部胀满感和浮肿症状。常用的利尿剂有呋塞米、螺内酯等，它们通过促进尿液排出，能有效控制肝硬化引起的水肿问题，从而改善患者的生活质量。

5.2 肝脏移植

对于晚期肝硬化患者，如果肝脏严重衰竭，无法通过药物治疗控制病情，肝脏移植可能是唯一的治疗选择。肝脏移植是指将供体的健康肝脏移植到患者体内，替代已经严重受损的肝脏，从而恢复患者肝脏的功能。移植后，患者的生活质量和预期寿命都会有大幅改善。不过，肝脏移植的条件比较严格，患者需要满足一定的健康标准，且需要等待合适的肝脏供体。此外，移植手术完成后，患者需要长期服用免疫抑制药物，以防止排斥反应。虽然肝脏移植是一项复杂的手术，但它为许多晚期肝硬化患者带来了新的希望。

6 如何预防肝硬化？

肝硬化是一种慢性肝脏疾病，通常是长期肝脏损伤引起的。它会导致肝脏功能下降，影响正常的代谢和排毒功能。虽然肝硬化的治疗比较困难，但通过日常的预防措施，可以有效降低其发生的风险。

6.1 避免长期酗酒

长期酗酒是导致肝硬化的主要原因之一。酒精对肝

脏有很强的损伤作用，长期过量饮酒会导致肝细胞损伤，最终引起肝硬化。因此，保持适度饮酒，最好遵循健康饮酒的原则，女性每天不超过一杯，男性不超过两杯。如果可能，尽量戒酒，减轻对肝脏的负担。

6.2 接种乙肝疫苗

乙型肝炎病毒感染是导致肝硬化的重要因素之一。接种乙肝疫苗能够有效预防乙型肝炎的传播，减少由乙肝引起的肝脏损伤。特别是对于高风险人群，如医务人员、频繁接触血液的人群，更有必要接种乙肝疫苗。

6.3 健康饮食，避免肥胖

健康的饮食有助于维持肝脏的正常功能，避免肥胖是预防肝硬化的一个重要因素。过度肥胖，尤其是腹部脂肪过多，会增加脂肪肝的发生风险，进而引发肝硬化。因此，要保持健康饮食，减少高脂肪、高糖食物的摄入，增加蔬菜、水果和高纤维食物的摄入，定期进行适度运动，保持健康体重。

6.4 定期体检，早期发现肝病

定期体检有助于及早发现肝脏问题，避免病情恶化。特别是有肝病家族史、长期饮酒的人或乙肝病毒携带者，要定期进行肝功能检查和肝脏超声波等检查。如果发现异常，及时就医并进行治疗，可以有效避免肝硬化的进一步恶化。

7 结语

肝硬化虽然是一种严重的疾病，但通过日常的健康管理和早期预防，完全可以减少患病风险。保持良好的饮食习惯，适量运动，避免酗酒，接种疫苗，都是预防肝硬化的有效方法。定期体检，及时发现肝脏问题，才能更早地采取措施，保护肝脏健康。希望大家都能重视肝脏的保护，过上更加健康的生活。预防肝硬化，从现在做起，关爱自己的肝脏，拥有一个健康的未来！