

类风湿关节炎的主要症状有哪些？

新疆维吾尔自治区中医医院风湿科 韩玲

类风湿关节炎是一种自身免疫疾病，以侵蚀性关节炎为主要特征，滑膜炎是其病理基础，若不加以控制，最终可能导致关节畸形。其临床表现多样，严重影响患者的日常活动和身体健康。很多患者因不了解类风湿关节炎的症状，未能及时察觉疾病，直至病情严重才有所警觉，从而延误了最佳治疗时机。因此，及时识别病症至关重要。

一、引发类风湿关节炎的危险因素

类风湿关节炎是一种自身免疫性疾病，其致病因素众多，由多种内外因素共同作用引发。只有了解致病风险因素，才能做到对症治疗。(1) 遗传因素：研究表明，类风湿关节炎具有一定遗传性，约 60%-70% 的患者有家族史，可能与某些遗传基因有关。(2) 环境因素：环境因素对类风湿关节炎的发生有重要影响。长期吸烟人群患病风险显著增加，长期吸烟的患者患病概率至少增加一倍。此外，空气污染、职业暴露等因素也可能提高患病风险。(3) 感染因素：某些病毒和细菌感染可能触发类风湿关节炎相关疾病。如 EB 病毒、单纯疱疹病毒和肠道细菌等感染都有可能引发类风湿关节炎。(4) 激素因素：女性患类风湿关节炎的风险比男性高出 2-3 倍，可能与雌激素、孕激素等激素水平的变化有关。(5) 免疫系统异常：类风湿关节炎是由于自身免疫系统错误攻击关节组织所致，主要涉及多种免疫细胞和炎症因子，比如 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、肿瘤坏死因子 α 等。(6) 心理因素：长期压力和心理创伤可能通过复杂的神经免疫调节机制影响类风湿关节炎的发生和发展。例如，抑郁症和焦虑症患者的类风湿关节炎发病率较普通人群更高。

二、类风湿关节炎的症状表现

类风湿关节炎是一种慢性、全身性自身免疫性疾病，主要症状包括关节疼痛、畸形和功能障碍。其病情通常较为隐匿，但随着病情逐渐加重，会严重影响生活质量。(1) 关节疼痛：类风湿关节炎早期常出现关节疼痛，多为对称性、持续性疼痛，可能表现为轻微隐痛或剧烈疼痛。疼痛部位常见于手指、手腕、脚趾、脚踝等小关节，随着病情发展，可能累及膝关节、肘关节等大关节。(2) 关节肿胀：关节肿胀也是类风湿关节炎的早期症状之一，通常与关节疼痛同时出现，由滑膜肿胀和关节腔积液导致。肿胀的关节外观比正常关节粗大，触摸时能感觉到关节周围皮肤紧绷，温度可能略高于正常关节。(3) 晨僵：主要表现为早晨起床后关节出现僵硬感，如同被胶水粘住，活动不灵便。晨僵通常发生在手指、手腕、肘部等部位，一般持续时间在 1 小时以上，有的患者甚至可能持续数小时。(4) 关节畸形：以手部关节畸形最为常见，如手指的鹅颈样畸形、纽扣花样畸形等。这些畸形是长期炎症侵蚀关节结构的结果，一旦形成便难以恢复，严重影响患者的肢体外观和正常活动。(5) 关节外损害：类风湿关节炎可能导致关节外损害，表现为淋巴结肿大，以及肺、心、血液、神经、皮肤血管、眼等多个脏器病变，这会加重患者病情，降低生活质量。(6) 全身症状：若患者病情较为严重，可能出现发热、疲劳无力、食欲减退、体重减轻等全身不适症状。

三、日常护理类风湿关节炎的要点

类风湿关节炎对患者的身体和生活都会造成严重影响，虽然难以根治，但可以通过日常护理减轻不适。(1) 合理膳食：类风湿关节炎患者应注意热量摄入均衡，避免过多摄入甜食和油炸、油煎食品，以免热量超标，导致体重过重，增加关节负担，加重骨关节疼痛感。(2) 戒烟戒酒：患者日常应戒烟戒酒，烟和酒精的摄入可能刺激血液循环，进而加重关节病变。(3) 注意保暖：类风湿关节炎患者应尽量不穿暴露关节的衣物，不用冷水洗漱、不淋雨，以免寒冷刺激导致血管

收缩，加重炎症反应。

总之，类风湿关节炎是一种慢性全身性自身免疫疾病，症状表现复杂多样。了解其致病因素与症状，做好日常护理，有助于缓解病情，减少疾病困扰。