

保持房间的通风环境,保障患儿睡眠时间等等,进而促使患儿加快痊愈。经上述内容,认为应在手足口病护理中采取个性化护理与健康教育措施,可达到最终的护理目的,故更值得推荐与使用。

参考文献

- [1] 郭丽红. 个性化护理配合健康教育在小儿手足口病感染防控护理中的应用 [J]. 昆明医科大学学报, 2016, 37(2): 144-146.
- [2] 卢海霞, 李海燕. 个性化护理配合健康教育在小儿手足口病感染防控护理中的应用研究 [J]. 双足与保健, 2017, 26(7): 110-111.
- [3] 杨英梅. 个性化护理配合健康教育在小儿手足口病感染防控护理中的应用 [J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2016, 37(5): 650-651.

· 科普知识 ·

脂肪肝的症状和治疗方法

脂肪肝是一种常见肝脏病理病变,是仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,脂肪肝不是一种独立的疾病,而是由于各种原因引起的肝细胞脂肪堆积过多的病变,脂肪肝发病率高,在肥胖群体中尤为常见,会对患者的健康造成很大的影响,病重者病情凶猛,必须及时治疗。脂肪肝作为一种可逆性疾病,如果能明确其临床症状,积极预防和进行早期治疗,能有效改善脂肪肝患者的预后,减少脂肪肝对患者健康和生活的影响。

1 脂肪肝的症状

根据脂肪肝的类型和病情,具体症状有所不同。脂肪肝可分为酒精性和非酒精性两大类,根据肝脏中脂肪含量的比例可分为轻度、中度和重度三种类型,一般脂肪含量超过 5%、低于 10% 为轻度脂肪肝,超过 10%、低于 25% 为中度脂肪肝,超过 25% 则为重度脂肪肝。脂肪肝的起病比较隐匿,病情发展缓慢,在发病初期,即轻度脂肪肝时期,大多没有明显的临床症状,最为常见的症状是容易感到疲劳,这种非典型的症状容易被忽略,许多轻度脂肪肝患者都是在健康体检的过程中偶然发现的。随着病情的发展,患者肝部的脂肪含量比例越来越高,发展到中度或重度的阶段会出现类似肝炎的症状,患者疲倦乏力的情况会更加明显,出现食欲不振、恶心呕吐、右上腹隐隐作痛等情况。当病情进一步发展,患者肝内脂肪沉积过多,肝脏变得肥大,肝被膜膨胀、肝韧带受到牵拉,会引起明显的右上腹疼痛、压痛,患者还会出现发热、炎症等症状,很容易被误诊为急腹症。除此之外,患者的口腔容易发炎、牙龈出血、手脚感觉异常或者麻木,部分患者还会出现胃肠道出血、鼻衄等。中度脂肪肝患者可出现低钾血症、低钠血症等电解质紊乱症状,以及下肢水肿、腹腔积液等。总之,脂肪肝的临床症状十分多样,掌握其具体症状表现,有利于早期的诊断和治疗。

2 脂肪肝的治疗方法

脂肪肝的治疗应根据具体发病原因有针对性地进行,在治疗前首先应明确发病原因,例如因患者长期大量饮酒导致的酒精性脂肪肝;因营养过剩、过度肥胖引发肥胖性脂肪肝;因过分节食引发的快速减肥性脂肪肝;因缺乏蛋白质引发的营养不良性脂肪肝;以及糖尿病、药物、妊娠等因素引发的脂肪肝。针对具体的病因进行对症治疗才能取得较好的治疗效果。酒精性脂肪肝患者应戒酒养肝,肥胖型脂肪肝患者应控制饮食、减轻体重,糖尿病脂肪肝患者应控制血糖,营养不良性脂肪肝患者应增加蛋白质和维生素的摄入,补充营养。除此之外,调整饮食结构,进行低糖、低脂的饮食,加强有氧运动锻炼,促进脂肪消耗以及补充硒元素都对脂肪肝的治疗有重要意义。

控制和优化饮食是治疗脂肪肝的有效方法,首先应限制热量的摄入,消耗肝脏细胞内的脂肪,特别是肥胖的脂肪肝患者,应加强体重控制,尽快使体重恢复到正常水平;限制脂肪的摄入,每日不超过 0.8 g/kg,最好选取植物性油脂,或富含不饱和脂肪酸的食物,限制碳水化合物摄入,每日不超过 4 g/kg;进行优质蛋白的摄入,每日不超过 1.5 g/kg,应注意植物蛋白和动物蛋白的结合,如豆制品、奶制品和鱼虾等;多食新鲜绿叶蔬菜,补充维生素,但要注意糖分的控制,含糖量高的蔬果应适当限制,食盐每日不超过 6 g,并适当增加饮水,加速排泄和身体代谢;忌食辛辣油腻和刺激性强的食物,可多进食甲硫氨酸丰富的食物,例如芝麻、菜花、小米、菠菜等。

除了饮食外,增加运动锻炼也是脂肪肝患者应该注意的,运动锻炼以全身锻炼和增强耐力为主要目的,进行有氧运动,控制运动强度,以不过度劳累为宜,具体运动频率、运动方式和运动强度应根据患者的体质进行定制和调整。

总之,脂肪肝是现代社会的常见病,对患者的健康影响很大,明确脂肪肝的症状,积极治疗并配合合理的饮食以及运动锻炼,能有效提高治疗效果,改善患者预后。

陈超

(成都市郫都区唐昌镇卫生院)