

饮食调理对胃肠功能紊乱的重要性

汪 云

(南京市高淳人民医院, 江苏南京 211300)

摘 要: 胃肠功能紊乱是指胃肠道的运动、分泌和吸收功能异常, 导致消化不良、腹胀、腹痛和腹泻等症状。通过饮食调理, 能够帮助调整胃肠功能, 缓解症状, 促进消化吸收, 提高肠道健康。因此, 本文分析饮食调理对胃肠功能紊乱的重要性。

关键词: 饮食调理; 胃肠功能紊乱; 合理膳食

DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2023.32.024

The Importance of Dietary Regulation on Gastrointestinal Dysfunction

WANG Yun

(Nanjing Gaochun People's Hospital, Nanjing 211300, China)

Abstract: Gastrointestinal dysfunction refers to the abnormal movement, secretion and absorption functions of the gastrointestinal tract, resulting in symptoms such as indigestion, bloating, abdominal pain and diarrhea. Through dietary conditioning, it can help adjust gastrointestinal function, relieve symptoms, promote digestion and absorption, and improve intestinal health. Therefore, this article analyzes the importance of dietary conditioning to gastrointestinal dysfunction.

Keywords: dietary regulation; gastrointestinal dysfunction; rational diet

1 胃肠功能紊乱的概念和分类

胃肠功能紊乱是指消化系统中胃和肠的正常运作被打乱或出现异常症状的情况。它不是一种独立的疾病, 而是一组症状的综合表现, 包括胃部不适、消化不良、腹胀、腹痛、腹泻和便秘等。胃肠功能紊乱可以是暂时的, 也可以是长期的, 给患者的生活和工作带来了诸多困扰。根据症状的不同表现, 胃肠功能紊乱可以分为几种不同的类型。最常见的类型包括胃动力障碍、肠易激综合征、功能性胃肠病等^[1]。胃动力障碍是指胃的蠕动功能异常, 导致食物通过胃肠道的速度变慢, 常表现为胃胀、胃部不适和消化不良等症状。肠易激综合征是一种功能性肠道疾病, 其特点是腹痛、腹胀、腹泻或便秘等症状的反复发作。这种状况常会对患者的生活质量造成较大的影响。功能性胃肠病是指没有明显病因的胃肠道疾病, 常见的有功能性胃肠痛和非溃疡性消化不良等。这些疾病的发病机制尚不完全清楚, 但与神经-内分泌系统的功能紊乱有关^[2]。此外, 胃肠功能紊乱还可以因为不良生活习惯、饮食不当、精神压力过大等多种原因而引发。在现代社会中,

饮食习惯的改变、工作压力的增加等因素导致胃肠功能紊乱的发生率逐渐上升。

2 胃肠功能紊乱的常见原因

胃肠功能紊乱是指胃肠道在消化、吸收、排泄等方面出现异常的情况。其原因很多, 常见的包括饮食不规律、饮食过量或过少、饮食不当、吃辛辣食物过多、食物中毒、消化功能障碍、肠道感染、精神紧张、情绪波动以及药物不良反应等。这些原因会导致胃肠道的正常生理功能出现调节失衡, 进而引发胃肠功能紊乱。

3 饮食调理的基本原则

3.1 均衡营养的重要性

饮食调理是人们根据自身的胃肠功能紊乱情况, 合理搭配各种食物, 确保摄入的营养成分能够满足身体的需求。通过均衡摄入碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质, 可以保持肠道的正常功能, 并促进消化吸收的平衡^[3]。合理饮食还能够提供足够的能量, 维持身体的正常代谢, 增强

免疫力，预防胃肠道疾病的发生。此外，均衡营养还有助于维持肠道菌群的平衡，促进有益菌的生长，抑制有害菌的繁殖，保护胃肠道健康。因此，均衡营养是饮食调理的基本原则，对于胃肠功能紊乱的患者来说尤为重要。

3.2 合理膳食结构的构建

合理膳食结构的构建是饮食调理的基本原则之一。在饮食调理过程中，合理膳食结构的构建起着至关重要的作用。一个合理的膳食结构可以提供全面的营养，平衡身体的机能，有助于恢复胃肠功能的正常运作。①合理膳食结构应包含多种食物，包括谷类、蔬菜、水果、畜禽肉类、鱼类以及豆类等。这样可以保证摄入的各种营养素的平衡，避免偏食导致某些营养物质的缺乏。②膳食结构应注意合理搭配不同类型的食物。例如，谷类与豆类的搭配可以提供较为丰富的蛋白质，同时谷类中的碳水化合物也能提供能量，豆类中的纤维素能促进肠道蠕动，有益于胃肠功能的恢复。此外，合理膳食结构还应注意食物的烹饪方法。煮、蒸、炖等健康的烹饪方式能够保持食物中的营养物质，减少脂肪和盐的摄入，有助于胃肠功能的调理。饮食调理对胃肠功能紊乱的重要性在于通过合理膳食结构的构建来恢复胃肠的正常功能^[4]。因此，人们应该注重饮食调理中合理膳食结构的构建，以达到促进胃肠功能恢复的效果。

3.3 饮食宜忌的指导

3.3.1 饮食宜忌的原则

饮食宜忌的原则是根据胃肠功能紊乱的特点和调理需求来确定的。针对胃肠功能紊乱，饮食宜忌的指导需要遵循以下原则。①选择温和易消化的食物，如煮熟的蔬菜、瘦肉、鱼类等，减轻胃肠负担，提供充足的营养。②避免辛辣、油炸、酸甜等刺激性食物，如辣椒、咖啡、酒精等，以免引起胃肠道不适。③保持饮食均衡，摄入足够的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质，维持身体的正常功能。④避免过饱或过饥，适量摄入食物，保持饮食节制，以维持胃肠道的健康功能。

3.3.2 饮食宜忌指导

饮食宜忌指导应根据胃肠功能紊乱的具体情况来制定。根据不同的症状和严重程度，可以给出以下指导。①饮食宜忌指导。根据胃肠功能紊乱的具体症状，提供相应的饮食宜忌指导。例如，对于胃溃疡患者，宜选择软糊状的食物，忌食辛辣刺激性食物；对于腹泻患者，宜选择易消化的清淡食物，

忌食粗纤维和高脂肪食物。②餐次安排。合理安排餐次，控制进食量和次数。宜少食多餐，每餐食量适中，避免加重胃肠道负担。③饮食禁忌。根据胃肠功能紊乱的原因，给出相应的饮食禁忌。例如，对于胃酸过多的患者，应避免食用刺激性食物和含咖啡因的饮料；对于胃肠道感染的患者，应避免食用生冷食物和未经杀菌处理的食品。遵循饮食宜忌指导，可以调理胃肠功能紊乱，缓解症状，恢复胃肠道的正常功能。

4 饮食调理的具体方法

4.1 调整饮食习惯和节制饮水量

调整饮食习惯和节制饮水量对于胃肠功能紊乱的饮食调理具有关键作用。①调整饮食习惯可以指导人们养成良好的饮食习惯，包括规律饮食、慢咀嚼、定时进食等。良好的饮食习惯可以减少胃肠负担，避免过度消化和胃肠不适引起的功能紊乱^[5]。②节制饮水量意味着合理控制每餐的食物摄入量，避免暴饮暴食和过度饱胀。过度饮食会给胃肠道造成压力，导致消化不良和胃肠不适。因此，调整饮食习惯和节制饮水量是饮食调理胃肠功能紊乱的重要方法，可以改善胃肠道的健康状况，提高消化吸收功能，避免胃肠道不适症状的发生。

4.2 选择易消化食物

易消化食物是饮食调理中的重要方面之一。在胃肠功能紊乱的情况下，选择易消化食物可以减轻胃肠道的负担，有助于胃肠功能的恢复和改善。这些食物通常具有柔软的质地，易于咀嚼和吞咽，同时能够被胃肠道轻松吸收和消化。常见的易消化食物包括煮熟的蔬菜、米粥、面食、软煮的蛋类、瘦肉和酸奶等。这些食物不仅有助于减轻消化系统的负担，还能够提供身体所需的营养物质，促进胃肠功能的正常运作。此外，合理地食用易消化的食物还可以缓解胃肠不适症状，如腹胀、胃痛等，为胃肠健康的恢复创造良好的条件。因此，在饮食调理中，选择易消化食物是非常重要的一环，它有助于改善胃肠功能紊乱的症状，并促进身体的康复和健康^[6]。

4.3 增加膳食纤维摄入

增加膳食纤维摄入对于饮食调理以及胃肠功能的恢复和调整具有重要意义。膳食纤维是指植物性食物中不被消化吸收的部分，它主要存在于粗粮、蔬菜、水果等食物中。增加膳食纤维的摄入可以促进胃肠蠕动，增加排便次数，改善便秘症状^[7]。此

外,膳食纤维还可以吸附胆固醇、脂肪和有害物质,帮助排出体内的废物和毒素,维护胃肠健康。同时,膳食纤维具有增加饱腹感的作用,可以减少对高热量食物的摄入,控制体重。因此,通过增加膳食纤维的摄入,可以调理胃肠功能紊乱,改善消化问题,促进身体健康。增加膳食纤维摄入的方法包括多食用粗粮、蔬菜和水果,选择全谷类食物、坚果和豆类等富含膳食纤维的食物。此外,可以适当增加蔬菜和水果的摄入量,荤素搭配,合理搭配膳食,保证在摄入全面营养的同时,增加膳食纤维的摄入量。

4.4 饮食与生活方式的结合

饮食与生活方式的结合主要包括以下内容。①合理膳食搭配。通过合理搭配食物,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等的摄入,能够提供身体所需的各种营养素,同时减少对胃肠功能的负担。②善用荤素搭配。合理选择荤素搭配,减少肉类和脂肪的摄入,增加蔬菜、水果和全谷类食物的比例,能增加纤维素的摄入,有利于促进胃肠蠕动,帮助消化和排便。③控制饮食物量和次数。适量控制饮食物量和次数,不暴饮暴食,避免一次性摄入过多食物,有助于保持胃肠蠕动的正常节奏,减轻胃肠负担。④食物的嚼碎与细嚼慢咽。充分嚼碎食物,细嚼慢咽,有助于增加唾液分泌,促进食物的消化和吸收,减少胃肠对食物的消化负担。⑤温和的饮食方式。尽量避免食用过烫或过冷的食物和饮料,以免刺激胃肠黏膜,引起胃肠不适。同时,应避免辛辣、油腻、刺激性食物摄入,以减轻胃肠的刺激和负担。⑥定时定量进食。养成定时定量进食的习惯,避免过度饥饿或过饱,有利于胃肠的正常功能运作,维持胃肠蠕动的稳定性。⑦饮食与生活的平衡。合理安排饮食与生活的时间和节奏,注意休息和运动的结合,有助于提高胃肠的代谢和运动功能,促进胃肠蠕动的正常进行。正确的生活方式习惯也能减少压力和焦虑,对胃肠功能的恢复和调理有积极的作用。

5 饮食调理的潜在风险和注意事项

5.1 食物过敏和不耐受的问题

在处理胃肠功能紊乱时,人们需要特别关注食物过敏和不耐受的潜在风险和注意事项^[8]。食物过敏是指人体免疫系统对特定食物中的蛋白质产生反应,导致身体出现不良反应或过敏症状^[9]。常见的食物过敏包括牛奶、鸡蛋、花生、坚果和海鲜等。对于胃肠功能紊乱的患者,食物过敏可能会加重症状,造

成更多的不适。因此,在饮食调理中,患者应避免摄入对其产生过敏反应的食物,这需要在饮食规划中格外注意。除了食物过敏外,食物不耐受也是需要注意的问题。食物不耐受是指人体对某些食物中的特定成分无法消化或吸收,引起胃肠道不适或其他症状。常见的食物不耐受包括乳糖不耐症和麸质不耐症等^[10]。对于胃肠功能紊乱的患者,食物不耐受可能会导致腹胀、腹泻等症状加重。因此,在饮食调理中,人们需要明确患者是否存在食物不耐受,避免摄入对其产生不适的食物。

5.2 饮食调理的可能副作用

饮食调理是对胃肠功能紊乱的重要治疗方法之一。然而,在进行饮食调理时,也需要注意其中存在的潜在风险和需要注意的事项。饮食调理可能会引发一些副作用,需要人们在实施过程中留意并采取相应的措施。①饮食调理可能会导致营养不均衡。当人们采取特定的饮食调理方法时,有可能会限制某些食物的摄入,从而导致身体无法获取足够的营养素。例如,一些人可能会选择完全排除某些食物,如谷物或蔬菜,以达到治疗效果。然而,这种过度限制的饮食可能会导致缺乏必要的维生素、矿物质和纤维素,从而引发其他健康问题。②饮食调理可能会对心理健康产生影响。研究发现^[11],饮食中的营养物质,尤其是Omega-3脂肪酸、维生素B和叶酸等与抑郁、焦虑和情绪波动等心理状态有关,缺乏上述营养物质,极易产生负面情绪。因此,均衡和营养丰富的饮食有助于维持良好的情绪和心情。③饮食调理也可能引发身体上的不适,尤其是过敏体质的人群。例如,乳糖不耐受的人可能会在摄入乳制品后出现腹胀、腹泻和胃部不适。而某些特殊饮食方法,如高蛋白或高脂肪饮食,也可能导致消化问题或高胆固醇等健康风险^[12]。因此,在进行饮食调理时,人们需要认识到其中的潜在风险和需要注意的事项。一旦出现不适应,应该及时调整饮食方案或咨询医生的建议。只有在科学、合理且安全的情况下,饮食调理才能真正发挥其对胃肠功能紊乱的重要性。

6 结语

饮食调理对胃肠功能紊乱具有重要的作用。合理的饮食可以帮助维持肠道菌群的平衡,促进消化吸收,提高肠道健康。通过增加膳食纤维和益生菌的摄入,可以维持肠道菌群平衡,促进消化功能的正常运作。合理的饮食还可以改善消化系统的机械性

刺激，预防便秘，并减轻胃肠道的负担。此外，避免刺激性食物的摄入，可以减轻胃肠道的炎症反应，缓解不适症状。因此，饮食调理对于调整胃肠功能、缓解症状和提高胃肠道健康至关重要。

参考文献

[1] 李琴琴,刘秋霞,杨丽.超前饮食干预联合多维度强化护理对 TRREC 患者康复效果的影响[J]. 菏泽医学专科学校学报,2023,35(4):55-58.

[2] 徐雅灵,费卫珠,童莉莉.饮食管理联合心理指导对直肠癌术后患者胃肠、免疫功能、心理健康及营养状况的影响[J]. 名医,2023(16):189-191.

[3] 衡静,常瑞,张楠,等.中医护理策略结合饮食干预在胃肠道肿瘤化疗中的应用价值[J]. 中西医结合护理(中英文),2023,9(7):45-50.

[4] 钟小惠.基于赋能理论的饮食护理干预在改善功能性便秘患者健康饮食行为中的应用研究[D]. 无锡:江南大学,2022.

[5] 刘白灵.低 FODMAP 饮食对 IBS 患者胃肠道症状的影响[J]. 航空航天医学杂志,2023,34(3):382-384.

[6] 沙粒.胃肠道术后的饮食注意事项[J]. 家庭医药.快乐养生,2023(2):30-31.

[7] 周康娟.饮食结合心理护理改善胃肠道肿瘤患者化疗后营养状况的临床效果[J]. 中国食品工业,2023(2):120-122.

[8] 付于.胃肠功能紊乱的调护[J]. 开卷有益-求医问药,2021(9):45.

[9] 章菲菲,王子扬.急性胃肠道感染后不宜高蛋白饮食[J]. 家庭医药.就医选药,2021(9):26.

[10] 阮天音,何富乐.保护胃肠功能从现在做起[J]. 健康博览,2021(9):60.

[11] 钟燕文,严彩玲.饮食护理对剖宫产术后产妇泌乳和胃肠功能的影响[J]. 中国当代医药,2020,27(16):218-220.

[12] 白银霞,孙宏.饮食护理对胃癌根治术后患者胃肠道功能恢复及并发症的影响[J]. 中国肿瘤临床与康复,2020,27(5):611-614.

(上接第 111 页)

表 4 畜产品中五氯酚的添加回收率、批内和批间精密度

添加浓度/($\mu\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$)	基质	回收率/%						平均回收率/%	批内 RSD/%	批间 RSD/%
		1	2	3	4	5	6			
1.0	鸡肉	92.5	93.3	94.6	97.7	91.7	93.6	93.9	2.24	5.69
	猪肉	90.7	87.9	89.6	93.1	88.7	82.1	88.7	4.17	
	牛肉	97.8	101.4	100.7	91.9	103.9	100.4	99.4	4.17	
2.0	鸡肉	94.1	81.3	89.3	93.4	93.6	83.6	89.2	6.24	3.95
	猪肉	90.7	81.6	85.3	90.3	81.1	90.9	86.7	5.31	
	牛肉	94.3	97.7	98.1	95.9	89.9	86.3	93.7	5.00	
5.0	鸡肉	91.7	94.3	89.4	96.7	94.9	80.4	91.2	6.46	1.95
	猪肉	85.6	88.8	87.4	90.9	91.6	84.9	88.2	3.11	
	牛肉	91.3	89.7	88.1	90.3	94.1	94.3	91.3	2.71	

操作条件进行比较和优化，以期为畜产品中五氯酚残留监测和风险评估提供有效的技术手段。

参考文献

[1] 秦丽波,牛蓉,张梦丽,等.超高效液相色谱-串联质谱法测定饲料中五氯酚的含量[J]. 饲料研究,2023(22):127-131.

[2] 李志梅,胡建刚,赵超群,等.通过型固相萃取-液相色谱-串联质谱法快速测定鸡蛋中五氯酚、氟虫腈及 7 种雌激素[J]. 中国卫生检验杂志,2023,33(20):2437-2442.

[3] 何平,郑铖,张友萍.全自动样品制备系统-超高效液相色谱-串联质谱法测定动物源食品中五氯酚钠[J]. 农产品质量与安全,2023(2):69-73.

[4] 余明霞,曹秀,冯慧慧,等.液液萃取-QuEChERS 净化-高效液相色谱-串联质谱法测定恩诺沙星可溶性粉中五氯酚酸钠含量[J]. 现代农业科技,2022(24):156-159.

[5] 穆应花,邢家溧,沈坚,等.QuEChERS-气相色谱-质谱法检测鱼肉中 19 种氯酚类化合物[J]. 色谱,2022,40(5):477-487.