

## 高血压症状及其危险因素有哪些

惠南高新科技产业园管委会(办事处)社区卫生服务中心 李贵良

引发高血压的原因多种多样，主要是因为遗传因素或者是患上某种疾病所致，严重者还会出现心血管或肾脏疾病等并发症。同时，高血压还存在相应的危险因素，一旦出现即可加重其病情，导致血压快速升高从而引发严重症状。那么，高血压的症状和危险因素都有哪些？

### 高血压的常见症状

**头晕** 头晕是高血压患者中较为常见的症状，主要表现为在突然下蹲或站立时，患者会感到一阵阵的头晕，甚至在某些情况下，这种头晕是持续性的。患者描述的头晕感通常伴随着头部的沉闷不适，严重时会影响到思考能力与日常工作，可能导致对周围事物失去兴趣。尤其在高血压危象或椎—基底动脉供血不足时，患者可能会体验到类似于内耳眩晕症的症状。这种情况下，及时就医进行评估，排除其他潜在病因显得尤为重要。

**头痛** 除了头晕，头痛也是高血压患者常见的症状之一。患者常感到头部的持续性钝痛或搏动性胀痛，有些人甚至感觉到像炸裂般的剧痛。头痛通常在清晨醒来时最为明显，而随着起床活动和用餐，疼痛感可能会逐渐减轻。头痛的部位多集中在额部两侧的太阳穴及后脑勺，其原因可能与血管压力增加造成的头部血流动力学改变有关。为了缓解症状，患者可尝试休息，保持良好的生活作息，必要时可寻求医生的帮助。

**烦躁、心悸与失眠** 高血压患者常表现出额外的情绪波动，性情较为急躁，遇事敏感且易激动。烦躁不安不仅影响情绪，也可能助长血压的进一步升高。同时，心悸（即心跳加速或心脏跳动不规则）和失眠也是高血压患者的常见症状。关于失眠，患者通常入睡困难，早醒或睡眠不实，频繁做噩梦或易惊醒，这些问题可能源于大脑皮层功能的紊乱以及自主神经功能的失调。应对此类问题，采用放松技巧（如深呼吸、冥想）及良好的睡眠习惯都是较为有效的方法。

### 高血压的危险因素

**不健康的饮食** 不健康的饮食习惯是导致高血压的主要原因之一。现实生活中存在不少暴饮暴食或频繁节食的现象，这不仅使身体无法得到充足的营养，还导致体内营养失衡。尤其是在现代社会中，快餐和零食的普及，使得高糖、高脂肪的食物如蛋糕、糖果和油炸类食品越来越容易获得。

**不规律的作息** 现代社会的快节奏使很多人不得不熬夜工作或学习。长期的熬夜和缺乏规律的作息会导致内分泌失调，影响身体的正常代谢，加重高血压的症状。缺乏充足的睡眠还会引发头痛、乏力等不适，从而影响患者的日常生活。

**较大的情绪波动** 情绪波动是影响高血压的重要因素之一。情绪的剧烈波动，如焦虑、愤怒和紧张，会导致体内肾上腺素等应激激素水平升高，进而引发血压上升。在某些情况下，情绪的波动甚至可能导致昏迷或休克。

### 高血压的日常预防措施

**饮食调整** 钠盐是导致高血压的主要因素，过量的钠摄入会导致体内水分滞留，增加血容量，从而导致高血压。建议每日的钠摄入量应在 2300 毫克以下，理想情况下应低于 1500 毫克。可以通过减少加工食品的摄入，选择低盐或无盐的替代品来有效降低钠盐的摄入。饱和脂肪和反式脂肪的摄入与高血压和心脏病风险的增加密切相关。尽量选择健康的脂肪来源，如橄榄油、鱼类和坚果，同时避免油炸食物和高脂肪的零食。新鲜的水果和蔬菜富含钾、镁和膳食纤维，可以帮助降低血压。多样化饮食，增加蔬菜和水果的摄入，不仅可以保证营养均衡，还能控制体重。富含

纤维的食物，如全谷类、豆类和水果，能够增强消化功能，帮助控制血糖和血压，将这些食物纳入每日饮食中。

**控制体重** 超重和肥胖是高血压的重要风险因素，因此控制体重是预防高血压的关键措施之一。通过控制饮食中的总热量摄入，合理选择低热量、高纤维的食物，可以帮助人们逐渐减轻体重。合理的饮食计划应包括足够的蛋白质、健康脂肪以及丰富的水果和蔬菜。运动是控制体重的重要手段，建议每周至少进行 150 分钟的中等强度有氧运动，如快走、骑自行车或游泳等。这不仅能够帮助消耗多余的热量，还能增强心血管功能，进而降低血压。

**规律运动** 适当的运动不仅有助于控制体重，而且能够直接降低血压，增强心血管健康。快走、游泳、骑自行车及瑜伽等都是对心脏和血管有益的运动方式。选择自己喜欢的运动，可以提高运动的持续性和乐趣。将运动融入日常生活中，例如选择步行或骑自行车代替开车。在运动之前，特别是有高血压病史的患者，应咨询专业医生，确保运动方案的安全性，并避免剧烈运动引起的血压波动。

**戒烟限酒** 吸烟和过量饮酒是高血压的重要风险因素，因此戒烟限酒是非常必要的。吸烟不仅会直接导致血压升高，还会损害血管健康，增加心血管疾病的风险。因此，戒烟应成为每个人的健康目标。通过寻求专业帮助、参加戒烟课程或使用戒烟辅助工具，可以提高戒烟的成功率。过量饮酒会导致体重增加并直接影响血压。建议男性每日饮酒不超过两杯，女性不超过一杯。选择低度酒精饮品，如啤酒或葡萄酒，并控制饮用频率是降低酒精摄入的一种有效方式。

**心理调节** 心理健康同样对血压控制至关重要，良好的心理状态可以帮助缓解压力，预防高血压的发生。应尽量避免让自己陷入过大的压力和情绪波动中，保持内心的平静。可以通过冥想、瑜伽或深呼吸等方式来调节心情。保持积极乐观的生活态度，有助于增强心理抗压能力，降低高血压的发生率。参加心理疏导小组或与亲友交流也能起到很好的心理疏导效果。

**规律生活** 每天尽量在同一时间入睡和起床，培养生物钟的稳定性。即使周末也应避免过度睡懒觉，以保持生物钟的规律。保持卧室的安静、黑暗和适宜的温度。可以考虑使用遮光窗帘和耳塞，减少外界的干扰。咖啡因和酒精会降低睡眠质量和血压水平，因此在睡前应尽量减少这些物质的摄入。适当的午休可以提高下午的工作效率，帮助身体恢复精力。但午休时间不宜过长，建议控制在 20~30 分钟。

上面为大家介绍了高血压的症状表现和危险因素，相信大家已经有所了解。为了有效治疗疾病，请选择正规医院进行疾病的治疗。