

生态保护动态速览_2026-05-08

报告日期：2026-05-08

本期为历史周报补跑，严格以 2026-05-08 为报告截止日，覆盖该日期所在自然周及此前 1-2 周已经发布的信息；凡来源页显示发布日期晚于 2026-05-08 的新闻、政策或论文均未纳入。内容包括国内部委级官方动态、UNEP/FAO/SER/IUCN/UN Decade 等国际权威来源、近 1-2 周新发表论文以及经典高被引论文。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 第三轮第六批中央生态环境保护督察全面启动

时间：2026-05-07

来源：生态环境部

核心内容：经党中央、国务院批准，第三轮第六批中央生态环境保护督察全面启动，7 个中央生态环境保护督察组分别对辽宁、吉林、黑龙江、广东、广西、西藏、新疆 7 省区和新疆生产建设兵团开展督察，进驻时间约 1 个月。督察强调坚持系统观念、问题导向和精准科学依法，进驻期间受理生态环境保护方面来信来电举报。

专业解读：这是本期国内最重要的监管信号。涉及自然保护地、海洋生态、湿地、草原、矿山修复、黑土地和流域水生态的问题，很可能在后续典型案例和整改清单中集中呈现。项目单位应提前核查生态保护红线、自然保护地边界、岸线/草原/湿地占用、历史遗留矿山修复成效和公众投诉证据链。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcji/202605/t20260507_1150910.shtml

2. 中央生态环境保护督察办要求精准科学依法推进边督边改

时间：2026-05-07

来源：生态环境部 / 中央生态环境保护督察栏目

核心内容：中央生态环境保护督察工作领导小组办公室就第三轮第六批督察致函被督察对象，要求精准科学依法推进边督边改，严禁“一刀切”，并切实减轻基层负担。要求整改群众反映突出的生态环境问题，同时坚持依法依规、分类施策、实事求是。

专业解读：生态保护整改不能以简单停产、停工或突击工程替代长期治理。对自然保护地违规开发、海岸带利用、采矿扰动、林草湿地破坏等问题，应建立问题来源、现场核查、生态影响评估、修复方案、公众反馈和长期监测的闭环，防止“运动式整改”和“纸面销号”。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcji/202605/t20260507_1150940.shtml

3. 生态环境部发布《海洋生物水质基准-镉》（2026 年版）及技术报告

时间：2026-04-21

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部发布国家生态环境基准《海洋生物水质基准-镉》（2026 年版）及技术报告。该基准用于保护海洋生态系统安全，为海洋生态环境管理、水质目标制定和重金属生态风险评估提供科学依据。

专业解读：海洋生态保护正在从常规浓度达标走向生物效应保护。近岸湿地、河口、海湾、海洋牧场和海洋保护地监管，应同时关注水体、沉积物、生物累积、食物网传递和敏感物种阈值，避免只依据单一断面水质数据判断生态风险。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/202604/t20260430_1150654.html

4. 国家林草局编印《特色生态旅游地典型案例（第一批）》

时间：2026-05-06（通知落款：2026-04-29）

来源：国家林业和草原局办公室

核心内容：国家林草局办公室编印《特色生态旅游地典型案例（第一批）》，要求各地在保护优先前提下因地制宜推动生态旅游高质量发展。案例覆盖湿地珍禽保护、自然教育、国有林场转型、国家植物园和山地森林等多类林草生态旅游场景。

专业解读：生态旅游应服从自然生态系统保护目标，而不是把保护地变成普通景区开发。专业上需把容量控制、功能分区、栖息地扰动、游客行为管理、自然教育收益、社区参与和长期生态监测一并纳入，特别是湿地、鸟类繁殖地、珍稀植物栖息地和高敏感山地景观。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/gsgg/20260506/669741.html>

5. 国家林草局发布荒漠化防治技术与实践国际研修班信息

时间：2026-04-27

来源：国家林业和草原局 / 中国绿色时报

核心内容：荒漠化防治技术与实践国际研修班在宁夏举办，围绕防沙治沙、退化土地治理、草原保护修复、干旱区可持续经营和国际合作交流开展培训，服务荒漠化防治技术传播和“一带一路”生态治理合作。

专业解读：荒漠化防治应从单项固沙工程转向水资源承载力约束下的综合治理。干旱半干旱区项目需区分风蚀、水蚀、盐渍化、过牧和工程扰动等退化驱动，采用封育、乡土灌草恢复、草畜平衡、沙源阻断、土壤改良和社区共管组合措施。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/c/lypx/hypx/669150.jhtml>

6. 广西开展草原返青专项监测，推进空天地一体化草原管理

时间：2026-04-23

来源：国家林业和草原局 / 广西壮族自治区林业局

核心内容：广西采用“空天地一体化”模式开展草原物候期返青专项监测，在 9 个重点草原县区布设固定样地和样方，采集景观、样方和返青植物照片。初步结果显示，截至 4 月上旬，全区 85% 以上草原监测样地已返青，整体进度优于上年同期。

专业解读：该案例显示草原管理正从经验巡查转向跨年度可比监测。南方草地在石漠化治理、放牧管理、火险评估和生物多样性维护中具有重要作用，应将物候、群落组成、乡土种比例、土壤水分和人为扰动纳入统一数据库。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/cybhd/20260423/668465.html>

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / IUCN / UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：2026 年联合国生物多样性大会注册开放

时间：2026-05-04

来源：UNEP / CBD

核心内容：UNEP 自然与生物多样性更新页面列出“Registration for UN Biodiversity Conference 2026 opens”。会议将围绕昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架后续实施、国家生物多样性战略与行动计划、资金机制、监测报告和 COP17 前行动进展展开。

专业解读：这说明 2026 年国际生物多样性议程已进入履约和报告准备阶段。生态保护项目应提前把保护地有效管理、生态修复目标、物种和栖息地指标、资金投入和社会参与转化为可报告证据，而非只保留项目立项和工程量材料。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity?page=1>

2. IUCN 在波恩召集环境组织，为 2026 年“三大公约年”协调行动

时间：2026-05-04

来源：IUCN

核心内容：IUCN 欧洲区域办公室、Global Landscape Forum 和 CIFOR-ICRAF 欧洲办公室在波恩召集 30 多个气候、生物多样性和土地退化领域组织，讨论 2025 年世界自然保护大会和全球景观论坛释放的政策信号，并面向 2026 年关键国际进程加强协同。

专业解读：该动态反映气候、生物多样性和土地退化治理正在加速整合。自然基解决方案、生态修复和保护地网络建设应避免单目标化，项目设计需同时说明减缓/适应、生物多样性净收益、土地退化防治、社区收益和资金可持续性。

原文链接：<https://iucn.org/news/202604/global-dialogue-2026-action-iucn-convenes-environmental-organisations-bonn-prepa>

3. FAO：UN Biodiversity COP17 前，农食系统成为加速生物多样性行动重点

时间：2026-05-06

来源：FAO

核心内容：FAO 参加第三届 Yerevan Dialogue，在绿色转型主题下强调农食系统在保护和可持续利用生物多样性、加强气候适应与减缓、协调生态完整性和经济发展中的关键作用。FAO 指出，COP17 前需要把农食系统纳入生物多样性行动主线。

专业解读：该方向对农业景观、渔业、水产养殖、林业和土壤管理非常关键。生态保护不能只发生在保护地内部，农田边界、生境斑块、传粉者、土壤生物、遗传资源、渔业栖息地和供应链激励都应成为生物多样性主流化指标。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/fao-at-the-yerevan-dialogue/en>

4. FAO：马达加斯加农食系统生物多样性主流化项目形成可复制经验

时间：2026-04-24

来源：FAO

核心内容：FAO 和马达加斯加总结为期两年的农食系统生物多样性主流化项目成果，参与方包括农业、环境、渔业与蓝色经济主管部门、生产者组织、地方机构、研究组织和项目受益者。项目结束后，昆明生物多样性基金支持的新项目将继续推动相关经验扩展。

专业解读：该案例显示生物多样性主流化需要跨部门、生产者和地方社区共同参与。对国内农业生态修复、红树林/湿地周边社区、渔业社区和森林经营而言，应把生计改善、资源利用规则、监测数据和 NBSAP 目标放在同一治理框架下。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/fao-and-madagascar-present-concrete-results-from-integrating-biodive>

5. FAO 生物多样性知识中心 4 月更新：566 项资源支持 GBF 落地

时间：2026-04-10

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：FAO 生物多样性知识中心 4 月更新显示，平台已提供 566 项资源，支持各国在农食系统中落实昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架。本月新增土地权属与治理、森林转型、可持续水产养殖指南传播工具、植物遗传资源和农林复合经营课程等内容。

专业解读：FAO 将生物多样性保护嵌入土地权属、森林治理、水产养殖、遗传资源和农林复合经营。生态保护项目在生产景观中落地时，应重点解决土地权属、社区权益、遗传资源保护、可持续生产技术和 GBF 指标对接问题。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/new-in-the-fao-biodiversity-knowledge-hub--april-update/en>

6. UNEP：生态系统恢复可帮助濒危物种脱离灭绝边缘

时间：2026-03-02

来源：UNEP / UN Decade on Ecosystem Restoration

核心内容：UNEP 在联合国生态系统恢复十年框架下介绍 6 个通过生态系统恢复帮助濒危物种恢复的案例，强调陆地和海洋栖息地恢复不仅提供人类福祉，也为受威胁哺乳动物、爬行动物和鸟类提供关键避难所。

专业解读：该专题可作为修复项目从工程语言转向物种和栖息地结果表达的参考。恢复成效不应只报告面积、植被覆盖或种植数量，还应跟踪旗舰/指示物种、繁殖成功、栖息地连通性、压力源下降和社区参与。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/back-brink-six-species-saved-ecosystem-restoration>

三、近期新发表论文（近 1-2 周）

1. Landscape Connectivity and Wildlife Access to Water Across an International Border: Barriers and Opportunities for Facilitating Transboundary Movement

（跨国边界景观连通性与野生动物取水：阻隔与跨境迁移机会）

期刊与日期：Global Change Biology | 2026-05-08

作者：Chivoiu, B., Koen, E. L., Osland, M. J., Gabler, C. A., Garrett, J. T., Reyes, E., et al.

摘要概括：研究以美国-墨西哥边界下里奥格兰德河谷为例，利用景观连通性模型比较无边界障碍、现有障碍和潜在连续障碍三种情景，评估大型陆生哺乳动物通往河流和水源的能力。结果显示现有障碍已在部分区域削弱取水连通性，而障碍间隙仍可作为重要迁移廊道；连续障碍情景将进一步限制野生动物接近河流。

专业解读：该研究对干旱区保护地、线性基础设施和生态廊道设计具有直接启发。道路、围栏、堤防、边境设施和水利工程都可能在干旱区放大栖息地破碎化风险，规划中应保留取水通道、恢复河岸栖息地并评估跨界连通性。

DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70888>

原文链接：<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70888>

2. High risk of extinction across the flowering plant tree of life

(开花植物生命之树面临高灭绝风险)

期刊与日期: Science | 2026-05-07

作者: Forest, F., Brown, R., Buerki, S., Colville, J. F., Moat, J., Lughadha, E. N., et al.

摘要概括: 研究构建被子植物生命之树并估计全部开花植物灭绝风险, 发现约 21.2% 的被子植物进化历史处于灭绝风险中, 并识别出 9945 个对受威胁进化历史贡献不成比例的优先物种。

专业解读: 该文把植物保护从物种数推进到系统发育独特性和演化历史保存。自然保护区优化、植物园迁地保育、种质资源库和红色名录优先级排序, 应把 EDGE 类指标与现实威胁、栖息地保护和可操作保育手段结合。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adz0773>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz0773>

3. Climate-induced range shifts support local plant diversity but don't reduce extinction risk

(气候驱动分布迁移可支撑局地植物多样性但不能降低灭绝风险)

期刊与日期: Science | 2026-05-07

作者: Wang, J., Oliveira, B. F., Moore, F. C., Kozar, D. J., Fu, Y., & Dong, X.

摘要概括: 研究利用全球植物分布移动记录、植物发生数据和气候情景, 预测物种特异性迁移速度和未来适生地可达性。结果显示, 气候驱动的分布迁移可能在许多地区维持或增加局地丰富度, 但 7%-16% 的建模植物仍可能损失超过 90% 分布区, 全球灭绝风险难以靠自然迁移抵消。

专业解读: 该研究提醒保护规划不能把物种迁移当作自动适应机制。需要识别气候避难所、迁移廊道、扩散障碍和不可达适生地, 并将迁地保护、辅助迁移、种质保存和保护地网络动态调整纳入气候适应策略。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aea1676>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aea1676>

4. Growing nickel supply from the tropics threatens priority conservation areas

(热带镍供应增长威胁保护优先区)

期刊与日期: Nature Ecology & Evolution | 2026-05-06

作者: Hyman, J., Sonter, L. J., McDonald-Madden, E., Watson, J. E. M., Mervine, E. M., Bull, J. W., et al.

摘要概括: 研究以矿山为单元模拟 2025-2050 年全球镍供应, 评估低碳技术需求、热带采矿扩张与陆地/海洋保护优先区之间的权衡。结果显示未来镍供应高度依赖热带镍红土矿, 部分供应将威胁高生物多样性和高碳储存优先区。

专业解读: 能源转型本身也会产生生物多样性风险。关键矿产供应链需要把保护优先区、海岸生态系统、尾矿和污染风险、原住民与社区权利、替代资源和循环利用纳入决策, 避免以减碳名义转移生态损失。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03068-4>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03068-4>

5. Breakdown of microbial networks links nutrient stress and reef coral disease

(微生物网络破裂连接营养胁迫与珊瑚礁疾病)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-05-05

作者: Gracie, R., Wiedenmann, J., Lam, P., Sweet, M., & D'Angelo, C.

摘要概括: 研究结合受控实验和全球黑带病暴发数据, 显示偏离正常氮磷比的营养胁迫会破坏珊瑚相关微生物网络, 促进机会性微生物和黑带病发展。全球分析显示, 多数黑带病暴发区域与异常氮磷比相关, 而热胁迫并非唯一解释。

专业解读: 珊瑚礁保护不能只关注海温和白化, 近岸营养盐输入、污水处理、农业径流和氮磷比例同样是疾病风险管理核心。珊瑚礁修复项目应把水质源头减排、营养盐化学计量、微生物健康和恢复成活率联系起来。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72175-4>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-72175-4>

6. Integrating technical and scientific approaches to restore rupicolous plants threatened by climbing activities

(整合技术与科学方法恢复受攀岩活动威胁的岩生植物)

期刊与日期: Restoration Ecology | 2026-05-07

作者: Saiz, L., Nunez, R., Hermosilla, B., Artime, I., Diez, I., Cruz, J., Acevedo, M. A., Agut, A., & Tejero, P.

摘要概括: 研究针对西班牙 El Bierzo 地区受攀岩活动影响的两种特有岩生植物, 比较直接播种、棉球包埋种子和实验室育苗移栽等种群增强方法。结果显示直接播种对两物种均具较好发芽表现, 移栽可在种质稀缺时提供补充路径。

专业解读: 该文把户外游憩压力、微生境修复、种群增强和利益相关方协作连接起来。自然保护地中的攀岩、徒步和地质景观游憩活动, 需要把珍稀岩生植物、巢址、踩踏扰动、路线管控和恢复试验纳入精细管理。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.70418>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rec.70418>

7. Global blue carbon losses from salt marshes exceed restoration gains

(全球盐沼蓝碳损失超过修复收益)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-04-24

作者: Zheng, Y., Jiang, Q., He, Q., Xiao, X., Macreadie, P. I., Xu, X., Nie, M., Wu, J., Ye, G., et al.

摘要概括: 研究整合多源遥感和野外观测, 评估 2002-2019 年全球盐沼表层土壤有机碳变化。结果显示全球净损失约 52 万吨表层土壤有机碳, 北美和大洋洲损失显著, 亚洲和南美增长不足以抵消成熟高碳盐沼退化造成的损失。

专业解读: 蓝碳治理应优先保护成熟、高碳密度盐沼, 而不是只依赖事后补偿式修复。滨海湿地项目需同时核算面积、碳密度、植被年龄结构、潮沟连通性、岸线扰动和退化风险。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-70158-z>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-70158-z>

8. Predators Can Reverse the Effects of Warming on a Marine Ecosystem Engineer

(捕食者可逆转升温对海洋生态系统工程师的影响)

期刊与日期: Global Change Biology | 2026-04-24

作者: Malakooti, N. J. V., Kushner, D. J., Kroeker, K. J., & Kilpatrick, A. M.

摘要概括: 研究利用加州海带林长期数据, 分析向日葵海星、紫海胆和温度之间的相互作用。结果表明, 在缺少捕食者时升温促进海胆增长; 当关键捕食者密度达到阈值时, 其捕食作用可抵消升温对海胆的促进, 从而增强海带林韧性。

专业解读: 气候适应型海洋修复需要恢复食物网功能。海带林、珊瑚礁、海草床和贝礁项目不能只关注基础生境或工程物种, 还要把关键捕食者、植食者和营养级互作纳入恢复目标。

DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.70846>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70846>

四、经典高被引论文 (专业参考)

1. Biodiversity hotspots for conservation priorities

(用于保护优先排序的生物多样性热点)

期刊与日期: Nature | 2000

作者: Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., da Fonseca, G. A. B., & Kent, J.

摘要概括: 提出以高特有性和高威胁程度识别全球生物多样性热点, 是全球保护资源配置和优先区讨论的基础文献。尽管后续方法不断扩展, 该框架仍是保护地规划、国际资助和保护传播中的核心参照。

DOI: <https://doi.org/10.1038/35002501>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/35002501>

2. Global biodiversity scenarios for the year 2100

(2100 年全球生物多样性情景)

期刊与日期: Science | 2000

作者: Sala, O. E., Chapin, F. S. III, Armesto, J. J., et al.

摘要概括: 经典情景研究, 系统比较土地利用、气候、氮沉降、生物入侵和二氧化碳变化对不同生态系统生物多样性的潜在影响, 为多压力源保护框架奠定基础。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.287.5459.1770>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.287.5459.1770>

3. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis

(生态修复提升生物多样性与生态系统服务: 元分析)

期刊与日期: Science | 2009

作者: Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括：经典全球元分析，证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务，但恢复后往往仍低于未受损参照系统，是讨论修复收益、恢复差距和参照系统必要性的基础文献。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

4. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., Aronson, J., Nelson, C. R., Jonson, J., et al.

摘要概括：长期作为全球生态修复实践标准的核心文献，提出参照生态系统、修复轨迹、五星评估系统和修复活动连续体，对项目设计、监管和验收仍具直接参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13035>

5. Ecological restoration success is higher for natural regeneration than for active restoration in tropical forests

(热带森林自然恢复的生态修复成功率高于主动修复)

期刊与日期: Science Advances | 2017

作者: Crouzeilles, R., Ferreira, M. S., Chazdon, R. L., Lindenmayer, D. B., Sansevero, J. B. B., et al.

摘要概括：高被引综合研究，显示在许多热带森林情境中，自然恢复可取得高于主动栽植的生物多样性和植被结构恢复效果，强调识别恢复障碍和保护再生潜力的重要性。

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1701345>

6. A global map of human impact on marine ecosystems

(全球海洋生态系统人类影响图)

期刊与日期: Science | 2008

作者: Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'Agrosa, C., et al.

摘要概括：整合多类人类压力绘制全球海洋累积影响，是海洋空间规划、保护优先区识别和累积影响评估的经典文献。对当前海洋保护区有效管理和蓝色经济风险评估仍有参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1149345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1149345>