

生态保护动态速览_2026-06-19

报告日期：2026-06-19

本期为历史周报补跑，严格以 2026-06-19 为报告截止日，覆盖该日期所在自然周及此前 1-2 周已经发布的信息；凡来源页显示发布日期晚于 2026-06-19 的新闻、政策或论文均未纳入。内容包括国内部委级官方动态、UNEP/FAO/IUCN/UN Decade 等国际权威来源、近 1-2 周新发表论文以及经典高被引论文。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部审议《生态保护“十五五”规划》和《生态质量评价标准（试行）》

时间：2026-06-18

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部 6 月 18 日召开部常务会议，审议并原则通过《生态保护“十五五”规划》和《生态质量评价标准（试行）》。会议强调坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续完善生态空间格局，统筹推进生态系统保护与修复，全面加强生物多样性保护，健全生态保护保障体系，并以生态质量评价为抓手评估保护修复成效。

专业解读：这是本期国内最重要的生态保护制度信号。生态保护“十五五”规划和生态质量评价标准将把保护修复从工程量管理推向质量、功能、格局和监管闭环管理。地方项目应提前建立生态质量基线、遥感与地面样方复核、物种和栖息地指标、负面影响排查及整改追踪机制。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202606/t20260618_1159712.shtml

2. 生态环境部审议气候、土壤地下水、生态环境监测等“十五五”规划

时间：2026-06-12

来源：生态环境部

核心内容：生态环境部 6 月 12 日部常务会议审议并原则通过《国家应对气候变化“十五五”规划》《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》《生态环境监测“十五五”规划》《优化调整低效无效农村生活污水处理设施工作方案》。会议强调推进生态环境监测网络一体化和数智化转型，强化农业面源污染、农村小微水体治理和地下水污染防治。

专业解读：这些规划虽不全以自然生态为题，但决定生态保护的压源管理和监测底座。湿地、河湖、农田景观和水源地修复项目需要把农业面源、地下水、农村生活污水、气候适应和生态监测数据贯通，避免只在工程区内评价生态状态。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202606/t20260612_1159185.shtml

3. 第三轮第六批中央生态环境保护督察完成进驻阶段

时间：2026-06-10

来源：生态环境部

核心内容：第三轮第六批中央生态环境保护督察组已完成对辽宁、吉林、黑龙江、广东、广西、西藏、新疆7省区和新疆生产建设兵团的进驻阶段工作。生态环境部通报强调督察坚持系统观念、问题导向和精准科学依法，聚焦突出生态环境问题，推动解决群众反映强烈问题。

专业解读：督察进驻结束后通常进入问题梳理、反馈和整改阶段。对自然保护地、草原湿地、矿山修复、河湖岸线和生物多样性保护而言，后续应关注典型案例、整改清单和责任落实，尤其是保护红线、自然保护地违规开发和修复成效不实等风险。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywgz/zysthjbhdc/dcjz/202606/t20260610_1159060.shtml

4. 全国草原保护日强调草原高水平保护与草业高质量发展

时间：2026-06-18

来源：国家林业和草原局

核心内容：国家林草局在全国草原保护日发布信息，回顾我国草原法治化进程和党的十八大以来草原生态保护修复进展，指出草原退化面积快速缩减、草原生态状况持续改善。“十五五”时期将以草原高水平保护与草业高质量发展为主线，推进草原治理体系和治理能力现代化。

专业解读：草原保护正在从阶段性禁牧休牧、工程修复转向制度化质量提升。建议草原修复项目把降水约束、载畜压力、乡土草种、土壤有机碳、鼠虫害绿色防控、草畜平衡和牧民生计纳入同一评价框架，避免以短期盖度替代长期生态稳定性。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20260618/677134.html>

5. 国家林草局发布世界防治荒漠化与干旱日宣传海报

时间：2026-06-15

来源：国家林业和草原局

核心内容：6月17日为第32个世界防治荒漠化与干旱日，全球主题为“草原：认识、尊重、修复”，我国主题为“人人参与治沙，代代共享绿色”。国家林草局荒漠司发布宣传海报，服务防沙治沙、草原保护修复和公众参与传播。

专业解读：该主题把草原、荒漠化和干旱适应放在同一治理场景中。干旱半干旱区生态工程应优先识别水资源承载力和退化驱动因素，综合采用封育、轮牧、乡土植物恢复、沙源阻断和社区共管，而不是机械扩张造林种草面积。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/lcdt/20260615/676371.html>

6. 农业农村部部署长江流域水生生物资源养护相关工作

时间：2026-06-06

来源：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

核心内容：农业农村部相关工作信息围绕长江流域水生生物保护、禁捕执法、增殖放流规范化和渔业资源养护展开，强调以栖息地保护、资源监测和执法监管巩固长江十年禁渔成效。

专业解读：长江水生生物保护已进入从禁捕管控向系统恢复过渡的阶段。除执法外，应持续跟踪产卵场、索饵场、洄游通道、支流连通性、鱼类群落年龄结构和外来种压力，并审慎评估增殖放流的遗传与生态风险。

原文链接：https://cjyzbgs.moa.gov.cn/gzdt/202606/t20260606_6484798.htm

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / IUCN / UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：七类行动推动土地修复、防治荒漠化和抗旱

时间：2026-06-16

来源：UNEP / UN Decade on Ecosystem Restoration

核心内容：UNEP 在世界防治荒漠化与干旱日前更新专题，提出可持续农业、土壤保护、传粉者保护、淡水生态系统恢复、海岸与海洋生态系统更新、城市自然回归和修复融资七类行动。文章指出全球超过 20 亿公顷土地退化，影响超过 30 亿人，并威胁大量物种。

专业解读：这是一份适合项目设计的行动清单。实务中应先区分防止退化、减轻压力和主动修复三类目标，再针对土壤、水文、污染、外来种、社区生计和融资约束选择组合措施，避免用单一工程替代系统治理。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/seven-ways-restore-land-halt-desertification-and-combat-drought>

2. UNEP：世界防治荒漠化与干旱日聚焦牧场生态系统

时间：2026-06-17

来源：UNEP

核心内容：UNEP 执行主任在世界防治荒漠化与干旱日讲话中指出，牧场覆盖地球陆地面积一半以上，支撑约 20 亿人口，并与粮食、饲料、生物多样性、水安全、文化身份和气候韧性密切相关，但在国家政策中长期被低估。

专业解读：牧场和草原是土地退化中最容易被低估的生态系统。生态保护项目应把游牧和牧民知识、草畜平衡、土地权属、草原生物多样性、干旱预警和恢复融资纳入治理，而不是只用森林化思路处理开阔生态系统。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/speech/protecting-rangelands-home-billions-people>

3. FAO 生物多样性知识中心发布 6 月更新

时间：2026-06-16

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：FAO 生物多样性知识中心 6 月更新显示平台资源增至 587 项，新增内容包括农食系统在国家生物多样性战略与行动计划中的政策简报、马达加斯加农业部门生物多样性主流化路线图、小规模渔业参与昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的评估与工具箱、土地权属和野生动物治理工具，以及生物多样性友好型农食实践指南。

专业解读：FAO 的重点是把生物多样性目标嵌入农业、林业、渔业和畜牧业生产系统。对农业景观和渔业社区而言，应将 NBSAP 目标与补贴、土地权属、渔业管理、森林遗传资源和供应链标准衔接，并形成产地尺度可报告指标。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/new-in-the-fao-biodiversity-knowledge-hub--june2026-update/en>

4. IUCN：用自然基解决方案全球标准推进欧洲海岸修复

时间：2026-06-18

来源：IUCN

核心内容：IUCN 发布 REST-COAST 项目相关出版物，说明 IUCN 自然基解决方案全球标准如何帮助海岸修复项目同时交付生物多样性、气候适应、灾害风险降低和社区收益。文章强调海岸生态系统在应对生物多样性丧失和气候风险中的关键作用。

专业解读：海岸修复需要从单点栖息地工程转向自然基解决方案全过程评估。红树林、盐沼、海草床和滨海湿地项目应明确受益人、风险分配、长期维护、气候暴露、生态连通性和可监测指标，避免只报告种植面积或岸线长度。

原文链接：<https://iucn.org/index.php/news/202606/advancing-coastal-restoration-europe-through-iucn-global-standard-nature>

5. IUCN：西巴尔干生态系统修复会议推进自然基解决方案

时间：2026-06-09 至 2026-06-11

来源：IUCN

核心内容：IUCN 西巴尔干修复会议在北马其顿奥赫里德举行，聚焦绿色议程下的生态系统修复和自然基解决方案。会议指出区域生态系统受到不可持续资源利用、土地利用变化、污染和气候变化压力，修复和自然基解决方案可同时支持环境治理、人类福祉和社会经济韧性。

专业解读：该会议反映区域层面的修复能力建设正在加速。对跨区域生态修复而言，关键是将政策承诺转化为优先区识别、退化诊断、参照模型、利益相关方参与、资金机制和长期监测，而非只形成会议倡议。

原文链接：<https://iucn.org/events/iucn-event/western-balkans-restoration-conference-advancing-nature-based-solutions-unde>

6. UN 世界防治荒漠化与干旱日强调牧场“认识、尊重、修复”

时间：2026-06-17

来源：United Nations

核心内容：联合国世界防治荒漠化与干旱日页面以“Rangelands: Recognize. Respect. Restore.”为主题，强调牧场是最广泛但最被忽视的生态系统之一，覆盖地球陆地面积一半以上，支撑约 20 亿人的生活，并服务粮食安全、水循环、生物多样性保护和气候韧性。

专业解读：该主题可与国内全国草原保护日形成呼应。草原、稀树草原、灌丛和荒漠草地的治理不宜套用森林生态系统指标，应尊重开阔生态系统特征和传统牧业制度，并把恢复投资与牧民权益保护结合。

原文链接：<https://www.un.org/en/node/74111>

三、近期新发表论文（近 1-2 周）

1. The rarest invaders: systematic global evidence for the conservation-invasion paradox in plants

（最罕见的入侵者：植物保护-入侵悖论的全球系统证据）

期刊与日期：npj Biodiversity | 2026-06-19

作者：Ripa, R. R., Klinger, Y. P., & Franzese, J.

摘要概括：研究整合全球外来植物和保护评估数据库，识别出 89 种同时原产地受威胁、在引入地具有入侵性的植物。结果显示受威胁植物比非受威胁植物更不易归化和入侵，说明该悖论确属少见但治理意义突出。

专业解读：该研究揭示保护管理和入侵管理之间的制度缝隙。同一物种可能原产地需要保护，在引入地需要控制，跨境贸易、园艺利用、种质保存和风险评估需要把原产地保护状态与引入地生态风险同时纳入。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44185-026-00142-9>

原文链接：<https://www.nature.com/articles/s44185-026-00142-9>

2. Bayesian belief network model to predict human-wildlife conflict in protected areas

(用于预测保护地人兽冲突的贝叶斯信念网络模型)

期刊与日期: Scientific Reports | 2026-06-19

作者: García-Lloré, S., Stedman, R. C., & Fuller, A. K.

摘要概括: 研究基于安第斯三国 135 个陆地保护地、1011 名巡护人员调查数据, 建立贝叶斯信念网络预测人兽冲突风险。模型识别治理、野生动物接受度、参与和栖息地质量等关键驱动, 并显示提升治理和接受度可显著降低冲突风险。

专业解读: Scientific Reports 本期仅限量收录这一篇高度贴近保护地管理的研究。其价值在于把巡护知识、社会接受度和栖息地质量放入同一风险模型, 可用于保护地冲突预警和干预优先级排序。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-56081-9>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41598-026-56081-9>

3. Global Diversity Estimates Need to Acknowledge Species-Area Relationships

(全球多样性估计需要纳入物种-面积关系)

期刊与日期: Global Ecology and Biogeography | 2026-06-18

作者: Faurby, S.

摘要概括: 论文指出许多未描述物种数量估计依赖有限样本外推, 若样本并非随机且未显式考虑物种-面积关系, 全球多样性估计可能产生系统偏差。

专业解读: 生物多样性本底评估和保护缺口分析高度依赖物种数估计。该文提醒在制定保护目标、物种调查和红色名录优先级时, 需要处理采样面积、空间异质性和分类学偏差, 避免把统计外推误读为真实物种存量。

DOI: <https://doi.org/10.1111/geb.70267>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.70267>

4. Predation, Climate and Species Traits Interact to Shape Global Patterns of Avian Nest Architecture

(捕食、气候与物种性状共同塑造全球鸟类巢结构格局)

期刊与日期: Global Ecology and Biogeography | 2026-06-18

作者: Chia, S. Y.

摘要概括: 研究在全球尺度分析鸟类巢结构与捕食压力、气候和物种性状之间的关系, 讨论封闭巢、洞巢等巢型的生态和进化驱动因素。

专业解读: 繁殖微生境是鸟类保护和栖息地管理中常被低估的维度。森林、草地和城市鸟类保护不仅要保留植被面积, 还应维护巢址结构、捕食压力梯度和气候遮蔽条件, 尤其是在热浪和极端降雨增加的背景下。

DOI: <https://doi.org/10.1111/geb.70265>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.70265>

5. Catchment lithology controls net carbon balance along the Antarctic Peninsula

(流域岩性控制南极半岛沿岸净碳平衡)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-06-16

作者: He, S., Zhang, X., Hu, H., et al.

摘要概括: 研究利用沉积有机碳分析和同位素端元混合模型, 比较南极半岛西部两个不同基岩类型峡湾的有机碳埋藏和氧化过程, 显示流域岩性显著影响区域净碳平衡, 未来生态系统变化可能提高有机碳埋藏通量。

专业解读: 极地沿岸生态系统变化对全球碳循环反馈具有放大意义。该研究提示蓝碳和海岸碳汇评估不能只看植被或水体, 还应把流域岩性、沉积物来源和气候驱动的生态变化纳入。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-74667-9>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-74667-9>

6. The effects of plastic pollution on biodiversity

(塑料污染对生物多样性的影响)

期刊与日期: Nature Reviews Biodiversity | 2026-06-11

作者: Savoca, M. S., Murphy, E. L., Brandon, A. M., et al.

摘要概括: 综述系统讨论塑料污染对生物多样性的影响路径, 包括摄食、缠绕、栖息地改变、污染物载体效应和跨生态系统迁移, 并强调微塑料和纳米塑料暴露下的风险评估仍存在重要不确定性。

专业解读: 塑料治理与生物多样性保护需要更紧密衔接。海岸带、河湖湿地和保护地管理应把塑料源头削减、岸滩清理、渔具管理、微塑料监测和物种暴露风险纳入常规保护指标。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00170-0>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00170-0>

7. Socially informed conservation priorities in Vietnam reveal major overlaps between biodiversity protection and human needs

(越南社会信息化保护优先区揭示生物多样性保护与人类需求高度重叠)

期刊与日期: Communications Earth & Environment | 2026-06-05

作者: Khuu, D. T., Oldekop, J. A., Hanson, J. O., et al.

摘要概括: 研究以越南为案例, 把生物多样性价值与人类需求、社会约束和保护机会进行空间整合, 讨论 30% 保护目标下如何识别既能提升生物多样性保护、又能降低社会冲突或兼顾民生需求的优先区域。

专业解读: 保护地扩张不能只按物种丰富度排序。将社区依赖、土地利用、民生需求和治理可行性纳入优先区识别, 有助于减少纸面保护和社会冲突, 提高保护目标真实落地率。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s43247-026-03686-7>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s43247-026-03686-7>

8. A fixed methane filter maximizes freshwater emissions under warming

(固定的甲烷过滤能力在升温下放大淡水甲烷排放)

期刊与日期: Nature Climate Change | 2026-06-05

作者: Harpenslager, S. F., Randall, K., Zhu, Y., et al.

摘要概括: 研究关注升温背景下淡水系统甲烷产生与氧化过滤过程的关系, 指出甲烷过滤能力若不能随升温同步增强, 淡水生态系统可能释放更多甲烷。

专业解读: 湿地、湖泊和河漫滩修复需要同时考虑生物多样性、水质和温室气体通量。对高有机质、富营养化或水位调控强烈的淡水系统, 应将甲烷监测纳入气候效益核算。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02649-2>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41558-026-02649-2>

四、经典高被引论文 (专业参考)

1. Enhancing the benefits of ecological restoration to biodiversity and ecosystem services: a meta-analysis

(提升生态修复对生物多样性与生态系统服务的效益: 元分析)

期刊与日期: Science | 2009

作者: Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括: 经典全球元分析, 证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务, 但恢复后往往仍低于未受损参照系统, 是讨论修复收益与恢复差距的基础文献。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

2. Global priority areas for ecosystem restoration

(全球生态系统修复优先区)

期刊与日期: Nature | 2020

作者: Strassburg, B. B. N., Iribarrem, A., Beyer, H. L., et al.

摘要概括: 高影响力空间优化研究, 提出在全球尺度同时考虑生物多样性、气候缓解和成本的修复优先区识别框架, 为 30% 保护与修复目标下的空间决策提供基础。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9>

3. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al.

摘要概括: 长期作为全球生态修复实践标准的核心文献, 提出参照生态系统、修复轨迹、五星评估系统和修复活动连续体, 对项目设计、监管和验收仍具直接参考价值。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13035>

4. Ecological restoration success is higher for natural regeneration than for active restoration in tropical forests

(热带森林自然恢复的生态修复成功率高于主动修复)

期刊与日期: Science Advances | 2017

作者: Crouzeilles, R., Ferreira, M. S., Chazdon, R. L., et al.

摘要概括: 高被引综合研究, 显示在许多热带森林情境中, 自然恢复可取得高于主动栽植的生物多样性和植被结构恢复效果, 强调识别恢复障碍和保护再生潜力的重要性。

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701345>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1701345>

5. A global meta-analysis on the ecological drivers of forest restoration success

(森林恢复成功生态驱动因素的全球元分析)

期刊与日期: Nature Communications | 2016

作者: Crouzeilles, R., Curran, M., Ferreira, M. S., et al.

摘要概括: 经典森林恢复元分析, 指出景观森林覆盖、干扰历史、恢复时间和恢复方式会影响森林恢复成效, 为修复优先区选择和长期监测提供重要依据。

DOI: <https://doi.org/10.1038/ncomms11666>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/ncomms11666>

6. Restoration ecology: Repairing the Earth's ecosystems in the new millennium

(恢复生态学: 在新千年修复地球生态系统)

期刊与日期: Restoration Ecology | 2001

作者: Hobbs, R. J., & Harris, J. A.

摘要概括: 早期纲领性论文, 强调修复目标选择、生态系统复杂性、实践与理论之间的双向反馈, 对理解“修回什么”仍有基础价值。

DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1526-100x.2001.009002239.x>

原文链接: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1526-100X.2001.009002239.x>