



# ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها

نیم‌سال اول ۰۳-۰۲

مدرس: آباءم- بهرامی

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

زمان آزمون: ۲ آذر

زمان اجرا، تقسیم و حل، سرشکن، تصادفی

تمرین سری اول

## مسئله‌ی ۱. رشد توابع

توابع زیر را بر حسب درجه رشدشان مرتب کنید.

$$\begin{array}{cccccc} (\sqrt{2})^{\lg n} & n^2 & n! & (\lg n)! & \left(\frac{3}{2}\right)^n & \\ \lg^2 n & n^3 & \lg(n!) & 2^{2^n} & n^{\frac{1}{\lg n}} & \\ \lg(\lg(n)) & n^{2^n} & n^{\lg(\lg(n))} & \lg n & 2^{2^{n+1}} & \\ 2^{\lg n} & (\lg n)^{\lg n} & n \lg n & 2^{\sqrt{2} \lg n} & \sqrt{\lg n} & \end{array}$$

## مسئله‌ی ۲. مردافکن

دو تابع  $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  بیابید، که اکیدا صعودی باشند و داشته باشیم:

$$g(n) \notin O(f(n)), f(n) \notin O(g(n))$$

## مسئله‌ی ۳. تعداد جمع بهینه

آرایه‌ی  $n$  تایی  $A$  داده شده است. می‌خواهیم از آن ماتریس  $B$  را بسازیم که در آن برای همه مقادیر  $j \leq i$  داشته باشیم  $B[i, j] = \sum_{k=i}^j A[k]$ . اگر  $j > i$  باشد مقدار  $B[i, j]$  مهم نیست.

الف) الگوریتم زیر را برای محاسبه‌ی  $B$  پیشنهاد می‌کنیم:

```
for i ← 1 to n do
  for j ← i to n do
    B[i, j] =  $\sum_{k=i}^j A[k]$ 
```

دقیقا چه تعداد عمل جمع در این الگوریتم انجام می‌شود؟

ب) الگوریتمی با تعداد جمع بهینه ارائه دهید. این تعداد دقیقا چقدر است؟

## مسئله‌ی ۴. رشد عجیب

فرض کنید توابع  $f$  و  $g$  به گونه‌ای داده شده‌اند که  $f(n) \in O(g(n))$ . برای هر یک از گزاره‌های زیر درستی و نادرستی آن‌ها را با ذکر دلیل ثابت کنید. (برای اثبات نادرستی، مثال نقض کافی است)

الف)  $\log(f(n)) \in O(\log(g(n)))$

ب)  $2^{f(n)} \in O(2^{g(n)})$

ج)  $f(n)^2 \in O(g(n)^2)$

## مسئله‌ی ۵.

ثابت کنید:  $\sum_{i=1}^n \sqrt{i} \in \Theta(n\sqrt{n})$

## مسئله‌ی ۶. بازگشتی

روابط بازگشتی زیر را حل کنید.

$$T(n) = T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{\log n} \quad (\text{الف})$$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{\log n} \quad (\text{ب})$$

## مسئله‌ی ۷. دنباله‌ی طلایی

$a_1$  تا  $a_k$ ، عدد حقیقی بزرگتر از یک می‌باشند. برای  $a_i$  ها یک شرط لازم و کافی پیدا کنید به طوری که  $T(n) = \sum_{i=1}^k T\left(\frac{n}{a_i}\right) + \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$  باشد.

## مسئله‌ی ۸. بازگشت عجیب

تابع  $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$  توسط رابطه‌ی بازگشتی زیر داده شده است:

$$T(n) = \begin{cases} a & \text{اگر } n = 1 \\ bn^2 + nT(n-1) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

که  $a, b$  اعداد حقیقی و مثبت‌اند.

الف) ثابت کنید  $T(n) \in \Theta(n!)$ .

ب) رابطه‌ی دقیق و صریح  $T(n)$  را بیابید. این رابطه را برحسب  $a$  و  $b$  و  $c$  بنویسید که

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{n!}$$

همچنین بررسی کنید  $a \leq c \leq a + 5b$ .

ج) فرض کنید تابع  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$  با این رابطه داده شده باشد:

$$g(n) = \begin{cases} a & \text{اگر } n = 1 \\ bn^k + ng(n-1) & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

ثابت کنید  $g(n) \in \Theta(n!)$ .

## مسئله‌ی ۹. حدس پیچیده

در هر قسمت، برای  $T(n)$  بهترین مرتبه‌ی ممکن را بیابید.

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + 1 \quad (\text{الف})$$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4} + \sqrt{n}\right) + T\left(\frac{n}{4}\right) + 1 \quad (\text{ب})$$

### مسئله ۱۰. شمارنده دودویی

همان طور که قبلاً دیده بودیم هزینه سرشکن افزایش در یک شمارنده دودویی از مرتبه  $O(1)$  بود. حالا یک شمارنده دودویی در نظر بگیرید که در آن هزینه تغییر  $i$  امین بیت برابر  $i$  باشد. ثابت کنید در این حالت نیز بازهم هزینه سرشکن عمل افزایش  $O(1)$  است.

### مسئله ۱۱. حذف پر هزینه

فرض کنید  $n$  عدد دودویی دارید که در ابتدا همه  $i$  ها برابر یک هستند. در هر مرحله دو عدد دلخواه را انتخاب کرده و از مجموعه حذف می کنیم و به جای آن ها حاصل جمعشان را قرار می دهیم. اگر دو عددی که حذف کردیم  $b_1$  و  $b_2$  بیتی باشند، هزینه این عمل برابر است با  $\min(b_1, b_2)$  به علاوه تعداد بیت های نقلی در جمع که بعد از بیت سمت چپ عدد کوچکتر به وجود می آید. مثلاً هزینه جمع دو عدد ۱۱۰۰ و ۱۰۱۱۰۱۰۰ برابر است با  $3 + 4 = 7$  و هزینه جمع دو عدد ۱۰۱ و ۱۰۰۰۱ برابر ۳ است. حال ثابت کنید اگر  $m$  بار این عمل را انجام دهیم حداکثر از  $O(m)$  هزینه صرف کرده ایم.

### مسئله ۱۲. آرایه ای جادار

می خواهیم  $n$  عدد را به ترتیب، در انتهای آرایه ای اضافه کنیم. طول آرایه در ابتدا ۱ است. در نوبت اضافه کردن یک عدد به انتهای آرایه، اگر آرایه فضای خالی داشت، عدد را در انتها اضافه می کنیم. در غیر این صورت، آرایه ای جدید به طول دو برابر آرایه فعلی ایجاد می کنیم، عناصر را از آرایه قبلی به آرایه ای جدید منتقل می کنیم و سپس عنصر جدید را در انتهای آرایه اضافه می کنیم. پیچیدگی زمانی سرشکن هر عمل اضافه کردن را محاسبه کنید.

### مسئله ۱۳. کار و بار

تعداد نامعلومی کار باید انجام شود. اگر  $i$  به صورت توانی از ۲ بود، انجام کار  $i$  ام هزینه ای برابر با  $i$  خواهد داشت و در غیر این صورت هزینه آن کار ۱ است. با سه روش الف) انبوهه، ب) حسابداری و ج) تابع پتانسیل ثابت کنید که هزینه سرشکن هر کار  $O(1)$  می باشد.

### مسئله ۱۴. نقطه ثابت

فرض کنید  $\sigma$  یک جایگشت تصادفی از اعداد ۱ تا  $n$  باشد. امید ریاضی تعداد  $i$  ها را بدست آورید که  $\sigma(i) = i$ .

### مسئله ۱۵. امید ریاضی وارونه ها

فرض کنید  $\sigma$  یک جایگشت تصادفی از اعداد ۱ تا  $n$  باشد امید ریاضی تعداد وارونه ها را بدست آورید. یک وارونه، یک زوج  $(i, j)$  است بطوری که  $i < j$  اما  $\sigma(i) > \sigma(j)$ .

### مسئله ۱۶. انتخاب تصادفی

الگوریتمی را در نظر بگیرید که ورودی  $a_1, \dots, a_n$  شامل  $n$  عدد مجزا را به ترتیب داده شده می خواند و هنگام خواندن  $a_i$  مقدار متغیر  $x$  را به احتمال  $1/i$  برابر  $a_i$  قرار می دهد. الگوریتم در پایان مقدار  $x$  را به عنوان خروجی گزارش می کند. با چه احتمالی خروجی الگوریتم برابر  $a_i$  است؟

### مسئله ۱۷. ارتفاع د.د.ج تصادفی

اگر اعداد ۱ تا  $n$  را به ترتیب تصادفی در یک درخت جست و جوی دودویی درج کنیم، رابطه ی بازگشتی امید ریاضی ارتفاع این درخت را بدست آورید.