

Вариант 0.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро BC в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -2; -1)$, $\mathbf{b}(1; 2; 1)$, $\mathbf{c}(4; 5; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; -7; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} - 9\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(2; 1; 3)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 4)$, $\mathbf{c}(-3; -7; -14)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 4; 6)$, $B(0; 5; 11)$, $C(-1; 5; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 5; 2)$, $B(4; 5; 0)$, $C(4; 4; 1)$, $D(7; 2; 9)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-5; -2; -4)$, $B(-9; -5; -2)$, $D(-6; 0; -6)$, $A_1(-4; 2; -7)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x - y - z = -7$ и $\beta : y - 4z + 9 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; -10; 10)$, $B(8; -9; 10)$, $C(9; -8; 11)$, $S(-1; 6; -1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 4; 2)$ перпендикулярно плоскостям $-2x - y + z = 4$ и $x - 3y + 2z = 3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 6)$, $B(7; 5; 6)$, $C(1; -2; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + y + z - 9 = 0 \\ -7x - 3y - 8z + 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-10; -33; 28)$ на плоскость $4x + 10y - 9z + 31 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{-3} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+8}{-3}$ и плоскостью $\pi : -x - y - z - 6 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -3)$, $B(15; 6)$ и $C(26; -11)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 1.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; -1; 1)$, $\mathbf{b}(2; 3; -4)$, $\mathbf{c}(-3; -4; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-10; 2; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(3; -4; 2)$, $\mathbf{b}(-6; 1; -4)$, $\mathbf{c}(3; -2; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 5; 8)$, $B(6; 4; 6)$, $C(4; 8; 11)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; -4; 2)$, $\mathbf{b}(0; 1; -1)$, $\mathbf{c}(-1; -1; -1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-4; 7; -8)$, $B(-6; 9; -3)$, $D(-6; 11; -5)$, $A_1(-7; 14; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x - y + 2z = -5$ и $\beta : -3y - z - 12 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; 0; -6)$, $B(-1; 1; -7)$, $C(8; 2; -7)$, и найти расстояние от точки $S(4; 0; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; 1; 10)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{0}$ и перпендикулярно плоскости $x - 2y - z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 0; 9)$, $B(13; -5; 5)$, $C(-3; 4; 12)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x - y - z + 2 = 0 \\ 5x - 2y - 3z = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-5; -4; 0)$ относительно плоскости $-x - 2y - z + 2 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-5}{-2}$ и плоскостью $\pi : 3x + y + 2z = 3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -1)$, $B(26; -5)$ и $C(16; 5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 2.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BC , а M делит ребро AA_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 1; 1)$, $\mathbf{b}(-1; 1; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-8; 7; 8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(4; -1; 3)$, $\mathbf{b}(-3; 1; -3)$, $\mathbf{c}(-15; 4; -10)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 5; 2)$, $B(7; 8; 7)$, $C(0; 4; -1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 0; 5)$, $B(8; -6; -2)$, $C(9; 7; 10)$, $D(6; -5; 1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-7; -8; -7)$, $B(-6; -5; -3)$, $D(-6; -10; -7)$, $A_1(-5; -10; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - z - 13 = 0$ и $\beta : -6x + 2y + 3z = -13$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-2; 7; 10)$, $B(1; 5; 9)$, $C(-4; 8; 11)$, $S(-4; -1; 5)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(4; -3; -1)$ параллельно плоскости $4x + 2y + 5z = -7$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-5}{3} = \frac{y+7}{1} = \frac{z+5}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 7; 2)$, $B(10; 6; 3)$, $C(-1; 10; 0)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - 2y - 3z + 11 = 0 \\ 2x + 3y + 7z - 14 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-6; 7; -3)$ относительно плоскости $-9x + 7y - 6z = 38$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x + y - 3z + 2 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 2)$, $B(6; -8)$ и $C(5; 10)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 3.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро $A_1 B_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{b}(-2; 5; -3)$, $\mathbf{c}(1; -2; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 0; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(3; -5; 2)$, $\mathbf{b}(3; 0; 5)$, $\mathbf{c}(1; -1; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 3; 5)$, $B(2; 0; 6)$, $C(2; 5; 5)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 4; 3)$, $B(-2; 5; 3)$, $C(5; 3; -5)$, $D(-5; 6; 10)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(-6; 9; 0)$, $Q(-2; 16; -1)$, $R(-7; -1; 2)$, $S(-8; 4; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + 5y - 7z = 11$ и $\beta : x + y - 11 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(10; 7; 1)$, $B(13; 3; -1)$, $C(9; 8; 2)$, и найти расстояние от точки $S(-8; -8; 7)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-4; -1; 3)$ параллельно плоскости $4x + y + 2z + 9 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 4; 3)$, $B(-1; 1; 2)$, $C(1; 2; 2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x + y + 11 = 0 \\ x - y + z + 2 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(16; 15; 35)$ на плоскость $-2x - 4y - 7z + 61 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 4y + 2z + 3 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -3)$, $B(-7; -2)$ и $C(2; -1)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 4.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -1; -1)$, $\mathbf{b}(-3; -3; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -1; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -6; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -2; -3)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -3)$, $\mathbf{c}(-1; 7; 6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 3; 7)$, $B(5; 2; 7)$, $C(1; 2; 6)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-4; 2; -5)$, $\mathbf{b}(5; 2; 5)$, $\mathbf{c}(2; 3; 1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(4; 1; -1)$, $A_2(5; -2; 3)$, $A_4(2; 6; -4)$, $B_1(1; 6; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - z - 7 = 0$ и $\beta : -3x - 2y - 3z = 5$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2; -4; 6)$, $B(5; -11; 1)$, $C(1; -2; 8)$, и найти расстояние от точки $S(8; 2; -3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; 2; 2)$ параллельно прямым $\frac{x+1}{1} = \frac{y+8}{-2} = \frac{z-4}{3}$ и $\frac{x-5}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 9; 5)$, $B(4; 6; 13)$, $C(1; 11; 0)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} 2x + 7y + 3z + 17 = 0 \\ -x - y - z - 2 = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти проекцию точки $M(-9; -18; 7)$ на плоскость $x + 4y - 6z + 17 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y+6}{1} = \frac{z-8}{1}$ и плоскостью $\pi : -4x - y - 6z - 2 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -3)$, $B(4; -16)$ и $C(-3; 3)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 5.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; 2)$, $\mathbf{b}(3; 1; -2)$, $\mathbf{c}(5; 0; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(5; -8; 9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-7; 5; -1)$, $\mathbf{b}(7; -4; 2)$, $\mathbf{c}(20; -20; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 1; 0)$, $B(8; 0; 1)$, $C(10; 0; 0)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(1; 4; 6)$, $B(-6; 1; 10)$, $C(1; 5; 7)$, $D(-4; 3; 10)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(7; -3; 6)$, $B(14; -4; 5)$, $D(2; -1; 5)$, $A_1(9; -6; 10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4x - 5y + 5z = -5$ и $\beta : x - z + 14 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-3; -3; -6)$, $B(-1; 0; -8)$, $C(-2; -1; -9)$, $S(-1; 5; -4)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; 6; -7)$ параллельно прямой $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{1}$ и перпендикулярно плоскости $-x + y + 2z + 3 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 1; 8)$, $B(12; 9; 10)$, $C(5; -2; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 4y - z + 7 = 0 \\ -x + 7y + 2z - 20 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(19; 24; -13)$ на плоскость $7x + 5y - 2z = 45$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{2}$ и плоскостью $\pi : 4x + y + 2z = -8$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -5)$, $B(21; -2)$ и $C(-6; -11)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 6.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 4; -3)$, $\mathbf{b}(-2; -3; 3)$, $\mathbf{c}(-1; -2; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; 7; -8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(11; -5; -4)$, $\mathbf{b}(-2; 2; 1)$, $\mathbf{c}(-3; 3; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 8; 9)$, $B(9; 13; 10)$, $C(7; 5; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(7; 8; 2)$, $B(4; 10; 9)$, $C(8; 7; -1)$, $D(11; 5; -8)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(2; -1; -3)$, $A_2(2; 0; -1)$, $A_3(3; -2; -8)$, $A_4(-1; 2; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : y - z - 6 = 0$ и $\beta : 3x - 4y + 8z = -10$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; 10; -7)$, $B(-5; 11; -5)$, $C(-7; 12; -2)$, $S(7; -3; 3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(5; 4; 2)$ параллельно плоскости $5x - 8y + 3z - 3 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-2}{-4} = \frac{y-3}{5} = \frac{z+7}{-2}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 1; 4)$, $B(8; -1; 0)$, $C(10; -2; -3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -7x + y + 2z + 9 = 0 \\ 6x - 2y - 3z - 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(3; 16; -10)$ на плоскость $-4x - 6y + 7z - 24 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{-3} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-6}{6}$ и плоскостью $\pi : x - y - z = 1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-3; 2)$, $B(-1; -27)$ и $C(5; 6)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 7.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DC , а M делит ребро BB_1 в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; 2; 3)$, $\mathbf{b}(-5; 2; 6)$, $\mathbf{c}(-6; 3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -4; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-3; -1; 3)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 2)$, $\mathbf{c}(-2; -5; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 4; 2)$, $B(1; 5; 2)$, $C(7; 3; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 8; 7)$, $B(7; 9; 9)$, $C(6; 10; 12)$, $D(3; 5; 5)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-3; -9; 3)$, $A_2(-1; 0; -6)$, $A_3(-1; -12; -6)$, $A_4(-4; -14; 8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - y + 11 = 0$ и $\beta : 3x + 6y + 2z = 4$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(2; -2; -1)$, $B(7; -1; 0)$, $C(5; -3; -1)$, $S(-2; 7; -7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 3; 8)$ параллельно прямой $\frac{x+6}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+8}{0}$ и перпендикулярно плоскости $3x + y + z - 6 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 0; 9)$, $B(14; -2; 4)$, $C(1; 1; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -5x + y + 7 = 0 \\ -2x + y + z + 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-11; -9; 0)$ относительно плоскости $-7x - 8y + z + 22 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{3} = \frac{y+6}{-2} = \frac{z-1}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x - y - 3z - 9 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 3)$, $B(-12; -20)$ и $C(-1; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 8.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -1; 2)$, $\mathbf{b}(1; 2; -1)$, $\mathbf{c}(-2; 0; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 8; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 1; 5)$, $\mathbf{b}(3; 2; -6)$, $\mathbf{c}(2; -3; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 4; 0)$, $B(-3; 5; 0)$, $C(10; 3; 1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 0; -2)$, $\mathbf{b}(-1; -4; -2)$, $\mathbf{c}(0; 1; 1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(0; 1; -5)$, $B(8; 0; -3)$, $D(2; -4; -4)$, $A_1(-3; 3; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + 3y + 2z = 4$ и $\beta : 3x + z + 13 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-7; -5; 5)$, $B(-6; -4; 4)$, $C(-10; -4; 5)$, $S(6; -2; 1)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(3; -10; 2)$ параллельно плоскости $-x + y + 2z - 9 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-6}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-2}{-3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 0; 2)$, $B(2; 1; 1)$, $C(-5; 4; -3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 4y - 2z - 27 = 0 \\ -x - y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-13; -21; -14)$ на плоскость $7x + 4y + 8z = 100$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{1} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{-4}$ и плоскостью $\pi : -x + 2y - z - 9 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -3)$, $B(-7; 8)$ и $C(7; 21)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 9.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AD в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 0; 2)$, $\mathbf{b}(5; -4; 3)$, $\mathbf{c}(-4; 1; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 6; 6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-1; 2; -2)$, $\mathbf{b}(-1; 3; -2)$, $\mathbf{c}(1; 4; -3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 7; 9)$, $B(5; 5; 12)$, $C(2; 10; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 8; 5)$, $B(2; 7; 5)$, $C(-4; 16; 2)$, $D(1; 9; 4)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани PQS и высоту, опущенную на эту грань из вершины R . $P(-9; -2; -2)$, $Q(-10; 3; -1)$, $R(-11; 5; -1)$, $S(-8; 5; 5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y + z - 7 = 0$ и $\beta : -7x - 3y + z = 10$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(0; -1; -4)$, $B(1; 2; -4)$, $C(-1; -11; -3)$, и найти расстояние от точки $S(8; 7; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(6; 4; -7)$ параллельно прямой $\frac{x+7}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+5}{0}$ и перпендикулярно плоскости $-2x + 8y + z - 7 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 8; 6)$, $B(2; 10; 6)$, $C(-1; 5; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -4x + 3y + z + 10 = 0 \\ 5x - 4y - z - 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(21; 6; 4)$ относительно плоскости $7x + 3y + 2z = 18$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-6}{1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 3y - 4z = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -3)$, $B(-5; 18)$ и $C(10; 9)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 10.

- В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 3 : 2.
- Доказать, что векторы $\mathbf{a}(5; -1; 5)$, $\mathbf{b}(-4; 3; -1)$, $\mathbf{c}(2; -3; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-9; 4; -6)$ по этим векторам.
- Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -8\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
- Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(12; 11; 9)$, $\mathbf{b}(1; 3; 4)$, $\mathbf{c}(-2; -4; -5)$.
- Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 7; 9)$, $B(6; -1; 9)$, $C(7; 0; 10)$.
- Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
- Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 6; 4)$, $B(4; 5; 4)$, $C(-7; 9; 11)$, $D(4; 4; 5)$?
- Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-3; -7; 3)$, $A_2(-5; -10; 1)$, $A_3(-12; -8; 2)$, $A_4(-1; -3; 6)$.
- Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x - y + 2z = -9$ и $\beta : -y + 2z + 2 = 0$.
- Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; -1; -1)$, $B(-7; 3; 0)$, $C(-8; 4; 0)$, $S(4; 8; 6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
- Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; 6; 3)$ параллельно прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+8}{1}$ и перпендикулярно плоскости $-x + 3y + 1 = 0$.
- Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 3; 3)$, $B(3; 2; -2)$, $C(4; 2; 0)$.
- Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 9y - z - 3 = 0 \\ x - 5y + 10 = 0 \end{cases}$$
- Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-2; 3; 0)$ относительно плоскости $-x + y = 4$.
- Найти угол между прямой $l : \frac{x+4}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-6}{3}$ и плоскостью $\pi : -x + 2y - 2z - 12 = 0$.
- На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; 3)$, $B(-14; 2)$ и $C(-4; -9)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 11.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -1; 3)$, $\mathbf{b}(5; -2; 3)$, $\mathbf{c}(-3; 2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; -1; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -5\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; -3; 2)$, $\mathbf{b}(-2; -1; -6)$, $\mathbf{c}(5; 6; 5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 1; 0)$, $B(6; 2; -1)$, $C(5; 3; -1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(2; 2; 0)$, $B(2; 1; -1)$, $C(7; 5; -7)$, $D(11; 12; -8)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-6; 6; -4)$, $B(-7; 5; -1)$, $C(-8; 7; -4)$, $D(-6; 3; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + 4y - z = -8$ и $\beta : -x + 3z - 10 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-10; -3; -1)$, $B(-12; 4; 2)$, $C(-13; 5; 3)$, и найти расстояние от точки $S(6; 2; 2)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-4; 4; 3)$ параллельно плоскости $8x + 5y + 5z - 9 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 8; 5)$, $B(2; 7; 0)$, $C(3; 7; 2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x - 6y + 4z + 27 = 0 \\ -x - 5y + 3z + 21 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(10; -25; -7)$ относительно плоскости $4x - 9y - 3z = 21$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z+3}{1}$ и плоскостью $\pi : 3x + 2y - 5z = -5$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; -1)$, $B(12; -7)$ и $C(-9; 5)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 12.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 2; 1)$, $\mathbf{b}(0; -2; -1)$, $\mathbf{c}(-1; 3; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; -4; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 6\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-1; -2; 2)$, $\mathbf{b}(-5; -5; -1)$, $\mathbf{c}(-4; -2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 0; 1)$, $B(0; -1; 0)$, $C(-7; -2; -2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 1; 9)$, $B(6; 3; 14)$, $C(1; 0; 6)$, $D(2; 0; 7)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_2 . $A_1(6; 6; 2)$, $A_2(4; 7; 3)$, $A_3(11; 5; 10)$, $A_4(3; 8; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x - 2y + 4z = -14$ и $\beta : x + z - 1 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; -3; -9)$, $B(-1; -5; -8)$, $C(-4; -6; -9)$, и найти расстояние от точки $S(5; 2; -8)$ до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-4; -10; -4)$ параллельно плоскости $x + 3y - 3z = 3$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+1}{-2} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z+6}{7}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 6; 9)$, $B(7; 4; 12)$, $C(10; 9; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -2x + 3y + 2z + 3 = 0 \\ -3x + 7y + 5z + 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-5; -9; 1)$ относительно плоскости $-3x - 3y + 2z - 11 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-1}$ и плоскостью $\pi : 2x - y + z + 10 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 4)$, $B(21; 8)$ и $C(-3; 0)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 13.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -1; 6)$, $\mathbf{b}(2; -2; 5)$, $\mathbf{c}(0; 5; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 8; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 9\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(3; -3; 5)$, $\mathbf{b}(-2; 3; -4)$, $\mathbf{c}(-4; 3; -6)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 2; 7)$, $B(2; -1; 6)$, $C(1; 3; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(6; 2; 4)$, $B(8; -1; 5)$, $C(1; 7; 0)$, $D(10; -3; 7)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(1; -7; 9)$, $A_2(2; -3; 17)$, $A_3(0; -11; 4)$, $A_4(3; 2; 10)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 5x - 2y + 4 = 0$ и $\beta : -x - y - 2z = -11$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(6; 1; -5)$, $B(7; 0; -5)$, $C(2; 11; -4)$, $S(-3; 7; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; 1; 0)$ параллельно прямым $\frac{x-5}{-9} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{0}$ и $\frac{x+3}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 2; 5)$, $B(12; 3; 0)$, $C(14; 4; -4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - 12 = 0 \\ 6x + 2y + z + 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(2; 1; -4)$ относительно плоскости $-2x - 7y + z + 42 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{-3} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z+3}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x + y - 3z = 9$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -2)$, $B(20; -9)$ и $C(9; 4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 14.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 2; 5)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 3)$, $\mathbf{c}(-2; 1; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -7; -6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; -5; 3)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -2)$, $\mathbf{c}(-1; 1; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 1; 1)$, $B(-1; 2; 0)$, $C(0; 2; 1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(9; 5; 9)$, $B(10; 5; 8)$, $C(11; 8; 1)$, $D(10; 1; 16)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(1; 0; 4)$, $B(-7; -5; 2)$, $C(-2; -13; -1)$, $D(-4; -3; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x - 2y - 3z = 1$ и $\beta : -2y - z + 6 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; 4; -10)$, $B(14; 9; -5)$, $C(13; 8; -7)$, $S(-8; 7; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; -2; 1)$ параллельно прямой $\frac{x+8}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-6}{2}$ и перпендикулярно плоскости $2x - y + 3z = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 8; 4)$, $B(14; 3; 6)$, $C(3; 10; 3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y - z - 3 = 0 \\ -10x - 2y + 3z + 15 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-11; 0; -5)$ относительно плоскости $-8x - y - z + 6 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x + y - 7z + 3 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 4)$, $B(17; 10)$ и $C(12; 22)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 15.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -5; 0)$, $\mathbf{b}(-1; -6; 4)$, $\mathbf{c}(-2; -1; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -1; 4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(9; -13; -22)$, $\mathbf{b}(1; -3; -6)$, $\mathbf{c}(-1; 4; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 2; 2)$, $B(5; 3; -2)$, $C(6; 4; -1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(4; 5; 6)$, $B(2; 10; 10)$, $C(5; 9; 8)$, $D(1; 10; 11)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(4; -3; -5)$, $A_2(14; 5; -8)$, $A_3(3; -2; -11)$, $A_4(4; -2; -9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x + y - z = 14$ и $\beta : x + 3y - 11 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(6; 9; 5)$, $B(14; 4; 1)$, $C(1; 13; 8)$, и найти расстояние от точки $S(2; 8; 2)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(0; 6; 9)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $2x + 6y - z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 2; 1)$, $B(3; -2; -1)$, $C(1; -5; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 4y + 2z + 21 = 0 \\ x + y + z + 11 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(28; -9; 13)$ на плоскость $-10x + 2y - 3z + 111 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+3}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-8}{-5}$ и плоскостью $\pi : x + y - 2z - 9 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -2)$, $B(-3; 15)$ и $C(-5; -14)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 16.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; -3; 1)$, $\mathbf{b}(1; -4; 4)$, $\mathbf{c}(-1; -6; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 1; -2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(6; 1; -4)$, $\mathbf{b}(4; 1; -3)$, $\mathbf{c}(-15; -7; 13)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 6; 6)$, $B(2; 7; 11)$, $C(0; 7; 14)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(6; 7; 0)$, $B(3; -2; 2)$, $C(5; 4; 1)$, $D(3; 0; 2)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-1; 0; 4)$, $B(-2; -1; 2)$, $C(1; 1; 8)$, $D(-8; -9; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x + 5y - 6z = -1$ и $\beta : -x + z - 9 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(2; 4; 9)$, $B(0; 5; 10)$, $C(-5; 7; 11)$, $S(3; 0; -4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; -5; 3)$ перпендикулярно плоскостям $-4x + 3y - z - 3 = 0$ и $9x - 5y + 2z + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 8; 5)$, $B(11; 11; 6)$, $C(10; 10; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x + 2y - z + 5 = 0 \\ -5x - y + z - 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(2; -1; 26)$ на плоскость $2x - y - 10z - 60 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-5}{-2}$ и плоскостью $\pi : 4x + y + 3z = -3$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -2)$, $B(12; 0)$ и $C(-4; -4)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 17.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -4; 4)$, $\mathbf{b}(2; 3; -4)$, $\mathbf{c}(-1; -4; 5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; -2; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(1; -2; -3)$, $\mathbf{b}(-4; 5; 5)$, $\mathbf{c}(-1; -7; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 1; 3)$, $B(15; 4; -7)$, $C(12; 3; -4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(7; 4; 8)$, $B(8; 9; 12)$, $C(6; -2; 2)$, $D(5; 0; 11)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-8; -8; 2)$, $B(-6; -10; -3)$, $D(-5; -8; 0)$, $E(-2; -9; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : y + z - 2 = 0$ и $\beta : 8x + 3y + 5z = -11$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(8; 0; -3)$, $B(6; -1; -2)$, $C(7; -3; -3)$, и найти расстояние от точки $S(-4; -3; 3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-6; -2; 6)$ перпендикулярно плоскостям $-x + y - 2 = 0$ и $-2x - 2y + z + 2 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 1; 6)$, $B(-1; -4; 7)$, $C(-2; -7; 8)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y - z + 15 = 0 \\ x + 2y - 7z + 17 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-17; 7; 17)$ на плоскость $9x - 2y - 4z = 68$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-8}{2}$ и плоскостью $\pi : 2x + 2y - z = 5$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; -5)$, $B(-28; 13)$ и $C(-8; 13)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 18.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 B_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 1; 1)$, $\mathbf{b}(0; 3; -2)$, $\mathbf{c}(-4; -2; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-10; 5; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(3; -2; 4)$, $\mathbf{b}(3; -5; 2)$, $\mathbf{c}(-5; 3; -4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 3; 3)$, $B(6; 2; 1)$, $C(9; 4; 10)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; -1; 3)$, $\mathbf{b}(0; 1; -1)$, $\mathbf{c}(1; 0; 2)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(8; 9; 5)$, $B(15; 4; 1)$, $D(5; 11; 5)$, $A_1(6; 10; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 3x + y - 2z = 7$ и $\beta : -y + 2z + 12 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(6; -7; -10)$, $B(8; -10; -8)$, $C(7; -8; -11)$, $S(-8; -7; 6)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-4; -3; -8)$ перпендикулярно плоскостям $-4x + y - z = 0$ и $3x + y = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 2; 7)$, $B(13; -2; 12)$, $C(11; -1; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 2y + 4z + 17 = 0 \\ -2x - y - 3z - 10 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(23; -13; 7)$ на плоскость $-5x + 6y - 2z = -12$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{1} = \frac{y+6}{2} = \frac{z-7}{-2}$ и плоскостью $\pi : -2x + 2y - 3z = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; -5)$, $B(11; -7)$ и $C(-4; 3)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 19.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро AB в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 2; 1)$, $\mathbf{b}(-4; 1; 0)$, $\mathbf{c}(-5; -2; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 10; 6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(4; -1; 2)$, $\mathbf{b}(11; -10; -8)$, $\mathbf{c}(-3; 6; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 3; 7)$, $B(0; 6; 5)$, $C(11; 2; 8)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 4$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 1; 3)$, $\mathbf{b}(-2; 1; 5)$, $\mathbf{c}(-3; 1; 7)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(1; 5; -6)$, $B(6; 8; -6)$, $D(-6; -4; -2)$, $A_1(5; 6; -5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x + y + z = 1$ и $\beta : x - y - 7 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(0; -7; -2)$, $B(1; -6; 5)$, $C(-2; -8; -7)$, $S(2; -8; -7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(3; 1; -8)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{1}$ и перпендикулярно плоскости $5x + 2y + z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 9; 3)$, $B(1; 10; 3)$, $C(-1; 11; 4)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + y - 12 = 0 \\ -3x + 2y + z - 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-26; 37; 47)$ на плоскость $9x - 7y - 10z + 43 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+2}{1} = \frac{y+6}{4} = \frac{z}{2}$ и плоскостью $\pi : -x - 2y + 2z - 6 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 4)$, $B(12; -3)$ и $C(-9; 0)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 20.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро DC в отношении $3 : 2$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 1; -3)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 2)$, $\mathbf{c}(0; -4; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 7; -5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(6; 5; 4)$, $\mathbf{b}(-2; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-6; -3; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 1; 3)$, $B(-1; 0; 5)$, $C(0; -1; 6)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(2; 1; 6)$, $B(0; 3; -1)$, $C(5; 4; 4)$, $D(5; 1; 10)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A_1(-12; 6; -1)$, $A_2(-9; 6; 0)$, $A_3(-13; 8; 5)$, $A_4(-1; 5; -3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + y + 6z = -10$ и $\beta : x - y + 7 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; -3; 7)$, $B(1; -4; 6)$, $C(-2; -5; 8)$, $S(-3; 2; -6)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-8; -1; -6)$ параллельно прямым $\frac{x+7}{-1} = \frac{y+6}{1} = \frac{z+2}{-2}$ и $\frac{x+6}{-3} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-5}{3}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 7; 0)$, $B(2; 9; 7)$, $C(9; 4; -10)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + y - z + 21 = 0 \\ x + y + 8 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-2; -3; 3)$ относительно плоскости $-3x - y + 2z - 8 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-8}{2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x - 2y - z - 4 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 2)$, $B(2; -9)$ и $C(-4; 4)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 21.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $A_1 D_1$, а M делит ребро CC_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; -3; -3)$, $\mathbf{b}(1; 0; 6)$, $\mathbf{c}(3; -4; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 2; 2)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; 2; -4)$, $\mathbf{b}(0; -7; -2)$, $\mathbf{c}(2; 1; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 9; 4)$, $B(3; 8; -5)$, $C(0; 10; 11)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 8; 0)$, $B(1; 5; -2)$, $C(0; 3; -3)$, $D(0; 2; -2)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(9; 7; -4)$, $B(18; 9; -13)$, $D(5; 6; 0)$, $A_1(8; 6; -2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + y - 2z = 8$ и $\beta : 2y - 4z - 10 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; 6; 8)$, $B(-5; 10; 5)$, $C(-5; 5; 9)$, $S(-4; 3; 4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-7; -10; -8)$ параллельно прямой $\frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z-2}{1}$ и перпендикулярно плоскости $x - 4y + z = 4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 8; 9)$, $B(9; 12; 12)$, $C(-7; 3; 5)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + y - 15 = 0 \\ -2x - 2y + z + 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-7; -15; -18)$ на плоскость $-3x - 4y - 7z = 59$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+4}{-1}$ и плоскостью $\pi : -3x - 2y + 4z = 4$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; -2)$, $B(0; -20)$ и $C(-13; -20)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 22.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AA_1 , а M делит ребро BC в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; 0; 5)$, $\mathbf{b}(-2; -4; -3)$, $\mathbf{c}(-1; 3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(6; 4; 8)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-16; 4; 9)$, $\mathbf{b}(-2; -4; -1)$, $\mathbf{c}(7; -1; -5)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 1; 2)$, $B(-7; -1; 1)$, $C(-4; 0; 1)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 3; 0)$, $B(3; 6; -3)$, $C(-3; 12; 5)$, $D(4; -4; -4)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(9; 9; 0)$, $A_2(7; 6; -1)$, $A_4(-1; 9; -7)$, $B_1(10; 7; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -4y + z + 6 = 0$ и $\beta : -2x - 2y + z = 14$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-5; 3; 1)$, $B(-4; 1; 1)$, $C(-9; 2; 2)$, и найти расстояние от точки $S(2; -4; 0)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(8; -6; -5)$ параллельно прямой $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+8}{-2}$ и перпендикулярно плоскости $x + 7y - z = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 8; 1)$, $B(10; 17; -4)$, $C(9; 15; -3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} x + 2y + 2z - 3 = 0 \\ x + 3y + z = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(-14; 15; -24)$ на плоскость $-3x + 9y - 7z - 67 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x - y - 4z + 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(0; 0)$, $B(-1; 18)$ и $C(-12; 8)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 23.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-3; 0; 1)$, $\mathbf{b}(-1; 2; 0)$, $\mathbf{c}(-5; 1; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-5; 10; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 9\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 2; 4)$, $\mathbf{b}(-2; -3; -5)$, $\mathbf{c}(-1; -2; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 9; 8)$, $B(-3; 8; 6)$, $C(8; 10; 9)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 9; 6)$, $B(-2; 15; 13)$, $C(2; 8; 4)$, $D(-1; 10; 8)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_3 . $A_1(9; 5; 0)$, $A_2(11; 8; -1)$, $A_3(12; 13; -6)$, $A_4(14; 13; -4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x - z - 12 = 0$ и $\beta : 4x - y + 3z = 11$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; -1; 8)$, $B(-3; -6; 9)$, $C(-4; -7; 9)$, $S(7; -1; -7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-2; -8; 5)$ параллельно прямой $\frac{x+3}{-4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$ и перпендикулярно плоскости $-3x + y = 3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 6; 6)$, $B(-2; 3; 7)$, $C(1; 7; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + y - z + 2 = 0 \\ 8x + y + 3 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-31; -11; -11)$ на плоскость $7x + 7y + 5z = 20$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+8}{2} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+2}{2}$ и плоскостью $\pi : x - y + 3z = -14$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 3)$, $B(6; -7)$ и $C(3; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 24.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-2; 3; -3)$, $\mathbf{b}(-3; 4; -4)$, $\mathbf{c}(3; -3; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; 5; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -6\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(5; 8; -2)$, $\mathbf{b}(-7; -4; 4)$, $\mathbf{c}(-3; -3; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 0; 9)$, $B(5; 5; 16)$, $C(3; 2; 11)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(0; 3; 9)$, $B(-8; 0; 8)$, $C(4; 4; 12)$, $D(5; 5; 8)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(7; 3; 5)$, $B(3; 0; 0)$, $D(4; 1; 1)$, $A_1(10; 2; 9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x + y + z = -5$ и $\beta : -2x + 6y + 9 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; 2; 4)$, $B(-8; 3; 5)$, $C(-11; 3; 6)$, $S(5; -1; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-5; -3; 10)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-6}{-1}$ и $\frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{-6} = \frac{z+5}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 4; 7)$, $B(0; 7; 14)$, $C(2; 0; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 6y - 22 = 0 \\ x - y + z + 4 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-22; 6; -10)$ относительно плоскости $-7x + 4y - 5z - 3 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-7}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-5}{-4}$ и плоскостью $\pi : 2x - y - z - 5 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; -5)$, $B(-6; -18)$ и $C(-1; 7)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 25.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; 0; -2)$, $\mathbf{b}(-1; -2; -2)$, $\mathbf{c}(2; 3; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; -3; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; -9; -5)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 2)$, $\mathbf{c}(-2; 1; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(7; 9; 1)$, $B(8; 8; 2)$, $C(5; 12; -3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; 0; 2)$, $\mathbf{b}(-3; 1; 7)$, $\mathbf{c}(-4; 1; 9)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(5; -6; -7)$, $A_2(10; 2; -5)$, $A_4(4; -10; -8)$, $B_1(2; -9; -8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + 3y + z = 2$ и $\beta : 3x + z + 12 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-9; 1; 0)$, $B(-6; -2; -1)$, $C(-8; 2; 0)$, $S(0; -5; 5)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-3; 10; -3)$ параллельно плоскости $x + 3y + 2z = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+7}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 2; 6)$, $B(9; -1; 5)$, $C(6; 4; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 3y - z - 16 = 0 \\ 2x - 2y - z - 14 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-4; 0; -1)$ относительно плоскости $-x - 5y - 2z - 21 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1}$ и плоскостью $\pi : 3x + y - 4z + 13 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -4)$, $B(-3; 14)$ и $C(8; 4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 26.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $D_1 C_1$, а M делит ребро AD в отношении $2 : 1$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; -1; 2)$, $\mathbf{b}(1; -1; 3)$, $\mathbf{c}(5; -2; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-2; 0; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 3; -4)$, $\mathbf{b}(-2; 3; -4)$, $\mathbf{c}(-2; -3; 10)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 0; 0)$, $B(7; 2; -3)$, $C(7; 1; -4)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-3; -1; -8)$, $\mathbf{b}(5; 2; 8)$, $\mathbf{c}(-3; -1; 1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(3; 3; 7)$, $A_2(0; 6; 8)$, $A_4(5; 3; 6)$, $B_1(9; 4; 4)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - 7y + 2 = 0$ и $\beta : -x + y + z = 9$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-6; -3; 1)$, $B(-7; -8; 3)$, $C(-7; -1; 2)$, $S(-3; 7; 0)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; 2; 6)$ параллельно прямым $\frac{x+7}{2} = \frac{y-3}{-8} = \frac{z-1}{1}$ и $\frac{x+8}{1} = \frac{y+6}{-9} = \frac{z-6}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 5; 3)$, $B(6; 10; 6)$, $C(-3; -1; -1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + 2y + z - 3 = 0 \\ -7x + 3y + 2z - 7 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-3; -1; 1)$ относительно плоскости $-x - 2y - z + 5 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : 6x + y + z = 1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(2; 3)$, $B(4; 17)$ и $C(26; 27)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 27.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(3; 5; 2)$, $\mathbf{b}(-6; -2; 1)$, $\mathbf{c}(4; -2; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(9; -3; -6)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(11; 9; -6)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 1)$, $\mathbf{c}(-5; -3; 1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 3; 9)$, $B(2; 7; 9)$, $C(2; 4; 10)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Лежат ли точки $A(8; 3; 4)$, $B(10; 0; 7)$, $C(12; 0; 9)$, $D(7; 11; -1)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках P, Q, R, S , площадь грани QRS и высоту, опущенную на эту грань из вершины P . $P(7; -10; 4)$, $Q(6; -8; -2)$, $R(2; -9; -2)$, $S(13; -8; 3)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y - z + 2 = 0$ и $\beta : -2x - 6y - z = 9$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-4; 5; 7)$, $B(-3; 6; 8)$, $C(-3; 7; 10)$, $S(4; 6; -4)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-6; -1; -4)$ параллельно плоскости $2x - 8y + z - 5 = 0$ и перпендикулярно прямой $\frac{x+4}{-1} = \frac{y+8}{5} = \frac{z-5}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(8; 1; 8)$, $B(5; -3; 1)$, $C(12; 6; 17)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 3x + 2y + z + 13 = 0 \\ 5x + 3y + 2z + 28 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-9; -14; 8)$ относительно плоскости $3x + 9y - 8z - 14 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{-4} = \frac{y+4}{-6} = \frac{z}{-3}$ и плоскостью $\pi : x - y + z + 12 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 3)$, $B(2; -20)$ и $C(11; -13)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 28.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AB в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; 1; 2)$, $\mathbf{b}(6; 2; 3)$, $\mathbf{c}(6; 3; 4)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(7; 3; 0)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(1; 4; -3)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 2)$, $\mathbf{c}(-4; -1; 0)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(0; 9; 1)$, $B(1; 14; 1)$, $C(-1; 0; 2)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-9; 10; -1)$, $\mathbf{b}(-1; 1; 0)$, $\mathbf{c}(10; -9; -1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(4; 7; 1)$, $B(7; 8; -1)$, $D(5; 9; -1)$, $A_1(6; 7; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + 2y + 7 = 0$ и $\beta : -x - 2y + z = 10$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-5; -9; 7)$, $B(-6; -6; 8)$, $C(-7; -10; 8)$, $S(-7; -5; -5)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; 3; -8)$ перпендикулярно плоскостям $x - 4y + 2z + 3 = 0$ и $-x + y - z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(6; 9; 0)$, $B(-1; 4; -2)$, $C(9; 11; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 5y + 1 = 0 \\ -x + 3y + z - 3 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-1; 5; -18)$ на плоскость $-x - 2y + 4z = 3$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{-1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z-1}{-2}$ и плоскостью $\pi : 2x - 4y + z - 8 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 4)$, $B(12; 13)$ и $C(23; -4)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 29.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(1; -2; 4)$, $\mathbf{b}(2; -6; 1)$, $\mathbf{c}(0; -1; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(3; -8; 5)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 5\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(4; 2; 1)$, $\mathbf{b}(6; 9; 7)$, $\mathbf{c}(-3; -2; -1)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(1; 0; 8)$, $B(2; 7; 8)$, $C(3; 4; 9)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Лежат ли точки $A(3; 2; 5)$, $B(7; 1; 2)$, $C(4; 2; 4)$, $D(5; 7; -2)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани BCD и высоту, опущенную на эту грань из вершины A . $A(-2; -10; -3)$, $B(-1; -8; -3)$, $C(-2; -13; -2)$, $D(-4; -8; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -3x + y + 6z = 9$ и $\beta : -x + z - 11 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(7; -3; 6)$, $B(6; -4; 4)$, $C(9; -2; 5)$, $S(-5; 0; 7)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; -6; 0)$ параллельно прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{7}$ и перпендикулярно плоскости $-2x - y - 10z + 1 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(2; 4; 0)$, $B(1; 5; 0)$, $C(0; 5; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - 2y - 3z + 21 = 0 \\ -x + 3y + 2z - 26 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-23; 27; -13)$ на плоскость $6x - 10y + 5z - 10 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x}{3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+6}{3}$ и плоскостью $\pi : -2x + 2y - z = -10$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 2)$, $B(-2; 23)$ и $C(-29; 26)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 30.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении $2 : 3$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-6; -5; 2)$, $\mathbf{b}(-1; -4; 2)$, $\mathbf{c}(-4; -6; 3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 1; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 8\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(7; 2; 3)$, $\mathbf{b}(-5; -2; -2)$, $\mathbf{c}(4; -4; 7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(5; 6; 8)$, $B(4; 8; 9)$, $C(7; 5; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Лежат ли точки $A(5; 6; 7)$, $B(4; 9; 5)$, $C(4; 8; 6)$, $D(8; 5; 9)$ в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A_1, A_2, A_3, A_4 , площадь грани $A_1 A_2 A_3$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_4 . $A_1(-9; 1; -3)$, $A_2(-3; 2; 4)$, $A_3(-4; 2; 4)$, $A_4(-4; 3; 5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -2x - y - z = -9$ и $\beta : 4x + 2z - 12 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(10; -6; -1)$, $B(11; -9; 0)$, $C(11; -2; 1)$, $S(-2; 7; 3)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M(10; 0; -9)$ параллельно плоскости $x + y = -9$ и перпендикулярно прямой $\frac{x-5}{1} = \frac{y+1}{9} = \frac{z+6}{1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 9; 3)$, $B(-2; 15; 8)$, $C(-1; 14; 7)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -8x + y - 10 = 0 \\ -x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(15; 13; -10)$ относительно плоскости $5x + 4y - 3z - 32 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{-2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z+5}{1}$ и плоскостью $\pi : -2x - y - 3z = -4$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 0)$, $B(-12; 30)$ и $C(-4; -6)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 31.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -6; -2)$, $\mathbf{b}(3; 3; 1)$, $\mathbf{c}(3; 4; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(0; -1; -3)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-3; -1; 1)$, $\mathbf{b}(7; 3; 2)$, $\mathbf{c}(11; 2; -7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(3; 4; 0)$, $B(8; 9; 2)$, $C(5; 7; 1)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(8; 1; 5)$, $B(2; 0; -2)$, $C(9; 1; 6)$, $D(9; 5; 10)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ACD и высоту, опущенную на эту грань из вершины B . $A(2; -5; 9)$, $B(-6; 3; 6)$, $C(5; -14; 10)$, $D(0; 0; 8)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -6x + 5y + 4z = 1$ и $\beta : y - z - 2 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-3; -3; 7)$, $B(-10; -2; 7)$, $C(5; -4; 8)$, $S(6; 6; -2)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 2; 6)$ параллельно прямым $\frac{x+4}{5} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+5}{1}$ и $\frac{x+2}{9} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{0}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 5; 2)$, $B(5; 4; 5)$, $C(2; 6; 0)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -4x + y + z - 11 = 0 \\ -9x + 2y + 3z - 29 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-16; 7; -15)$ относительно плоскости $7x - y + 6z = 6$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{5} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-4}{-5}$ и плоскостью $\pi : x - y + z + 1 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(3; 3)$, $B(-11; 1)$ и $C(-1; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 32.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра DD_1 , а M делит ребро $B_1 C_1$ в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(0; 1; -2)$, $\mathbf{b}(5; 3; 3)$, $\mathbf{c}(-3; -1; -3)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-7; -5; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(3; -1; 2)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 1)$, $\mathbf{c}(3; 7; -2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 8; 5)$, $B(8; 9; 2)$, $C(7; 9; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(3; 5; 2)$, $B(12; -2; 7)$, $C(8; 7; -7)$, $D(3; 6; 0)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-9; 9; -6)$, $B(-10; 7; -3)$, $D(-11; 10; -6)$, $A_1(-12; 6; -1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : y + z - 8 = 0$ и $\beta : x + 3y + 8z = 3$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-8; 2; 8)$, $B(-7; 9; 7)$, $C(-7; 8; 8)$, и найти расстояние от точки $S(0; 0; -5)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(2; -1; -4)$ параллельно прямой $\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+4}{0}$ и перпендикулярно плоскости $4x - 2y + z = 2$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 4; 0)$, $B(6; 2; -4)$, $C(6; 3; -3)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} -x + 2y - z - 5 = 0 \\ -2x + y + 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(-7; -6; -11)$ относительно плоскости $5x + 4y + 5z = -15$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+1}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z-5}{1}$ и плоскостью $\pi : -x - 2y - 7z - 6 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-5; 3)$, $B(-23; 4)$ и $C(-21; 27)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 33.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро $D_1 C_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; 3; -4)$, $\mathbf{b}(-1; -1; 3)$, $\mathbf{c}(1; 2; -5)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-1; 2; -9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 7\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(-1; 7; -3)$, $\mathbf{b}(4; -1; -2)$, $\mathbf{c}(3; -4; 3)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(8; 3; 7)$, $B(7; 0; 8)$, $C(6; -4; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 3$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(5; 7; 3)$, $B(8; 6; -2)$, $C(0; 8; 12)$, $D(4; 7; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(-5; 2; -8)$, $B(-5; -2; -5)$, $D(-1; -7; -3)$, $A_1(-2; -2; -6)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -x - z - 5 = 0$ и $\beta : 8x + 3y + 5z = 15$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(1; -7; -9)$, $B(2; -6; -9)$, $C(-2; -11; -8)$, $S(-6; 1; 7)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(7; 2; -7)$ перпендикулярно плоскостям $2x - 3y + 2z - 6 = 0$ и $x - y + 3z = -1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(3; 0; 3)$, $B(2; 2; 0)$, $C(2; 1; 1)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 5x - 6y - z + 17 = 0 \\ -4x + 5y + z - 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(5; -6; -12)$ относительно плоскости $-5x + 6y + 5z - 8 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+5}{1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+5}{-1}$ и плоскостью $\pi : -x + 2y + 4z + 14 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(1; 0)$, $B(18; 6)$ и $C(13; -8)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 34.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AD , а M делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(2; 3; 0)$, $\mathbf{b}(-3; -1; -2)$, $\mathbf{c}(-3; -3; -1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(2; 5; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}}, \widehat{\mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(6; -11; -6)$, $\mathbf{b}(-2; 7; 2)$, $\mathbf{c}(-3; 6; 2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(4; 3; 1)$, $B(3; 2; 4)$, $C(6; 4; 3)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}}, \widehat{\mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(0; -1; -2)$, $\mathbf{b}(5; 1; -3)$, $\mathbf{c}(-1; 0; 1)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(5; 9; -5)$, $B(-4; 4; 1)$, $D(2; 8; -3)$, $A_1(-2; 6; 0)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 5x - 7y + 2z = 5$ и $\beta : -y - z - 6 = 0$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(5; -8; 3)$, $B(1; -11; 1)$, $C(12; -3; 6)$, $S(-4; 0; -4)$:
 а) составить уравнение плоскости ABC ,
 б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(7; 5; -9)$ перпендикулярно плоскостям $-x + y + 5 = 0$ и $x + y + z = 8$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(9; 3; 7)$, $B(6; 4; 3)$, $C(2; 5; -2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x - y + 4z - 11 = 0 \\ -x + 2y - 9z + 27 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-24; -10; -6)$ на плоскость $-9x - 4y - 7z = 6$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z-7}{-3}$ и плоскостью $\pi : x + 3y - z = -1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(4; -1)$, $B(22; 0)$ и $C(-4; -13)$. Требуется:
 (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 35.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-1; -2; 1)$, $\mathbf{b}(4; -1; 3)$, $\mathbf{c}(5; 3; 1)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(4; -8; 9)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(4; 1; -4)$, $\mathbf{b}(-2; 3; 9)$, $\mathbf{c}(3; 3; -7)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 4; 8)$, $B(7; 7; 9)$, $C(8; 9; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(-1; -2; 3)$, $\mathbf{b}(-2; -3; 5)$, $\mathbf{c}(1; 1; -2)$?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D , площадь грани ABD и высоту, опущенную на эту грань из вершины C . $A(-6; 3; 5)$, $B(-13; 7; 3)$, $C(-10; 0; 2)$, $D(-14; 6; 2)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - z = 0$ и $\beta : -6x - 3y + 4z = -6$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(-1; 0; 5)$, $B(1; 2; 4)$, $C(0; 5; 3)$, $S(7; 1; -1)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-3; 2; -10)$ параллельно прямой $\frac{x+1}{5} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1}$ и перпендикулярно плоскости $4x + 2y + z = 1$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(1; 5; 3)$, $B(0; 7; 7)$, $C(3; 0; -6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 5y + 4z + 21 = 0 \\ -x - 3y - 3z - 15 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(11; 13; 17)$ на плоскость $3x + 8y + 7z = 12$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-4}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z+6}{-2}$ и плоскостью $\pi : -3x + y - 3z = 6$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-2; 3)$, $B(-28; -15)$ и $C(-14; 7)$. Требуется:
(а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 36.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра BB_1 , а M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -5; 0)$, $\mathbf{b}(-4; -5; 3)$, $\mathbf{c}(1; 1; 2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 1; -1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_y \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$, где $\mathbf{a}(6; -2; -1)$, $\mathbf{b}(-3; 2; 2)$, $\mathbf{c}(-24; 8; 9)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(9; 5; 4)$, $B(10; 4; 6)$, $C(14; 3; 7)$.
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 4$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(1; 0; -1)$, $\mathbf{b}(-4; -1; 3)$, $\mathbf{c}(-1; -1; 0)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(0; 7; 3)$, $B(1; 0; -1)$, $D(-1; -1; -2)$, $E(-2; 4; 1)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y + z - 12 = 0$ и $\beta : -8x - 3y - 5z = 15$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-2; 4; 10)$, $B(-3; 5; 11)$, $C(5; 5; 12)$, и найти расстояние от точки $S(0; 0; 1)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(7; -5; 3)$ параллельно прямым $\frac{x-6}{1} = \frac{y-5}{3} = \frac{z+6}{-2}$ и $\frac{x+8}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+3}{-1}$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(7; 7; 2)$, $B(5; 12; 1)$, $C(6; 9; 2)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -x + 5y + 6 = 0 \\ -3x + 8y - z + 20 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(1; 4; -5)$ относительно плоскости $-3x + 7z + 9 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x+6}{-1} = \frac{y-7}{1} = \frac{z}{-1}$ и плоскостью $\pi : 3x + y - 6z = 1$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-1; 3)$, $B(20; 6)$ и $C(-7; 9)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 37.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра $B_1 C_1$, а M делит ребро AA_1 в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-4; -2; -1)$, $\mathbf{b}(1; 2; -3)$, $\mathbf{c}(-1; -3; 6)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(10; 9; -7)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 6\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(2; 4; -5)$, $\mathbf{b}(-1; -2; 3)$, $\mathbf{c}(-11; -9; 11)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(6; 9; 5)$, $B(5; 8; 5)$, $C(3; 7; 4)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 3$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(7; 1; 3)$, $B(5; -8; -2)$, $C(8; -4; 6)$, $D(8; 5; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCDEFGH$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины E . $A(-7; -5; 4)$, $B(-8; -7; 5)$, $D(-11; -8; 6)$, $E(-11; -13; 9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : x - 2y + 5 = 0$ и $\beta : -x + 4y + z = 2$.
10. Задана пирамида $SABC$ координатами вершин $A(7; 3; 4)$, $B(9; 2; 3)$, $C(8; 5; 4)$, $S(7; -2; -3)$:
а) составить уравнение плоскости ABC ,
б) найти расстояние от вершины S до плоскости ABC .
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-1; -3; -8)$ параллельно прямой $\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{1}$ и перпендикулярно плоскости $-x + y = -4$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(0; 5; 2)$, $B(-1; 8; -5)$, $C(1; 1; 11)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 4y + z + 21 = 0 \\ -x - y - 5 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки M_1 , симметричной точке $M(7; -10; 4)$ относительно плоскости $7x - 4y + z = -6$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-5}{1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z+6}{2}$ и плоскостью $\pi : -4x - y - 2z + 5 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; 3)$, $B(-6; -8)$ и $C(4; 7)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
(б) найти длину медианы BD ;
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
(е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
(ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 38.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра CC_1 , а M делит ребро AD в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(4; -4; 3)$, $\mathbf{b}(-5; 2; 1)$, $\mathbf{c}(0; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(1; 2; -4)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 7\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 1$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-11; 8; 0)$, $\mathbf{b}(-2; 1; -1)$, $\mathbf{c}(7; -3; 4)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 8; 6)$, $B(5; 7; 3)$, $C(0; 9; 11)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 5$, $|\mathbf{n}| = 5$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$.
7. Компланарны ли векторы $\mathbf{a}(6; 3; 1)$, $\mathbf{b}(7; 3; -2)$, $\mathbf{c}(7; 4; 3)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$, площадь грани $A_1 A_2 A_3 A_4$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины B_1 . $A_1(3; -5; -4)$, $A_2(2; -5; -2)$, $A_4(11; -7; 3)$, $B_1(-1; -4; -9)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : 2x + 4y + 4z = 15$ и $\beta : -2y - z - 10 = 0$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-3; 10; -7)$, $B(-5; 13; -2)$, $C(-4; 11; -4)$, и найти расстояние от точки $S(-1; 6; -6)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-10; 6; 3)$ параллельно прямой $\frac{x+3}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-2}{0}$ и перпендикулярно плоскости $x + 2y + z = 3$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(4; 9; 3)$, $B(1; 7; -1)$, $C(6; 10; 6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
$$\begin{cases} -2x + 2y + z - 4 = 0 \\ -7x + 3y + 2z - 15 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки $M(-10; 0; -12)$ на плоскость $-x + y - z = 16$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-3}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$ и плоскостью $\pi : -4x - 2y - 3z = 9$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -2)$, $B(30; 12)$ и $C(8; -14)$. Требуется:
 - (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 - (б) найти длину медианы BD ;
 - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 - (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 - (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .

Вариант 39.

1. В параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $\overline{AB} = \mathbf{a}$, $\overline{AD} = \mathbf{b}$, $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$. Выразить через $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ вектор $\mathbf{q} = \overline{KM}$, где K – середина ребра AB , а M делит ребро DD_1 в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{a}(-5; -5; -4)$, $\mathbf{b}(-2; -1; 1)$, $\mathbf{c}(3; 1; -2)$ образуют базис. Разложить вектор $\mathbf{d}(-3; -2; 1)$ по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 1$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
4. Найти $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$, при $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ и $\mathbf{y} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(5; -8; -8)$, $\mathbf{b}(-3; 1; 4)$, $\mathbf{c}(-4; 1; 2)$.
5. Найти координаты единичного вектора $\mathbf{n}_0$, перпендикулярного плоскости $\triangle ABC$, где $A(2; 3; 7)$, $B(6; 10; 6)$, $C(3; 5; 8)$.
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$ при $|\mathbf{m}| = 2$, $|\mathbf{n}| = 2$, $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$.
7. Компланарны ли векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, где $A(1; 9; 4)$, $B(2; 7; 4)$, $C(1; 10; 3)$, $D(5; 0; 5)$?
8. Вычислить объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, площадь грани $ABCD$ и высоту, опущенную на эту грань из вершины A_1 . $A(1; -3; -3)$, $B(0; -5; -6)$, $D(-1; -6; -3)$, $A_1(-5; -10; 5)$.
9. Найти косинус острого угла между плоскостями $\alpha : -y + z - 14 = 0$ и $\beta : 5x - 2y - 5z = -2$.
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(-4; 1; -3)$, $B(0; 2; -4)$, $C(-11; 0; -1)$, и найти расстояние от точки $S(4; -6; 3)$ до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости π , проходящей через точку $M(-10; 2; -5)$ перпендикулярно плоскостям $x + 3y + z - 4 = 0$ и $-x - 2y - 5 = 0$.
12. Составить уравнение прямой AB и найти расстояние от точки C до этой прямой, если $A(5; 6; 1)$, $B(4; 4; 5)$, $C(7; 9; -6)$.
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой

$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ -5x + y + z - 14 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки $M(20; -10; 21)$ на плоскость $-5x + 4y - 4z + 53 = 0$.
15. Найти угол между прямой $l : \frac{x-6}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z}{-2}$ и плоскостью $\pi : 2x - 3y - 3z + 13 = 0$.
16. На плоскости дан треугольник ABC с вершинами $A(-4; -2)$, $B(5; -15)$ и $C(-8; -14)$. Требуется: (а) написать общие уравнения прямых AB и AC ;
 (б) найти длину медианы BD ;
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины C ;
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне AC ;
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла BAC ;
 (е) найти координаты точки E – пересечения прямых (г) и (д);
 (ж) найти координаты точки F , симметричной точке B относительно прямой AC .