

Название доклада

Фамилия Имя Отчество

Лаборатория математики ФН1

17 августа 2026 г.

Зачем эта задача

- где встречается на практике;
- почему известные подходы не дают ответа;
- что хотелось бы получить.

Постановка задачи

Рассматривается

$$Lu = f, \quad u \in D(L), \quad (1)$$

где L — линейный оператор в гильбертовом пространстве H .

Требуется: найти условия однозначной разрешимости (1) и оценить норму решения.

[1] Автор А. Б. (2019) — результат при условии ...

[2] Автор В. Г. (2023) — обобщение на случай ...

Открытым остаётся случай ...

Теорема

Формулировка. Условия перечисляются явно, обозначения — те же, что на предыдущем слайде.

- чем результат отличается от известных;
- какова цена ослабления условий.

Численный эксперимент

(график сходимости)

h	Ошибка	Порядок
0,1	$2,1 \cdot 10^{-3}$	—
0,05	$5,3 \cdot 10^{-4}$	1,99
0,025	$1,3 \cdot 10^{-4}$	2,03

Наблюдаемый порядок согласуется с теоретической оценкой $O(h^2)$.

- ➊ получено ...;
- ➋ показано, что ...;
- ➌ в дальнейшем планируется ...

Спасибо за внимание!



Автор А. Б. Название статьи // Журнал. — 2019. — Т. 5, № 1. — С. 3–17.



Автор В. Г. Название книги. — М.: Издательство, 2023.