

ΘΕΜΑ 4

4.1. Για να παραμένει στην δορυφορική του τροχιά γύρω από τον πλανήτη, πρέπει να κινείται με ταχύτητα τέτοια, ώστε η βαρυτική έλξη του από τον πλανήτη, να παίζει ρόλο κεντρομόλου δύναμης στην κυκλική του τροχιά στο ύψος αυτό. Δηλαδή πρέπει:

$$F_B = F_K \quad \text{ή} \quad G \cdot \frac{M_{\Pi} \cdot m}{(R_{\Pi} + h)^2} = \frac{m \cdot v_{\delta\sigma\rho}^2}{R_{\Pi} + h}$$

$$\text{ή} \quad G \cdot \frac{M_{\Gamma}}{9 \cdot R_{\Gamma}} = v_{\delta\sigma\rho}^2, \quad \text{οπότε} \quad v_{\delta\sigma\rho} = \sqrt{\frac{g_0 \cdot R_{\Gamma}}{9}} = \frac{8}{3} \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Η περίοδος περιστροφής του οχήματος γύρω από τον πλανήτη υπολογίζεται:

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot R_{\Gamma}}{v_{\delta\sigma\rho}} = \frac{18 \cdot \pi \cdot 64 \cdot 10^5}{8 \cdot 10^3} \text{ s} = 14400 \cdot \pi \text{ s}$$

Μονάδες 7

4.2. Κατά την εκτόξευση του σώματος από το όχημα, η οποία θεωρείται ασήμαντης χρονικής διάρκειας ισχύει η αρχή διατήρησης ορμής, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο όχημα να κινείται στην ίδια διεύθυνση με την ταχύτητά του ακριβώς πριν την εκτόξευση. Δηλαδή:

$$\vec{p}_{\text{πριν}} = \vec{p}_{\text{μετά}}, \quad \text{ή} \quad m \cdot v_{\delta\sigma\rho} = \frac{2}{3} \cdot m \cdot v'$$

$$\text{Άρα} \quad v' = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 4 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Μονάδες 6

4.3. Από την έκρηξη κατά την εκτόξευση του σώματος από το δορυφορικό όχημα, αποδόθηκε στο σύστημα πρόσθετη μηχανική ενέργεια, ως αύξηση της συνολικής κινητικής ενέργειας των τμημάτων του:

$$\Delta E_M = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot m \cdot v'^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\delta\sigma\rho}^2 = \frac{900}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 16 - \frac{64}{9} \right) \cdot 10^6 \text{ J} = \frac{900 \cdot 32}{6} \cdot \left(1 - \frac{2}{3} \right) \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\text{Τελικά} \quad \Delta E_M = 1,6 \cdot 10^9 \text{ J}$$

Μονάδες 6

4.4. Για την κίνηση του σώματος προς την επιφάνεια του πλανήτη εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας:

$$-G \cdot \frac{M_{\Pi} \cdot m_1}{3 \cdot R_{\Pi}} = -G \cdot \frac{M_{\Pi} \cdot m_1}{R_{\Pi}} + \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2$$

$$\text{ή} \quad \frac{2 \cdot G \cdot M_{\Pi}}{3 \cdot R_{\Pi}} = \frac{v_1^2}{2}, \quad \text{άρα} \quad v_1 = \sqrt{\frac{4}{9} \cdot g_0 \cdot R_{\Gamma}} = \frac{16}{3} \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Μονάδες 6