
已保存 Fig 模型 · 统一理论测试集


同一现有测试集 · 1,024 个物理样本 · 全局 #01–#20 · 按测试宏平均误差从高到低排列（越低越好）



柱高 = 各测试样本的 e / H / C 相对 L2 误差等权平均后，再对全部测试样本取平均；单位为百分比。
参数为精确可训练参数量；训练池包含优化与验证样本。集成参数为成员总量，样本数按结果记录展示。
共同配置：LayerNorm、dropout 0.02；差异在柱上注明。纵轴从 0 开始，无截断。总览包含全部模型。
状态：intermediate = 中间权重，仅作探索比较；frozen = 已选定权重，但训练尾段未完成。
测试集 SHA256: 408ba21ea903d850fcc449c4b215a296d421c838e62361343c05d7608a6aedf3

Fig 模型明细 · 第 1/2 页

同一现有测试集 · 1,024 个物理样本 · 全局 #02–#11 · 按测试宏平均误差从高到低排列（越低越好） · #01 smoke 见总览



柱高 = 各测试样本的 e / H / C 相对 L2 误差等权平均后，再对全部测试样本取平均；单位为百分比。

参数为精确可训练参数量；训练池包含优化与验证样本。集成参数为成员总量，样本数按结果记录展示。


共同配置：LayerNorm、dropout 0.02；差异在柱上注明。纵轴从 0 开始，无截断。所有明细分页使用共同纵轴；#01 smoke 完整展示于总览。

状态：intermediate = 中间权重，仅作探索比较；frozen = 已选定权重，但训练尾段未完成。

测试集 SHA256: 408ba21ea903d850fcc449c4b215a296d421c838e62361343c05d7608a6aedf3

Fig 模型明细 · 第 2/2 页

同一现有测试集 · 1,024 个物理样本 · 全局 #12–#20 · 按测试宏平均误差从高到低排列（越低越好） · #01 smoke 见总览



柱高 = 各测试样本的 e / H / C 相对 L2 误差等权平均后，再对全部测试样本取平均；单位为百分比。

参数为精确可训练参数量；训练池包含优化与验证样本。集成参数为成员总量，样本数按结果记录展示。

共同配置：LayerNorm、dropout 0.02；差异在柱上注明。纵轴从 0 开始，无截断。所有明细分页使用共同纵轴；#01 smoke 完整展示于总览。

状态：intermediate = 中间权重，仅作探索比较；frozen = 已选定权重，但训练尾段未完成。

测试集 SHA256: 408ba21ea903d850fcc449c4b215a296d421c838e62361343c05d7608a6aedf3