

第一次习题课

定义定理: $\epsilon - \delta$ 语言, 单调有对应界数列收敛, 闭区间套定理, 列紧性定理, 两面夹, Cauchy 收敛准则, Stolz 定理.

需要注意的问题:

- 一. $\lim_{x \rightarrow \infty}$ 需要同时说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ 两种情况.
- 二. 分类讨论得遍历所有情况. eg. P25.14 很多同学只讨论了 $a < b$, 缺乏 $a = b$.
- 三. 题目中说了按定义证明一定要按定义!!! 考试时如果不按要求一律 0 分, 其它题就算用超纲方法对的也会给分.

问题较多的习题:

(P25.16) 证明: $\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$.

Pf. 不妨设 a_1 是最大的那个数, 一方面 $a_1 \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}$, 另一方面, $\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq a_1 \sqrt[n]{m}$, 由两面夹即可得.

(P25.19) 设 $a_n \leq a \leq b_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$.

$0 \leq |a_n - a| = a - a_n \leq b_n - a_n$ 再用两边夹能证 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0$, 自然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$; 另一边同理.

(P26.21) $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$, 求证: 若 $\{b_n\}$ 收敛, 那么 $\{a_n\}$ 收敛.

Pf. 交换位置可得 $0 \leq \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_n}{b_n}$, 由单调性以及有上界可得 $\frac{a_n}{b_n}$ 收敛, 最后由 $a_n = \frac{a_n}{b_n} b_n$ 可得 $\{a_n\}$ 收敛.

(P53.12) $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}, \{b_n\}$ 是正数列, $c_n = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$. 求证:

(1) $\{c_n\}$ 收敛; (2) 若 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \rightarrow \infty$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

Pf.(2) 由 Stolz 易得.

(1) 若 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 有限, 因其单调递增且有上界, 那么它收

敛, 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 那么 $\{a_n\}$ 有界. 则 c_n 的分子是 Cauchy 列:
 $|a_nb_n + \cdots + a_{n+p}b_{n+p}| \leq M|b_n + \cdots + b_{n+p}|$ 所以 c_n 的分子分母
 都是收敛的, 那么 $\{c_n\}$ 收敛.

(P53.15) 证明: 函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0^-$ 时有极限 l 的充分必要条件是: 对于任意一个以 x_0 为极限的严格递增数列 $\{a_n\}, a_n < x_0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = l$.

Pf. 必要性由定义易得, 只证充分性. 若 $f(x)$ 没有极限, 那么对任意的 ϵ, δ 均存在某个 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 都有 $|f(x) - l| > \epsilon$. 现取定 ϵ , 首先令 $\delta_1 = 1$, 存在 $x_1 \in (x_0 - 1, x_0)$ 使得 $|f(x_1) - l| > \epsilon$.

依次构造 $\delta_n = \min\{\frac{1}{n}, x_0 - x_{n-1}\}, n \geq 2$, 存在 $x_n \in (x_0 - \delta_n, x_0)$ 使得 $|f(x_n) - l| > \epsilon$. 此时构造出一列严格增列 $\{x_n\}$ 逼近 x_0 , 此时应有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$, 但 $|f(x_n) - l| > \epsilon$ 矛盾, 充分性得证.

补充习题:

(P27.25 拓展) $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

Pf. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2a_n^2} = 1$.

(敛散性判断) 判断以下几项哪些条件能判断敛散性:

(1) 对任意 ϵ 存在 n 使得对任意 $N > n$ 时有 $|a_N - a_n| < \epsilon$.

(2) 对任意 n, p 有 $|x_{n+p} - x_n| \leq \frac{p}{n}$.

⑤ 对任意 n, p 有 $|x_{n+p} - x_n| \leq \frac{p}{n^2}$.

解答: (1), (3) 能判断, 证明和反例自己思考.

✓ **补充 1:** $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 求 $\{a_n + b_n\}, \{a_nb_n\}$ 敛散性.

Pf. $\{a_n + b_n\}$ 显然发散, 但 $\{a_nb_n\}$ 敛散性无法确定 (两个都可以举例子).

$$a \quad \frac{a+b}{2} \quad \frac{a+b}{2} + \frac{\sqrt{ab}}{2}$$

$$a_n > b_n.$$

$$a_m : s$$

$$b_n : t.$$

$$b \quad \sqrt{ab}, \quad \sqrt{\frac{a+b}{2} \sqrt{ab}}.$$

$$a_n > a_{n+1} \quad \text{and} \quad b_{n+1} > b_n.$$

$$s = \frac{s+t}{2} \quad s < t.$$

$$a_0 > a_1 > \dots > a_n > b_n > b_{n+1} > \dots > b_0.$$

补充 2: $0 < b < a, a_0 = a, b_0 = b, a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}},$
求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 敛散性以及它两极限关系.

Pf. 由平均值不等式可得 $a_n \geq b_n$, 所以我们有 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \leq a_{n-1}, b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}} \geq b_{n-1}$, 即 $b \leq b_1 \leq \dots \leq b_n \leq a_n \leq \dots \leq a_1 \leq a$, 可得 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 收敛, 进一步可得收敛到的值相等.

补充 3: γ 常数: 令 $c_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} - \ln n$, 我们证 $\{c_n\}$ 收敛.

Pf. $\{c_n\}$ 单调递减: $c_{n+1} - c_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} < 0.$

$\{c_n\}$ 有下界: 由 $\ln n = \ln \frac{n}{n-1} + \ln \frac{n-1}{n-2} + \dots + \ln 2$ 以及 $\ln(1+x) \leq x$ 可得 $c_n \geq 0$ 有下界. 所以 $\{c_n\}$ 收敛.

补充 4: *stirling* 特殊情况: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$

Pf. 取对数, 左边变为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n - \ln 2 - \ln 3 - \dots - \ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(n+1) - n \ln n$, 再由 $\frac{1}{n+1} \leq \ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$ 两面夹即得.

P5. 3 易证.

$$4. \frac{1}{4}, \frac{125}{323}, \frac{122}{27}$$

7. 欲证 $|a+b| < |1+ab|$, 两边平方:

$$a^2 + b^2 < 1 + a^2 b^2 \Leftrightarrow (1-a^2)(1-b^2) > 0$$

P25. 1. $\forall \varepsilon > 0, \exists N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1, n \geq N$ 时 $|\frac{\sin n}{n}| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$

$$(4) \dots N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 \dots$$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon.$

对相同 $N, |a_n| - |a| \leq |a_n - a| < \varepsilon.$

反例: $a_n = (-1)^n.$ 反证: $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0. \forall \varepsilon, \exists N, n \geq N$ 时 $||a_n| - 0| < \varepsilon.$
 $2P|a_n| < \varepsilon.$

5. $M = 0$ 显然.

$M \neq 0$ 时: $\forall \frac{\varepsilon}{M}, \exists N, |a_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}, \therefore |a_n b_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$

6. $\exists N_1, |a_{2n+1} - a| < \varepsilon.$

$\exists N_2, |a_{2n} - a| < \varepsilon.$

$\Rightarrow N = \{2N_1 + 1, 2N_2\} \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$

7. (1) 奇子 $\rightarrow -1$

偶子 $\rightarrow 1$

(2) 奇子 $\rightarrow \varnothing.$

偶子 $\rightarrow b$

$$8 (1) \lim = \frac{4 + 5 \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot \frac{1}{n^2}}{3 + 2 \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{4}{3}, (2) = \frac{1 \times 4}{2 \times 3} \cdot \frac{2 \times 5}{3 \times 4} \dots \times \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)} = \frac{n+2}{3n} \Rightarrow \frac{1}{3}$$

$$(5) a_n = \frac{1 - 9^{n+1}}{1 - 9} \rightarrow \frac{1}{1-9}$$

14. $a = b$ 时 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1: |a_n - a| < \varepsilon$

$N_2: |b_n - a| < \varepsilon.$

$\Rightarrow \exists N. \begin{cases} |a_n - a| < \varepsilon \\ |b_n - a| < \varepsilon \end{cases}$

$$\Rightarrow C_n = \frac{a_n + b_n}{2} + \frac{|a_n - b_n|}{2} \rightarrow a$$

$$d_n = \frac{a_n + b_n}{2} - \frac{|a_n - b_n|}{2} \rightarrow a.$$

$a < b$ 时 $\forall 0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2}, \exists N, \begin{cases} |a_n - a| < \varepsilon \\ |b_n - b| < \varepsilon. \end{cases}$

$$b_n - a_n \geq b - a - 2\varepsilon > 0.$$

$$\lim C_n = \lim b_n = b$$

$$\lim d_n = \lim a_n = a.$$

$a > b$ 同理.

$$15. 2. 0 \leq (n+1)^k - n^k = n^k \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right) < n^k \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right) = n^{1-k} \rightarrow 0 \text{ 根据加.}$$

$$3. \sqrt[n]{n} = 2^{\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}} = 2^{1 - \frac{1}{2^n}} \rightarrow 2$$

$$5. \sqrt[n]{n+1} \leq \sqrt[n]{n} \leq \sqrt[n]{n} \quad \text{极限为1.}$$

17 1: a_n 单调有下界

$$3. |a_{n+p} - a_n| = |a_{n+1}q^{n+1} + \dots + a_{n+p}q^{n+p}| \\ = q^{n+1} |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}q^{p-1}| \\ \leq \frac{M \cdot q^{n+1}}{1-q}. \quad \text{取 } N \text{ 大 } 2p.$$

$$18 1: \text{stolz: } \frac{1}{c^n} = \frac{1}{c^n - c^{n-1}} = 0.$$

$$2. a_n \text{ 单调有下界} + x = \varepsilon \left(x + \frac{a}{x} \right) \Rightarrow x = \sqrt{a}.$$

$$22. 2. a_n = \left(\frac{n-3}{n-2} \right)^{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{n-2}{n-3} \right)^{n+1}} = \frac{1}{\left(\frac{n-2}{n-3} \right)^{n-3}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{n-2}{n-3} \right)^3} \\ \Rightarrow \frac{1}{e}$$

$$4. a_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^3} \right]^{\frac{1}{n^2}} \rightarrow e^2$$

$$23. \forall m > 0. \exists N. |a_n| > \frac{M}{b}. \quad |a_n b_n| \geq b \cdot \frac{M}{b} = M.$$

$$24. \sqrt[n]{n!} > \left[\left(\frac{n}{e} \right)^{\frac{n}{2}} \right]^{\frac{1}{n}} > \left[\frac{n}{e} \right]^{\frac{1}{2}}, \text{ 发散.}$$

$n \sin \frac{n}{n}$: 奇数子列无界, 偶数子列 0, 不收敛也不发散.

$$25. a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2 \Rightarrow a_n^2 > 2n-1, a_n > \sqrt{2n-1}$$

$$p50 1(2) \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \left| \frac{2}{x+1} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow |x| > \frac{2}{\varepsilon} + 1$$

$$(4). \forall \varepsilon, \delta = \varepsilon^q. \dots$$

$$2. a) \frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + \dots + 1 \rightarrow n.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{(3 + \frac{6}{x})^{70}}{(5 - \frac{1}{x})^{70}} \cdot \frac{(8 - \frac{1}{x})^{20}}{(3 - \frac{1}{x})^{20}} \Rightarrow \frac{3^{70} 8^{20}}{5^{90}}$$

4. $f(x)$ 有极限 L , 则 $\exists N, x > N, |f(x) - L| < \varepsilon$

$a_n \rightarrow +\infty: \exists N_1, n > N_1, a_n > N \Rightarrow |f(a_n) - L| < \varepsilon.$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L$$

5. (1) 左极限 -1 , 右极限 0 . 不存在极限

(2) 左极限 -1 , 右极限 1 , 不存在极限.

(3) 左极限 = 右极限 = 1 . 极限存在, 为 1 .

(4) 左极限 0 , 右极限不存在, 不存在极限.