



کانال اطلاع رسانی پیام نور لو توس

بروزترین اخبار و اطلاعیه های پیام نوری

نمونه سوالات بروز شده و هایلایت

فلش کارت ، خلاصه و نکات دروس

فایل سرچی، طلایی و اصلی کتب

لینک گروه های درسی ترم جاری

چارت، منابع، حذفیات و تاریخ امتحانات

برای عضویت اینجا کلیک کن





تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰ کد آزمون 134344 سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱(۱۰۱۰) اختلالات شخصیتی در این محور DSM-IV-TR آمده است.

محور ۱ (۱۰۱۰) 1 محور ۲ (۱۰۱۰) 2 محور ۳ (۱۰۱۰) 3 محور ۴ (۱۰۱۰) 4

۲(۱۰۱۰) در طبقه بندی قدیم اختلالات به دو دسته و تقسیم می کردند.

(۱۰۱۰)۱ عاداتی و خلقی (۱۰۱۰)۲ هیجانی و اجتماعی

(۱۰۱۰)۳ روان پریشی و روانزندی (۱۰۱۰)۴ روانزندی و شخصیت

۳(۱۰۱۰) در کدام الگو اضطراب به سه دسته واقعی، نروتیک و اخلاقی تقسیم شده است؟

(۱۰۱۰)۱ روان پویایی (۱۰۱۰)۲ زیست شناختی

(۱۰۱۰)۳ یادگیری (۱۰۱۰)۴ شناختی

۴(۱۰۱۰) اصطلاحات نظیر محرک و پاسخ شرطی و غیرشرطی از مفاهیم کدام الگو می باشد؟

(۱۰۱۰)۱ روان پویایی (۱۰۱۰)۲ زیست شناختی (۱۰۱۰)۳ شناختی (۱۰۱۰)۴ یادگیری

۵(۱۰۱۰) از ابعاد مصاحبه بالینی نمی باشد؟

(۱۰۱۰)۱ روان درمانی (۱۰۱۰)۲ رابطه (۱۰۱۰)۳ تکنیک (۱۰۱۰)۴ وضعیت روانی

۶(۱۰۱۰) براساس کدام ویژگی، رفتار به سه درجه اتفاقی، گذرا و پایدار تقسیم می شود؟

(۱۰۱۰)۱ فراوانی (۱۰۱۰)۲ تداوم (۱۰۱۰)۳ شدت (۱۰۱۰)۴ شایستگی سنی

۷(۱۰۱۰) براساس کدام اصل یک رفتار را می توان به عدم تداخل در فعالیت های فردی و اجتماعی تا تداخل در فعالیت های

فردی و اجتماعی تقسیم کرد؟

(۱۰۱۰)۱ فراوانی (۱۰۱۰)۲ تداوم (۱۰۱۰)۳ شدت (۱۰۱۰)۴ شایستگی سنی

۸(۱۰۱۰) کدام خصیصه نابهنجار در طبقه بندی درون ساخت ایکن باخ قرار ندارد؟

(۱۰۱۰)۱ تهوع (۱۰۱۰)۲ فوبی

(۱۰۱۰)۳ کناره گیری (۱۰۱۰)۴ دزدی

۹(۱۰۱۰) نسبت شیوع اختلالات حرکتی در دانش آموزان دختر و پسر چطور می باشد؟

(۱۰۱۰)۱ در دانش آموزان دختر بیشتر است (۱۰۱۰)۲ در دانش آموزان پسر بیشتر است

(۱۰۱۰)۳ از نظر شیوع در بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد (۱۰۱۰)۴ تابحال مطالعه صورت نگرفته است



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 134344

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰. (۱۰۱۰) کدام جمله در مورد اختلال زبان بیانی، درست است؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال زبان بیانی ناشی از رشد شایع تر است

۲ (۱۰۱۰) در کودکان زیر سه سال زیاد مشاهده نمی شود

۳ (۱۰۱۰) اختلال زبان بیانی اکتسابی شایع تر است

۴ (۱۰۱۰) در زمینه ذخیره لغات و استفاده از زمان های مناسب افعال، مشکل ندارند.

۱۱. (۱۰۱۰) زندگی در محیط دو یا چندزبانه می تواند از علل کدام اختلال باشد؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال واج شناختی

۲ (۱۰۱۰) اختلال در زبان بیانی

۳ (۱۰۱۰) اختلال آمیخته در زبان دریافتی - بیانی

۴ (۱۰۱۰) اختلال در زبان دریافتی

۱۲. (۱۰۱۰) افرادی که به این اختلال مبتلا هستند اغلب در برقراری ارتباط به شکل آسان، با سرعت مناسب و پیوسته ناتوان هستند؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال ارتباطی نامشخص

۲ (۱۰۱۰) اختلال در زبان بیانی

۳ (۱۰۱۰) اختلال آمیخته در زبان دریافتی - بیانی

۴ (۱۰۱۰) لکنت زبان

۱۳. (۱۰۱۰) کدام اختلالات، تنها زمانی در زمره اختلال محسوب می شوند که شدت بالای آنها، باعث مختل شدن پیشرفت تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی فرد شود؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال ارتباطی نامشخص

۲ (۱۰۱۰) اختلال در زبان بیانی

۳ (۱۰۱۰) اختلال آمیخته در زبان بیانی/دریافتی

۴ (۱۰۱۰) لکنت زبان

۱۴. (۱۰۱۰) در این اختلال، فرد مواد غیر غذایی می خورد اما با توجه به سن تقویمی او، انتظار نمی رود که این رفتارها را داشته باشد؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال روان بی اشتهایی

۲ (۱۰۱۰) اختلال پرخوری از نوع تخلیه ای

۳ (۱۰۱۰) اختلال پرخوری غیرتخلیه ای

۴ (۱۰۱۰) اختلال هرزه خواری

۱۵. (۱۰۱۰) کمبود آهن و روی می تواند عامل شکل گیری کدام اختلال باشند؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال روان بی اشتهایی از نوع محدود

۲ (۱۰۱۰) اختلال هرزه خواری

۳ (۱۰۱۰) اختلال پرخوری از نوع تخلیه ای

۴ (۱۰۱۰) اختلال پرخوری غیرتخلیه ای



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 134344

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۶ (۱۰۱۰) ویژگی اصلی این اختلال برگرداندن مکرر غذا به دهان و جویدن مجدد آن می باشد.

(۱۰۱۰)۱ اختلال نشخوار فکری مشترک (۱۰۱۰)۲ اختلال نشخوارگری

(۱۰۱۰)۳ اختلال پرخوری از نوع تخلیه ای (۱۰۱۰)۴ اختلال پرخوری غیر تخلیه ای

۱۷ (۱۰۱۰) این اختلال بیشتر در زنان بزرگسال مشاهده می شود.

(۱۰۱۰)۱ اختلال نشخوارگری مشترک (۱۰۱۰)۲ اختلال نشخوارگری

(۱۰۱۰)۳ اختلال روان بی اشتهایی (۱۰۱۰)۴ اختلال پرخوری غیر تخلیه ای

۱۸ (۱۰۱۰) کدام جمله در مورد اختلال پرخوری و روان بی اشتهایی درست نمی باشد؟

(۱۰۱۰)۱ مبتلایان به روان بی اشتهایی نسبت به مسائل جنسی یا جاذبه جنسی خیلی حساس هستند

(۱۰۱۰)۲ مبتلایان به اختلال پرخوری نسبت به مسائل جنسی یا جاذبه جنسی خیلی حساس هستند

(۱۰۱۰)۳ معمولا اختلال پرخوری بعد یک دوره رژیم غذایی سخت ایجاد می شود

(۱۰۱۰)۴ معمولا اختلال روان بی اشتهایی بعد یک دوره رژیم غذایی سخت ایجاد می شود

۱۹ (۱۰۱۰) کودکانی که ضریب هوشی نرمال دارند اما در یادگیری مهارت های خواندن و نوشتن مشکل دارند کودکان گفته می شوند.

(۱۰۱۰)۱ دیرآموز (۱۰۱۰)۲ ناتوان یادگیری (۱۰۱۰)۳ کندذهن (۱۰۱۰)۴ اوتیسم

۲۰ (۱۰۱۰) بنابر نظر برخی از متخصصان، کدام یک اصلی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس می باشد؟

(۱۰۱۰)۱ نارسایی در خواندن (۱۰۱۰)۲ نارسایی در نوشتن

(۱۰۱۰)۳ نارسایی در ریاضی (۱۰۱۰)۴ دوزبانگی

۲۱ (۱۰۱۰) این توانایی، پس از یادگیری سایر توانایی زبان در زبان آموزان شکل می گیرد.

(۱۰۱۰)۱ توانایی خواندن (۱۰۱۰)۲ توانایی گفتن (۱۰۱۰)۳ توانایی نوشتن (۱۰۱۰)۴ زبان غیرمادری

۲۲ (۱۰۱۰) به نظر می رسد ژن های لوسی موجود در کروموزوم های 2، 3، 6، 15 و 18 در شکل گیری این اختلال نقش دارند.

(۱۰۱۰)۱ نارسایی ذهنی (۱۰۱۰)۲ اختلال خواب (۱۰۱۰)۳ اختلال تغذیه (۱۰۱۰)۴ نارساخوانی

۲۳ (۱۰۱۰) در DSM-IV-TR، برای استفاده از اختلال بی اختیاری ادرار کودک باید چندسال سن داشته باشد؟

(۱۰۱۰)۱ حداقل 4 سال (۱۰۱۰)۲ حداقل 3 سال (۱۰۱۰)۳ حداقل 6 سال (۱۰۱۰)۴ حداقل 5 سال



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 134344

تعداد سوالات: تستی: ۲۸ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۴ (۱۰۱۰) در DSM-IV-TR، برای استفاده از اختلال بی اختیاری مدفوع کودک باید چندسال سن داشته باشد؟

- (۱۰۱۰)۱ حداقل ۴ سال (۱۰۱۰)۲ حداقل ۳ سال (۱۰۱۰)۳ حداقل ۶ سال (۱۰۱۰)۴ حداقل ۵ سال

۲۵ (۱۰۱۰) در DSM-IV-TR، اختلال رت و درخودماندگی، زیر مجموعه کدام اختلالات هستند؟

- (۱۰۱۰)۱ اختلالات شخصیت (۱۰۱۰)۲ اختلالات تغذیه ای
(۱۰۱۰)۳ اختلالات فراگیر رشدی (۱۰۱۰)۴ اختلالات ذهنی

۲۶ (۱۰۱۰) اولین بار کدام دانشمند از اصطلاح اوتیسم کودکی اولیه استفاده کرد؟


- (۱۰۱۰)۱ فروید (۱۰۱۰)۲ کانر (۱۰۱۰)۳ اسپرگر (۱۰۱۰)۴ آدلر

۲۷ (۱۰۱۰) کدام یک از نشانه های اصلی اختلال کم توجهی / بیش فعالی نمی باشد؟

- (۱۰۱۰)۱ رفتارهای ناپسند اجتماعی (۱۰۱۰)۲ نقص در توجه
(۱۰۱۰)۳ پرتحرکی (۱۰۱۰)۴ تکانشگری

۲۸ (۱۰۱۰) در DSM-IV-TR، اختلال مقابله جویانه و اختلال سلوک، زیر مجموعه کدام اختلالات هستند؟

- (۱۰۱۰)۱ اختلالات فراگیر رشدی (۱۰۱۰)۲ اختلالات ضداجتماعی
(۱۰۱۰)۳ اختلالات روان پریشی (۱۰۱۰)۴ اختلالات رفتار ایذایی



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ج	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	الف	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	ب	عادی
10	ج	عادی
11	الف	عادی
12	د	عادی
13	الف	عادی
14	د	عادی
15	ب	عادی
16	ب	عادی
17	ج	عادی
18	الف	عادی
19	ب	عادی
20	الف	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	د	عادی
24	الف	عادی
25	ج	عادی
26	ب	عادی
27	الف	عادی
28	د	عادی



سری سوال: یک ۱

کد آزمون 130759

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱(۱۰۱۰) اولین کتاب در زمینه مشکلات روان پزشکی کودکان توسط چه کسی نوشته شد؟

(۱۰۱۰)۱ توماس فیر (۱۰۱۰)۲ استانلی هال (۱۰۱۰)۳ آدولف مایر (۱۰۱۰)۴ بنیامین راش

۲(۱۰۱۰) چرا تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان پیچیده تر از بزرگسالان است؟

(۱۰۱۰)۱ زیرا مشکلات کودکان بیشتر از بزرگسالان است (۱۰۱۰)۲ زیرا کودک موجودی در حال تحول است
(۱۰۱۰)۳ زیرا مشکلات بزرگسالان بیشتر از کودکان است (۱۰۱۰)۴ زیرا بزرگسال موجودی در حال تحول است

۳(۱۰۱۰) آزمون وکسلر جزء کدام دسته از آزمونهای تشخیصی برای ارزیابی شخصیت کودک است؟

(۱۰۱۰)۱ آزمونهای شناختی (۱۰۱۰)۲ آزمونهای شنوایی
(۱۰۱۰)۳ آزمونهای پیشرفت تحصیلی (۱۰۱۰)۴ آزمونهای ادراکی بینایی

۴(۱۰۱۰) کودکان مبتلا به این نشانگان در یادگیری و انجام یک فعالیت حرکتی که از آنها انتظار می رود بی کفایتی از خود نشان می دهند؟

(۱۰۱۰)۱ اتیسم (۱۰۱۰)۲ بیش فعالی
(۱۰۱۰)۳ اختلال رشد هماهنگی (۱۰۱۰)۴ عقب ماندگی ذهنی

۵(۱۰۱۰) در این دسته از کودکان ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات پایین تر از حد مورد انتظار است؟ کودکان مبتلا به:

(۱۰۱۰)۱ اختلال در زبان بیانی (۱۰۱۰)۲ بیش فعالی
(۱۰۱۰)۳ لکنت زبان (۱۰۱۰)۴ مشکلات شنوایی

۶(۱۰۱۰) تست باطری برای تشخیص کدام اختلال در کودکان کاربرد دارد؟

(۱۰۱۰)۱ اختلال شنیداری (۱۰۱۰)۲ اختلال دیداری
(۱۰۱۰)۳ اختلال رشد هماهنگی (۱۰۱۰)۴ اختلال زبان بیانی

۷(۱۰۱۰) در کدام تکلیف مداخله ای برای کودکان مبتلا به لکنت، اساس مداخله درمانی بر محو لکنت نیست؟

(۱۰۱۰)۱ استفاده از گروه همیاری (۱۰۱۰)۲ مداخله تعدیلی
(۱۰۱۰)۳ استفاده از دستگاه الکترونیکی (۱۰۱۰)۴ شرطی سازی عامل

۸(۱۰۱۰) در دوره خردسالی اختلال هرزه خواری در کدام دسته از کودکان شایع است؟

(۱۰۱۰)۱ کودکان مبتلا به تأخیر در رشد اجتماعی و گفتاری (۱۰۱۰)۲ کودکان مبتلا به اختلال دیداری
(۱۰۱۰)۳ کودکان مبتلا به اختلال شنیداری (۱۰۱۰)۴ کودکان مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی



۹ (۱۰۱۰) این کودکان معمولاً تماس عاطفی کمتری نشان می دهند و تماس منفی در آنها بیشتر است؟

۱ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال هرزه خواری

۲ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال نشخواری

۳ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال بی اشتها بی عصبی

۴ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال تغذیه ای در شیرخوارگی یا اوایل کودکی

۱۰ (۱۰۱۰) در کدام اختلال الگوهای خاص در مدارا به غذا وجود دارد؟

۱ (۱۰۱۰) پراشتهای عصبی ۲ (۱۰۱۰) بی اشتها بی عصبی ۳ (۱۰۱۰) نشخواری ۴ (۱۰۱۰) هرزه خواری

۱۱ (۱۰۱۰) سیر و پیش آگهی بی اشتها بی روانی چگونه است؟

۱ (۱۰۱۰) نیمی از مبتلایان بهبودی کامل، تقریباً ۳۰ درصد بهبودی جزئی و ۲۰ درصد بهبودی پایدار می یابند

۲ (۱۰۱۰) نیمی از مبتلایان بهبودی کامل می یابند، تقریباً ۲۰ درصد بهبودی جزئی و ۳۰ درصد بهبودی پایدار نشان می دهند

۳ (۱۰۱۰) ۳۰ درصد از مبتلایان بهبودی کامل می یابند، تقریباً نیمی بهبودی جزئی و ۲۰ درصد بهبودی پایدار نشان می دهند

۴ (۱۰۱۰) ۳۰ درصد از مبتلایان بهبودی کامل می یابند، تقریباً ۲۰ درصد بهبودی جزئی و نیمی بهبودی پایدار نشان می دهند

۱۲ (۱۰۱۰) کدام اختلال تغذیه ای نوجوانان در جریان یک دوره رژیم سخت غذایی بروز می کند؟

۱ (۱۰۱۰) بی اشتها بی روانی ۲ (۱۰۱۰) نشخواری

۳ (۱۰۱۰) هرزه خواری ۴ (۱۰۱۰) پر خوری و بی اشتها بی روانی

۱۳ (۱۰۱۰) بیشترین مطالعات پژوهشی در مورد تأثیر کدام درمان بر اختلال پر خوری صورت گرفته است؟

۱ (۱۰۱۰) درمان شناختی رفتاری ۲ (۱۰۱۰) درمان بین فردی

۳ (۱۰۱۰) درمان دیالکتیک ۴ (۱۰۱۰) درمان روان پوشی

۱۴ (۱۰۱۰) بنا بر نظر متخصصان این مشکل اساسی ترین عامل شکست در مدارس به حساب می آید؟

۱ (۱۰۱۰) عقب ماندگی ذهنی ۲ (۱۰۱۰) اختلال در ریاضی

۳ (۱۰۱۰) نارساخوانی ۴ (۱۰۱۰) اختلال در زبان بیانی

۱۵ (۱۰۱۰) کدام دسته از کودکان در نوشتن انشاء نمی توانند کلمات و عبارات متنوع و پر مفهوم را استفاده کنند؟

۱ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال در زبان بیانی ۲ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال در بیان نوشتاری

۳ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال نارسایی آواشناختی ۴ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال نارسایی در خواندن



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 130759

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۶) (۱۰۱۰) در این اختلال کودک در تولید گفتار و تلفظ اصوات گفتاری دچار مشکل است؟

(۱۰۱۰)۱ لکنت زبان (۱۰۱۰)۲ نارسایی در بیان نوشتاری

(۱۰۱۰)۳ نارسایی در زبان بیانی (۱۰۱۰)۴ نارسایی آواشناختی

۱۷) (۱۰۱۰) کدام درمانگران روش تمرین منفی را برای درمان لکنت زبان مطرح نموده‌اند؟

(۱۰۱۰)۱ خانواده درمانگران (۱۰۱۰)۲ روانکاوان (۱۰۱۰)۳ رفتارگرایان (۱۰۱۰)۴ بازی درمانگران

۱۸) (۱۰۱۰) تشخیص گذاری اختلال بی‌اختیاری ادرار چگونه است؟

(۱۰۱۰)۱ حداقل ۲ بار در هفته به مدت لااقل ۳ ماه در کودکان کمتر از ۵ سال

(۱۰۱۰)۲ حداقل ۲ بار در هفته به مدت لااقل ۶ ماه در کودکان کمتر از ۵ سال

(۱۰۱۰)۳ حداقل ۲ بار در هفته به مدت لااقل ۶ ماه در کودکان ۵ سال و بیشتر

(۱۰۱۰)۴ حداقل ۲ بار در هفته به مدت لااقل ۳ ماه در کودکان ۵ سال و بیشتر

۱۹) (۱۰۱۰) کدام گزینه زیر در مورد سبب‌شناسی بی‌اختیاری ادرار صحیحی است؟

(۱۰۱۰)۱ از عوامل مؤثر در این اختلال مشکلات روان‌شناختی و عاطفی است

(۱۰۱۰)۲ از پیامدهای این اختلال مشکلات روان‌شناختی و عاطفی است

(۱۰۱۰)۳ نرخ بروز این اختلال در دوقلوهای یک‌تخمکی کمتر از دو تخمکی است.

(۱۰۱۰)۴ این اختلال نمی‌تواند علت ژنتیکی داشته باشد.

۲۰) (۱۰۱۰) چه کسی واژه "اتیسم اولیه کودکی" را به کار برد؟

(۱۰۱۰)۱ کانر (۱۰۱۰)۲ کراپلین (۱۰۱۰)۳ بلولر (۱۰۱۰)۴ اسپرگر

۲۱) (۱۰۱۰) مهم‌ترین ملاک برای تشخیص اختلال در خودماندگی کدام است؟

(۱۰۱۰)۱ انحراف عمده در رشد زبان (۱۰۱۰)۲ رفتار خود جرحی رفتار خود جرحی

(۱۰۱۰)۳ اختلال توجه (۱۰۱۰)۴ مشکلات تحصیلی

۲۲) (۱۰۱۰) اگر یک کودک در خودمانده هنگام ترسیدن به جای گریه کردن بخندد کدام ویژگی این اختلال را نشان می‌دهد؟

(۱۰۱۰)۱ مشکل در رفتار اجتماعی (۱۰۱۰)۲ مشکل در زبان

(۱۰۱۰)۳ عاطفه نامناسب (۱۰۱۰)۴ نابهنجاری در پاسخ به محیط فیزیکی



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 130759

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۳ (۱۰۱۰) مهم ترین ملاک برای تشخیص افتراقی اختلال در خودماندگی از اختلال از هم پاشیدگی کودکی در زبان دریافتی بیانی کدام است؟

۱ (۱۰۱۰) کودکان دارای اختلال از هم پاشیدگی کودکی در زبان دریافتی بیانی در چند سال اول زندگی طبیعی هستند و سپس زبان بیانی ادراکی خود را از دست می دهند

۲ (۱۰۱۰) کودکان دارای اختلال از هم پاشیدگی کودکی در زبان دریافتی بیانی در چند سال اول زندگی دچار مشکل هستند و سپس زبان بیانی ادراکی خود را به دست می آورند

۳ (۱۰۱۰) هر دو گروه در زبان دریافتی بیانی در سال های اول عمر طبیعی هستند

۴ (۱۰۱۰) هر دو گروه در زبان دریافتی بیانی در سال های اول عمر طبیعی دچار مشکل هستند.

۲۴ (۱۰۱۰) تئوری وجود مادران یخچالی برای کدام دسته از اختلالات فراگیر رشد کاربرد داشته است؟

۱ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال اسپرگر

۲ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال در خودماندگی (اتیسم)

۳ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال رت

۴ (۱۰۱۰) کودکان مبتلا به اختلال از هم پاشیدگی کودکی

۲۵ (۱۰۱۰) این اختلال از طریق جهش هایی در ژن گردانی پروتئین متیل سی پی جی ایجاد می شود؟

۱ (۱۰۱۰) اختلال اسپرگر

۲ (۱۰۱۰) اختلال در خودماندگی

۳ (۱۰۱۰) اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی

۴ (۱۰۱۰) اختلال رت

۲۶ (۱۰۱۰) سعید بدون اینکه از نظر شناختی اختلال داشته باشد در نظم دادن به کارها با مشکل مواجه می شود. این ویژگی کدام یک از نشانه های اختلال بیش فعالی/کمبود توجه هست؟

۱ (۱۰۱۰) بیش فعالی

۴ (۱۰۱۰) بی قراری

۳ (۱۰۱۰) تکانش گری

۲ (۱۰۱۰) بی توجهی

۲۷ (۱۰۱۰) علائم اختلال کم توجهی/بیش فعال از نظر رشدی در چه سنی قابل شناسایی و تشخیص است؟

۱ (۱۰۱۰) قبل از ۷ سالگی

۲ (۱۰۱۰) قبل از ۸ سالگی

۳ (۱۰۱۰) ابتدای سنین مدرسه

۴ (۱۰۱۰) تا نوجوانی

۲۸ (۱۰۱۰) برای افراد بالای ۱۸ سال چه هنگام تشخیص اختلال سلوک داده می شود؟

۱ (۱۰۱۰) که با ملاک های اختلالات خلقی مطابقت نداشته باشد

۲ (۱۰۱۰) که با ملاک های اختلالات خلقی مطابقت داشته باشد

۳ (۱۰۱۰) که با ملاک های شخصیت ضد اجتماعی مطابقت نداشته باشد

۴ (۱۰۱۰) که با ملاک های شخصیت ضد اجتماعی مطابقت داشته باشد



سری سوال: ۱ یک

کد آزمون 130759

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۹ (۱۰۱۰) این اختلال شامل الگوی پایداری از رفتارهای منفی گرایانه، خصومت آمیز و گستاخانه است.

۲ (۱۰۱۰) اختلال سلوک

۱ (۱۰۱۰) اختلال بیش فعالی/نقص توجه

۴ (۱۰۱۰) اختلال نافرمانی مقابله‌ای

۳ (۱۰۱۰) اختلال بی‌نظمی خلق اخلاک‌گر

۳۰ (۱۰۱۰) نظریه روانکاوی کلاسیک علت کدام اختلال را وجود تعارضات حل نشده دوره مقعدی می‌داند؟

۲ (۱۰۱۰) اختلال سلوک

۱ (۱۰۱۰) اختلال بیش فعالی/نقص توجه

۴ (۱۰۱۰) اختلال نافرمانی مقابله‌ای

۳ (۱۰۱۰) اختلال بی‌نظمی خلق اخلاک‌گر

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	الف	1
عادی	ب	2
عادی	الف	3
عادی	ج	4
عادی	الف	5
عادی	د	6
عادی	ب	7
عادی	الف	8
عادی	د	9
عادی	ب	10
عادی	الف	11
عادی	د	12
عادی	الف	13
عادی	ج	14
عادی	ب	15
عادی	د	16
عادی	ج	17
عادی	د	18
عادی	ب	19
عادی	الف	20
عادی	الف	21
عادی	ج	22
عادی	الف، ب، ج، د	23
عادی	ب	24
عادی	د	25

عادی	ج	26
عادی	الف	27
عادی	ج	28
عادی	د	29
عادی	د	30

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰

رشته تحصیلی / کد درس : روانشناسی، ۱۲۱۷۲۴۳

۱۳) مدت زمان لازم برای تشخیص پر خوری روانی کدام گزینه می باشد؟

۱۴ (۱۰۱۰) به نظر برخی از متخصصین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام گزینه می باشد؟

۱۵) دیسلکسی مربوط به کدام گزینه می باشد؟

[illegible]

اختلال دریافتی، ۲ (۱۰۱۰) اختلال بیانی، ۳ (۱۰۱۰) لکنت زبان، ۴ (۱۰۱۰) واج شناختی

۱۷ (۱۰۱۰) بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چند سالگی برآورد شده است؟

$$2 \text{ (1.1.1)f} \qquad 7 \text{ (1.1.1)r} \qquad 5 \text{ (1.1.1)r} \qquad 3 \text{ (1.1.1)r}$$

۱۸ (۱۰۱۰) سن تقویمی برای بی اختیاری ادرار چند سالگی است؟

$$2 \quad (1,1,1) \text{ f} \qquad 3 \quad (1,1,1) \text{ r} \qquad 4 \quad (1,1,1) \text{ r} \qquad 5 \quad (1,1,1) \text{ r}$$

۱۹ (۱۰۱۰) مدت زمان لازم برای تشخیص بی اختیاری مدفوع می باشد؟
 یک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال
 یک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال بانک سوال
 ۱۲ (۱۰۰۱) ماه ۲ (۱۰۰۲) ماه ۳ (۱۰۰۳) ماه ۴ (۱۰۰۴) ماه 6 ماه

۲۰ (۱۰۱۰) PDD مربوط به کدام اختلالات می باشد؟

۱) یادگیری ۲) عقب ماندگی ذهنی ۳) فراگیر رشد ۴) ارتباطی

۲۱ (۱۰۱۰) اختلال رت مربوط به کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۱) (۱۰۱۰) فراگیر رشد ۲) (۱۰۱۰) اضطرابی ۳) (۱۰۱۰) خلقی ۴) (۱۰۱۰) ارتباطی

۲۲ (۱۰۱۰) کدام یک از افراد زیر برای اولین بار کلمه اوتیسم را در فرهنگ انگلیسی به کار برد؟

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	الف	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	د	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	ج	عادی
20	ج	عادی
21	الف	عادی
22	ب	عادی
23	الف	عادی
24	د	عادی
25	د	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	ج	عادی
29	الف	عادی

عادی	الف	30
------	-----	----

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- در چه سالی آموزش عمومی برای کودکان اجباری شد؟

۱. ۱۹۱۶ ۲. ۱۹۲۰ ۳. ۱۹۳۸ ۴. ۱۹۷۵

۲- کدام یک از موارد زیر جزو اختلالات خلقی می باشد؟

۱. بد رفتاری ۲. کج خلقی ۳. انگشت مکیدن ۴. عدم کنترل ادرار

۳- به اعتقاد چه کسی، نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. راتر ۲. دالارد ۳. بندورا ۴. آلبرت ایس

۴- جدا سازی - عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری - شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است؟

۱. مصاحبه ۲. سنجش ۳. مشاهده ۴. مذاکره

۵- کدام اصل بر این نکته تاکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۱. اصل شایستگی سنی ۲. اصل شدت یک رفتار ۳. اصل تداوم یک رفتار ۴. اصل فراوانی یک رفتار

۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ی ثبات و بایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۱. شدت ۲. فراوانی ۳. تداوم ۴. ترتیب

۷- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه های آموزش جسمانی و حسی میباشد؟

۱. درمان اختلال رشد هماهنگی ۲. درمان رشد روانی ۳. درمان رشد اجتماعی ۴. درمان رشد اختصاصی

۸- در کدام اختلال، تولید صداهای تکلمی با سطح رشدی و تکاملی کودک متناسب نیست؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال واج شناختی ۳. اختلال در زبان بیانی ۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۹- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست؟

۱. تکرار اصوات ۲. نقص در تلفظ ۳. مشکل در فهم مکالمات ۴. ذخیره محدود واژگان

۱۰- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۱. شکل ظاهری ۲. برقراری ارتباط ۳. بی خوابی ۴. تغذیه

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- کدام یک از تکنیک های درمان لکنت بر اساس شرطی سازی عاملی استوار است ؟

۱. دارودرمانی
۲. درمان تعدیلی لکنت
۳. استفاده از دستگاه الکترونیکی
۴. درمان آموزش سلیس و روان صحبت کردن

۱۲- در کدام یک از روش های درمان هرزه خواری ، تقویت منفی و تقویت مثبت مورد استفاده قرار می گیرد ؟

۱. روش محیطی
۲. روش رفتاری
۳. راهنمایی خانوادگی
۴. روش های روانی و اجتماعی

۱۳- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار به معنای کدام مورد زیر است؟

۱. شیوع
۲. هرزه خواری
۳. سبب شناسی
۴. پرخوری

۱۴- کدامیک از موارد زیر بر حسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص میشود ؟

۱. پرخوری
۲. هرزه خواری
۳. شیوع
۴. بی اشتهایی روانی

۱۵- دیسلکسی نام دیگر کدام اختلال است ؟

۱. خوانش پریشی
۲. عقب ماندگی خواندن
۳. اختلال ویژه در خواندن
۴. اختلال مرتبط به رشد در خواندن

۱۶- بیشترین میزان وقوع نارسایی لکنت زبان در چه سنی برآورد شده است ؟

۱. ۲
۲. ۵
۳. ۷
۴. ۹

۱۷- نارسایی آوا شناختی در بردارنده ی خطاهایی در کدام مورد زیر است؟

۱. تولید کمی
۲. تولید کیفی
۳. تولید آوا(واج)
۴. تولید ثانویه

۱۸- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چند سالگی اتفاق می افتد ؟

۱. بین یک تا سه سالگی
۲. بین ده تا پانزده سالگی
۳. بین دو تا چهار سالگی
۴. بین دو تا هفت سالگی

۱۹- میزان شیوع بی اختیاری ادرار برای ۱۰ سالگی چقدر است ؟

۱. ۱ تا ۳ درصد
۲. ۳ الی ۵ درصد
۳. ۵ الی ۱۰ درصد
۴. ۱۰ الی ۱۲ درصد

۲۰- احساس دوست داشتن و اعتماد به نفس از فواید کدام نوع درمان در درمان درخودماندگی است ؟

۱. ماساژ درمانی
۲. انزجار درمانی
۳. حیوان درمانی
۴. موسیقی درمانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- شروع اختلال رت تا پیش از چه سنی می باشد ؟

۱. یک سالگی ۲. دو سالگی ۳. سه سالگی ۴. چهار سالگی

۲۲- کدامیک از موارد زیر در یک دسته ی بزرگتری به نام اختلالهای عادت و خوردن قرار دارند ؟

۱. اختلالهای دفع ۲. اختلالهای یادگیری ۳. اختلالهای اجتماعی ۴. اختلالهای اختصاصی

۲۳- اکثر کودکان کنترل مثانه را بین کدام سن زیر به دست می آورند ؟

۱. یک تا دوسالگی ۲. هفت سالگی ۳. بین دو تا سه سالگی ۴. ده سالگی

۲۴- کدامیک از موارد زیر میتواند به صورت اولیه و ثانویه باشد ؟

۱. پرخوری ۲. کم خوری ۳. یادگیری ۴. بی اختیاری ادراری

۲۵- از ویژگی های کدام اختلال ، آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است ؟

۱. اختلال رت ۲. اختلال اسپرگر ۳. اختلال درخودماندگی ۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۲۶- اوتیسم جزء در کدامیک از اختلالات زیر می باشد ؟

۱. اختلال یادگیری ۲. اختلال رشد ۳. اختلال روانی ۴. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۲۷- جدی ترین مشکل کودکان در اختلال کم توجهی / بیش فعالی کدام یک از موارد زیر است ؟

۱. بی توجهی ۲. بیش فعالی ۳. تکانش گری ۴. جنب و جوش بیش از حد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۸- علائم مربوط به رفتارهای تکراری و تشریفاتی در خصوص کودکان در خودمانده به کدام صورت زیر است؟

۱. با گذشت زمان بهبود نمی یابند
۲. با گذشت زمان خوب میشوند
۳. با گذشت زمان ارتباطی ندارد
۴. هنوز مطالعه نشده است

۲۹- اختلال آسبرگر از زیر مجموعه های کدامیک از موارد زیر است؟

۱. اختلال اولیه
۲. اختلال فراگیر رشدی
۳. اختلال ثانویه
۴. اختلال کلی

۳۰- کودکان مبتلا به کدام اختلال، معمولاً با بزرگترها جر و بحث می کنند، از کوره در می روند و خشمگین می شوند؟

۱. اختلال سلوک
۲. اختلال رفتار ایدایی
۳. اختلال نافرمانی مقابله جویانه
۴. اختلال کم توجهی / بیش فعالی

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	ج	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	الف	عادی
8	ج	عادی
9	ب	عادی
10	ب	عادی
11	د	عادی
12	ب	عادی
13	ب	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	ج	عادی
18	د	عادی
19	ب	عادی
20	ج	عادی
21	د	عادی
22	الف	عادی
23	ج	عادی
24	د	عادی
25	ب	عادی
26	د	عادی
27	الف	عادی
28	الف	عادی
29	ب	عادی
30	ج	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط انجمن روان پزشکی امریکا در چه سالی منتشر شد؟

۱. ۱۹۶۸ ۲. ۱۹۵۲ ۳. ۱۹۸۰ ۴. ۱۹۸۷

۲- طبق دی اس ام فور تجدید نظر شده ، تشخیص اختلال شخصیت در کدام محور قرار دارد؟

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۳- طبق نظریه فروید کدام گزینه در ایجاد بیماریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

۱. استرس ۲. اضطراب ۳. ترس ۴. ترس مرضی

۴- شرطی شدن کلاسیک و عامل ، مربوط به کدام الگو می باشد؟

۱. یادگیری ۲. شناختی ۳. روان پویایی ۴. زیست شناختی

۵- مهم ترین ابراز سنجش ، مداخله و ارزیابی می باشد؟

۱. مشاهده ۲. آزمون های روانی ۳. مصاحبه ۴. آزمون های عصب روان شناختی

۶- کدام اصل ، نشان دهنده ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۱. اصل تداوم ۲. اصل شدت ۳. اصل فراوانی ۴. اصل شایستگی سنی

۷- کدام اختلال جزء اختلالات فراگیر رشد می باشد؟

۱. سلوک ۲. لکنت زبان ۳. رت ۴. لالی انتخابی

۸- مهمترین مشکل این کودکان ، نقص در برقراری ارتباط می باشد؟

۱. دارای اختلال یادگیری ۲. اوتیسم ۳. بیش فعالی ۴. افسرده

۹- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی می باشد؟

۱. نقص در ادراک ۲. نقص در رفتار ۳. نقص در تلفظ ۴. نقص در شناخت

۱۰- این اختلال نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل ۱ماه می باشد؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوارگی ۳. خوردن نامعین ۴. پر خوری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- برخی از متخصصین بر این عقیده اند که هیچ درمان قطعی برای این اختلال وجود ندارد و درمان بیشتر معطوف به آموزش و تعدیل رفتاری است؟

۱. اوتیسم ۲. ADHD ۳. ODD ۴. هرزخواری

۱۲- اختلال نشخوار عموماً پس از چند ماهگی شروع می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی ۲. ۱۵ ماهگی ۳. ۳ ماهگی ۴. ۶ ماهگی

۱۳- بر اساس معیارهای انجمن روان پزشکی امریکا ، تشخیص بی اشتهایی روانی موکول به این است که وزن شخص چند درصد کمتر از حداقل وزن طبیعی فرد باشد؟

۱. ۵۰ درصد ۲. ۴۵ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۱۵ درصد

۱۴- در بیان علل زیستی ، اختلالات تغذیه ، نقص اساسی در وظیفه کدام گزینه می باشد؟

۱. هیپوفیز ۲. تالاموس ۳. هیپوتالاموس ۴. سیستم لیمبیک

۱۵- موثرترین روش درمانی در مورد پر خوری شناخته شده است؟

۱. رفتار درمانی ۲. درمان شناختی رفتاری ۳. دارو درمانی ۴. هیپنوتیزم

۱۶- مبتلایان به کدام اختلال روانی نسبت به مسائل جنسی بی تفاوت هستند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پر اشتهایی روانی ۳. پر خوری ۴. نشخوار

۱۷- نارسایی های یادگیری را بر خلاف تقسیم بند های سنتی ، می توانیم به چند دسته کلی تقسیم کنیم؟

۱. ۲ ۲. ۴ ۳. ۶ ۴. ۳

۱۸- در خود ماندگی ، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. نوشتن ۲. خوردن ۳. اوتیسم ۴. خواندن

۱۹- کدام گزینه عامل اساسی شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نوشتن ۲. ریاضی ۳. خواندن ۴. شنیدن

۲۰- خوانش پریشی ، مربوط به نقایص کارکردی در کدام لوب های مغزی می باشد؟

۱. آهیانه ای - گیجگاهی ۲. پیشانی - آهیانه ای ۳. آهیانه ای - پس سری ۴. پیشانی - پس سری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- دیسکلکولی، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. خواندن ۲. نوشتن ۳. ریاضی ۴. زبان

۲۲- اختلال در تولید گفتار، نام دیگر کدام اختلال می باشد؟

۱. زبان بیانی ۲. زبان دریافتی ۳. لکنت زبان ۴. آواشناختی

۲۳- مدت زمان لازم برای تشخیص بی اختیاری ادرار می باشد؟

۱. ۱ ماه ۲. ۳ ماه ۳. ۶ ماه ۴. ۱۲ ماه

۲۴- حداقل سن تقویمی برای تشخیص بی اختیاری دفع می باشد؟

۱. ۳ ۲. ۵ ۳. ۲ ۴. ۴

۲۵- مهمترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری، مربوط به کدام شرطی شدن می باشد؟

۱. عامل ۲. ابزاری ۳. کنشگر ۴. کلاسیک

۲۶- لئو کانر در مورد کدام اختلال مطالبی را ارائه داده است؟

۱. افسردگی ۲. اوتیسم ۳. یادگیری ۴. کنترل تکانه

۲۷- مادران یخچالی، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اوتیسم ۲. رت ۳. آسپرگر ۴. ازهم پاشیدگی کودکی

۲۸- استفاده از کدام دارو نشانه های رفتاری اختلال اوتیسم را کاهش می دهد؟

۱. ریتالین ۲. هاوپردول ۳. کلوزاپین ۴. کلرزومازین

۲۹- شاید بتوان گفت که یکی از بیشترین ویتامین های استفاده شده برای کودکان در خود ماده می باشد؟

۱. E ۲. D ۳. B ۴. A

۳۰- تکانش گری جزء نشانه های کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال سلوک ۲. اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ۳. اختلال بی اعتنایی مقابله ای ۴. اختلال ضد اجتماعی

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ب	1
عادی	الف	2
عادی	ب	3
عادی	الف	4
عادی	ج	5
عادی	الف	6
عادی	ج	7
عادی	ب	8
عادی	ج	9
عادی	الف	10
عادی	د	11
عادی	ج	12
عادی	د	13
عادی	ج	14
عادی	ب	15
عادی	الف	16
عادی	د	17
عادی	ج	18
عادی	ج	19
عادی	الف	20
عادی	ج	21
عادی	د	22
عادی	ب	23
عادی	د	24
عادی	د	25
عادی	ب	26
عادی	الف	27
عادی	ب	28
عادی	ج	29
عادی	ب	30

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- ارزیابی محیط اجتماعی فرد مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. ۱ ۲. ۲ ۳. ۳ ۴. ۴

۲- در این رویکرد مفاهیمی همچون اضطراب ، ناخود آگاه و مکانیزم های دفاعی روانی از مفاهیم کلیدی محسوب می شوند؟

۱. الگوی روان پویایی ۲. الگوی زیست شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی شناختی

۳- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر مربوط به کدام نوع اضطراب می باشد؟

۱. اخلاقی ۲. نوروتیک ۳. واقعی ۴. اساسی

۴- کدام یک از الگوهای زیر به فرایندهای ذهنی تاکید دارد؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی زیست شناختی ۳. الگوی انسان گرایی ۴. الگوی شناختی

۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء ابعاد مصاحبه است؟

۱. ارزیابی ۲. وضعیت روانی ۳. طبقه بندی ۴. سبب شناسی

۶- این اصل به تعداد و میزان انجام یک رفتار مربوط می شود؟

۱. اصل تداوم ۲. اصل شدت ۳. اصل فراوانی ۴. اصل شایستگی سنی

۷- نخستین طبقه بندی DSM در چه سالی به چاپ رسید؟

۱. ۱۹۶۸ ۲. ۱۹۵۲ ۳. ۱۹۸۰ ۴. ۱۹۹۴

۸- ویژگی اصلی این اختلال ، نقص در تلفظ است؟

۱. اختلال بیانی ۲. اختلال دریافتی ۳. اختلال دریافتی - بیانی ۴. اختلال واج شناختی

۹- تکنیک تنفس دیافراگمی برای کدام یک از اختلال ها کاربرد دارد؟

۱. اوتیسم ۲. لکنت زبان ۳. اختلال بیانی ۴. بیش فعالی

۱۰- هرزه خواری نوعی خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل چند ماه توصیف شده است؟

۱. ۱ ماه ۲. ۳ ماه ۳. ۶ ماه ۴. ۱ سال

۱۱- ویژگی اصلی این اختلال ، برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده ای و نشخوار طولانی ان است؟

۱. هرزه خواری ۲. بی اشتهاهی عصبی ۳. نشخوار ۴. پر اشتهاهی عصبی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- چکاندن آب لیمو در درمان این اختلال می تواند مفید باشد؟

۱. نشخوار ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهاهی عصبی ۴. بینج ایتینگ

۱۳- bulimia nervosa مربوط به کدام اختلال است؟

۱. بی اشتهاهی عصبی ۲. پر خوری ۳. هرزه خواری ۴. نشخوار

۱۴- کدام یک از گزینه های زیر عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نوشتن ۲. ریاضی ۳. خواندن ۴. املاء

۱۵- دیسلکسی مربوط به کدام گزینه است؟

۱. مشکل در نوشتن ۲. مشکل در خواندن ۳. مشکل در ریاضی ۴. مشکل در املاء

۱۶- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چند سالگی برآورد کرده اند؟

۱. 5 ۲. 3 ۳. 7 ۴. 2

۱۷- برای تشخیص گذاری بی اختیاری ادرار حداقل چند بار در هفته باید اتفاق بیافتد؟

۱. 1 ۲. 2 ۳. 3 ۴. 4

۱۸- مهمترین برنامه درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری چیست؟

۱. دارو درمانی ۲. شناخت درمانی ۳. رفتار درمانی ۴. بازی درمانی

۱۹- کدام یک از اختلال های زیر جزء اختلالات فراگیر رشد می باشد؟

۱. آسپرگر ۲. بیش فعالی ۳. سلوک ۴. لکنت زبان

۲۰- والدین سرد مربوط به کدام اختلال است؟

۱. بی اعتنائی مقابله ای ۲. ارتباطی ۳. اوتیسم ۴. فوبی

۲۱- کدام یک از داروها می تواند نشانه های رفتاری اوتیسم را کاهش دهد؟

۱. ایمی پرامین ۲. سرتالین ۳. لورازپام ۴. هالو پریدول

۲۲- کدام یک از اختلال های زیر بیشتر در دختران دیده می شود؟

۱. رت ۲. اوتیسم ۳. آسپرگر ۴. از هم پاشیدگی کودکی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۳- در بیشتر موارد ، اولین مشکل آشکار کودکان مبتلا به کمبود توجه و بیش فعالی کدام گزینه می باشد؟

۱. بیش فعالی ۲. کمبود توجه ۳. تکانشگری ۴. اضطراب

۲۴- رفتار بدون فکر مربوط به کدام گزینه است؟

۱. تکانشگری ۲. اضطراب ۳. افسردگی ۴. کمبود توجه

۲۵- در ADHD آخرین علامتی که بر طرف می شود، چیست؟

۱. پر تحرکی ۲. حواس پرتی ۳. تکانشگری ۴. اضطراب

۲۶- داروهای محرک برای کدام اختلال کاربرد دارد؟

۱. افسردگی ۲. مانیا ۳. اضطرابی ۴. کمبود توجه و بیش فعالی

۲۷- مشخصه اصلی این اختلال ، الگوی پایداری از رفتارمنفی کارانه ، و رفتار خصومت آمیز نسبت به صاحبان قدرت میباشد؟

۱. CD ۲. ODD ۳. ADHD ۴. MDD

۲۸- نشانه های اختلال بی اعتنایی مقابله ای باید چند ماه تداوم داشته باشد؟

۱. 6 ۲. 3 ۳. 1 ۴. 8

۲۹- شروع قبل از 30 ماهگی ، رشد اجتماعی ناقص ، رشد زبان با تاخیر ، مربوط به کدام اختلال است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اوتیسم ۳. افسردگی ۴. اختلال یادگیری

۳۰- مدت زمان برای تشخیص بی اختیاری دفع چقدر می باشد؟

۱. 1 ماه ۲. 2 ماه ۳. 3 ماه ۴. 4 ماه

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	د	عادی
9	ب	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	الف	عادی
13	ب	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	الف	عادی
17	ب	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	ج	عادی
21	د	عادی
22	الف	عادی
23	الف	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی
26	د	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	ب	عادی
30	ج	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویلیام هیلی ۲. ترمن ۳. ویتمر ۴. آلفرد بینه

۲- در این دیدگاه، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار
۳. بهنجاری به منزله سلامت ۴. بهنجاری به منزله فرآیندی آماری

۳- اختلال مزمنی است که مشخصه اصلی آن اضطراب می باشد؟

۱. روان نژادی ۲. روان پریشی ۳. روان گسسته ۴. اختلالات روانی

۴- از نظر فروید، اضطرابی که از عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من-نهاد-من برتر ایجاد می شود؟

۱. واقعی ۲. رویایی ۳. نروتیک ۴. اخلاقی

۵- از نظر باندورا، نبود آن علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. سلامت روانی ۲. انگیزه پیشرفت ۳. خویشتن داری ۴. ارتباط با دیگران

۶- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان است؟

۱. آزمون استاندارد ۲. مصاحبه بالینی ۳. مشاوره روانشناختی ۴. DSM IV

۷- این ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تشخیص ۲. تکنیک ۳. وضعیت روانی ۴. رابطه

۸- در سنجش رفتاری، از آن به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

۱. مشاهده ۲. رفتار ۳. روابط ۴. کارکرد اجتماعی

۹- این اختلال یک توضیح عمومی برای مشکلات مهارت های فیزیکی می باشد؟

۱. اختلالات جدی حرکتی ۲. اختلال رشد هماهنگی
۳. اختلال عصبی ۴. اختلال مربوط به سن

۱۰- جزء اختلالات تکلم محسوب می شود؟

۱. اختلال ارتباط بیانی ۲. اختلال نظام صوتی
۳. اختلال مختلط ارتباط بیانی-دریافتی ۴. اختلال شفاهی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- شیوع تأخیرهای زبانی در کودکان زیر ۳ سال است؟

۱. ۵ تا ۱۰ درصد ۲. ۱۰ تا ۱۵ درصد ۳. ۱۵ تا ۲۰ درصد ۴. ۳۰ تا ۴۰ درصد

۱۲- فرضیه ای که در حال حاضر در توضیح علت این اختلال وجود دارد به نام فرضیه نقص روندی می باشد؟

۱. اختلال هماهنگی حرکتی ۲. اختلال بیش فعالی
۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال زبان بیانی

۱۳- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ذهنی ۲. اوتیسم ۳. اختلال شنوایی ۴. اختلال زبانی

۱۴- تنها زمانی در زمره اختلال محسوب می شوند که به دلیل شدید بودن باعث مختل شدن پیشرفت تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی فرد شود؟

۱. اختلالات تکلم ۲. اختلال واج شناختی
۳. اختلال مختلط ارتباط بیانی-دریافتی ۴. اختلال ارتباطی نامشخص

۱۵- این اصطلاح به عنوان مترادف نارسایی رشد به کار می رود؟

۱. اختلال جسمی ۲. اختلال تغذیه ۳. اختلال حرکتی ۴. اختلال کودکی

۱۶- اغلب اختلال گذرایی است که معمولاً چند ماه طول می کشد و سپس فروکش می کند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. اختلال پرخوری ۳. اسکیزوفرنی ۴. هرزه خواری

۱۷- برحسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص می شود؟

۱. اختلال تغذیه ۲. پرخوری روانی ۳. بی اشتهایی روانی ۴. تعادل روانی

۱۸- این نظریه پردازان ادعا می کنند کودکانی که به بی اشتهایی مبتلا هستند به دلیل تعاملات مختل مادر-کودک نمی توانند هویت بدنی و احساس تملک بر بدن خود را پرورش دهند؟

۱. رفتارگرایی ۲. روان شناختی ۳. روان پویایی ۴. انسان گرایی

۱۹- اختلال در خودماندگی جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۱. نارسایی های ذهنی ۲. نارسایی های ویژه ۳. اختلال آسپرگر ۴. اختلال نافذ رشدی

۲۰- این نارسایی که در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام داشت؟

۱. نارسایی آواشناختی ۲. نارسایی زبانی ۳. اختلال گفتار ۴. اختلال بیانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- معمولاً شامل مکث ها و مکررگویی هایی می شود که جریان گفتار را منقطع می سازد؟

۱. آفازیا ۲. نارسایی گفتار ۳. نارسایی سیالی ۴. نارسایی آواشناسی

۲۲- به اختلالاتی گفته می شوند که در یک دسته بزرگ تری به نام اختلال های عادت و خوردن قرار می گیرند؟

۱. ارتباطی ۲. حرکتی ۳. دفع ۴. خوردن

۲۳- مهم ترین برنامه های درمان آن شامل استفاده از رفتار درمانی با تأکید بر برنامه های شرطی سازی کلاسیک است؟

۱. بی اختیاری دفع ۲. شب ادراری ۳. تیک ۴. تورتن

۲۴- تأکید بر یکنواختی رفتارهایی این اختلال که به وسیله کانر و راتر و دیگر پژوهشگران توصیف شده اند؟

۱. اختلال خواندن ۲. لکنت زبان ۳. آفازیا ۴. در خودماندگی

۲۵- کودک توانایی استفاده از دستانش برای حرکات هدفمند را از دست می دهد و در عوض درگیر حرکات قالبی می شود؟

۱. اختلال رشدی ۲. اختلال حرکتی ۳. اختلال رت ۴. اختلال هماهنگی

۲۶- نارسایی های با علل ناشناخته را اغلب چه می نامند؟

۱. نارسایی نامشخص ۲. نارسایی کارکردی مربوط به رشد

۳. نارسایی کارکردی جسمی ۴. نارسایی عضوی

۲۷- از ویژگی های آن آسیب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی محدود شده است؟

۱. رت ۲. تورتن ۳. اسپرگر ۴. اوتیسم

۲۸- این اختلال شامل فعالیت ها، علائق و رفتارهای قالبی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است؟

۱. اختلال در خودماندگی ۲. اختلال هماهنگی مربوط به رشد

۳. اختلال اجتماعی ۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۲۹- به فرد کمک می کند که محرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد؟

۱. خود کنترلی ۲. خود اعمالی ۳. توجه پایدار ۴. توجه متمرکز

۳۰- الگوی پایدار از رفتار تکراری که در آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارها و قواعد عمده اجتماعی متناسب با سن، نادیده گرفته می شود؟

۱. اختلال خلق ۲. اختلال پایدار ۳. اختلال ضد اجتماعی ۴. اختلال سلوک

1	ج
2	ب
3	الف
4	ج
5	ج
6	ب
7	د
8	الف
9	ب
10	ب
11	ب
12	د
13	ب
14	د
15	ب
16	د
17	ج
18	ج
19	د
20	الف
21	ج
22	ج
23	ب
24	د
25	ج
26	ب
27	ج
28	د
29	ج
30	د

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. آلفرد بینه ۲. استانلی هال ۳. بنیامین راش ۴. ویتمر

۲- در کدامیک از دیدگاه های زیر، بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله فرایند رفتار ۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری به منزله سلامت ۴. بهنجاری به منزله سازش با توقعات خود و جهان بیرون

۳- در کدامیک از رویکردهای زیر، مفاهیمی همچون اضطراب، ناخودآگاه، مکانیزم های دفاعی روانی و مراحل رشد روانی جنسی از مفاهیم کلیدی محسوب می شود؟

۱. الگوی روان پویایی ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی یادگیری ۴. الگوی زیست شناختی

۴- نخستین و بنیادی ترین گام برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۱. مشاهده رفتارهای فرد ۲. پیش آگهی و تعیین یک برنامه درمانی
۳. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی ۴. تداخل در فعالیت فردی و اجتماعی

۵- کدام گزینه از ابزارهای نسبتاً گویا و فراگیر است که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوان دارد؟

۱. آزمون هوش ریون ۲. آزمون روانی شناختی و کسلر

۳. آزمون هوش آلفرد بینه ۴. آزمون پیشرفت تحصیلی

۶- کدامیک از اصل های زیر را می توان به سه درجه اتفاقی، گذرا و پایدار تقسیم بندی نمود؟

۱. اصل شایستگی سنی ۲. اصل فراوانی یک رفتار ۳. اصل شدت یک رفتار ۴. اصل تداعی یک رفتار

۷- بر اساس نظریه پیاز، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می برند؟

۱. کودکی دوم ۲. دوران شیرخوارگی و کودکی اول

۳. دوران بلوغ ۴. کودکی سوم

۸- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلال رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۱. نشستن ۲. خزیدن ۳. تکلم ۴. راه رفتن

۹- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی می باشد؟

۱. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری ۲. کاردرمانی به همراه آموزش اجتماعی

۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی ۴. گروه درمانی و آموزش های مهارتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام گزینه از علل زمینه ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می شوند؟

۱. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالیدگی مغز
۲. فشار زبان و مشکلات کاربردی آن
۳. صدمات ارگانیکی و ساختاری
۴. آپراکسی گفتار

۱۱- کدام گزینه از ویژگی های اوتیسم می باشد؟

۱. این اشکال پس از یک دوره رشد عادی و در نتیجه یک بیماری عصبی یا جسمانی رخ می دهد
۲. این کودکان در تعامل اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازیهای سمبلیک و خلاق مشکل دارند
۳. کودکان دارای اختلال دیرتر از همسالانشان زبان باز می کنند
۴. مهمترین ویژگی بالینی در این افراد اشکال اساسی در درک و در بیان زبان است

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد حدود چند درصد می باشد؟

۱. ۱٪
۲. ۲.۵٪
۳. ۱۰٪
۴. ۵٪

۱۳- کدام گزینه از جمله اختلالات تغذیه و خوردن است که در دوره رشد آغاز می شود؟

۱. نشخوارگری
۲. بی اشتهاهی روانی
۳. پرخوری
۴. اختلال خوردن نامعین

۱۴- اختلال هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۲۴_۴۸ ماهگی
۲. ۱۲_۲۴ ماهگی
۳. ۱۲_۳۶ ماهگی
۴. ۱۸_۳۶ ماهگی

۱۵- کدام روش درمانی بعنوان موثرترین روش درمانی در موقع پرخوری شناخته می شود؟

۱. درمانهای روانشناختی
۲. درمانهای دارویی
۳. روان درمانی پویشی
۴. خانواده درمانی

۱۶- در کدامیک از انواع نارسایی های یادگیری مبتلایان به آن از نظر بهره هوشی، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. خوانش پریشی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی ویژه ریاضی
۴. نارسایی های ارتباطی

۱۷- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۶_۸ سالگی
۲. ۲_۷ سالگی
۳. ۳_۵ سالگی
۴. ۸_۱۰ سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۸- پژوهش های پس از مرگ بر روی مغز مبتلایان به دیسلکسی، ناهنجاری در کدام ناحیه از مغز را نشان می دهد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ

۲. لوب گیجگاهی فوقانی

۳. لوب گیجگاهی میانی

۴. بخش آهیانه ای - گیجگاهی

۱۹- برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار، دفع ادرار باید به چه صورت اتفاق بیفتد؟

۱. حداقل یکبار در هفته به مدت دو ماه

۲. حداقل سه بار در هفته به مدت لاقل یک ماه

۳. حداقل دوبار در هفته به مدت دو ماه

۴. حداقل دوبار در هفته به مدت لاقل سه ماه

۲۰- گزینه صحیح را مشخص کنید؟

۱. بی اختیاری مدفوع اولیه زمانی رخ می دهد که کودک حداقل شش ماه توانسته باشد مدفوعش را کنترل کند

۲. بی اختیاری ادراری ثانویه عمدتاً با تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد همراه است

۳. حدود نیمی از کسانی که دچار بی اختیاری مدفوع هستند، بی اختیاری ادرار را نیز نشان می دهند

۴. بر اساس مطالعات همه گیر شناسی مشخص شده که در سن ۵ سالگی شیوع بی اختیاری ادراری در پسران دو برابر نسبت آن به دخترهاست

۲۱- مهم ترین برنامه های درمان بی اختیاری ادراری یا شب ادراری کدام است؟

۱. استفاده از رفتاردرمانی با تاکید بر شرطی سازی کلاسیک

۲. مداخله های آموزشی و تربیتی

۳. دارودرمانی با استفاده از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

۴. درمان شناختی- رفتاری مرتبط

۲۲- نخستین روان پزشکی که در سال ۱۸۶۷ به طور جدی به کودکان خردسالی که مبتلا به اختلال شدید روانی همراه با

انحراف، تاخیر و دگرگونی بارز در فرایندهای رشد بودند، توجه نمود چه کسی بود؟

۱. هانس آسپرگر

۲. هنری موزلی

۳. لئوکانر

۴. راتر

۲۳- شیوع کدام رفتار در کودکان درخودمانده در اوقاتی که آنها در سکان های سازمان نیافته تنها هستند، بیشتر است؟

۱. رفتار خودجرحی

۲. رفتار خودتحریکی

۳. رفتار اجتماعی

۴. رفتار تشریفاتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۴- رویکردهای مداخله جویانه ای چون مدل سازی، تقویت، مدیریت خود و آموزش مستقیم مربوط به کدام یک از روش های درمان رفتاری- آموزشی می باشد؟

۱. درمان پاسخ محوری

۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه

۳. مداخلات ارتباطی

۴. تحلیل رفتار کاربردی

۲۵- کدام یک از داروهای زیر سطح سروتونین خون را کاهش داده و در برخی از کودکان درخودمانده موثر است؟

۱. فن سیکلیدین

۲. هالوپریدول

۳. فن فلورامین

۴. ریتالین

۲۶- شیوع کدام اختلال تنها در دختران تشخیص داده شده است؟

۱. اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی

۲. اختلال آسپرگر

۳. درخودماندگی

۴. اختلال رت

۲۷- حداقل سن شروع اختلال از هم پاشیدگی دوره کودکی چند سالگی است؟

۱. ۲ سالگی

۲. ۴ سالگی

۳. ۳ سالگی

۴. ۵ سالگی

۲۸- کدام اختلال از جمله رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان می باشد؟

۱. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۲. نارسایی ذهنی

۳. نارسایی های یادگیری

۴. اختلال کمبود توجه

۲۹- معمولاً نخستین علامتی که در افراد مبتلا به ADHD فروکش نمی کند، کدام است؟

۱. پرتحرکی

۲. حواس پرتی

۳. مشکلات یادگیری

۴. اختلالات خلقی

۳۰- کدامیک از انواع درمانهای زیر مربوط به اختلال سلوک می باشد؟

۱. بازی درمانی

۲. درمان چندالگویی

۳. روان درمانی انفرادی

۴. درمان تغذیه ای

1217243 - 98-99-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	د	عادي
۲	الف	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	ب	عادي
۶	د	عادي
۷	ب	عادي
۸	ج	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ج	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین درمانگاه روانشناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تأسیس شد؟

۱. ویتمر ۲. هال ۳. هیلی ۴. مایر

۲- کج خلقی، عدم کنترل ادرار، انگشت مکیدن و خودارضایی در کدام دسته از واکنش های سازگاری کودکان قرار می گیرد؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات عاداتی ۴. اختلالات عصبی

۳- کدام الگو بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تأکید نموده و مواردی همچون حافظه، فرایندهای یادگیری و فراموشی را مطرح می کند؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روانکاوی

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۵- آزمون ادراکی فراستیک در کدام دسته آزمون ها قرار می گیرد؟

۱. آزمون های بینایی ۲. آزمون های شنوایی ۳. آزمون های روانی ۴. آزمون های رشد

۶- اساس تشخیص اکثر اختلالات بر کدام مورد زیر است؟

۱. وضعیت روانی ۲. مشاهده مستقیم ۳. ارزیابی شخصیت کودک ۴. آزمون های روانی

۷- سیستم عصبی حرکتی در کودکان با اختلال رشد هماهنگی چگونه می باشد؟

۱. بخشی از آن تخریب شده است ۲. همه این سیستم تخریب شده است ۳. سیستم عصبی حرکتی سالم می باشد ۴. در دوران نوزادی سالم است اما به مرور تخریب می شود

۸- مهارتهای کودکان در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده کدام مورد زیر پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. لکنت زبان ۲. اختلال زبان بیانی ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال اتیسم

۹- مهمترین مشکل کدام اختلالات کودکان نقص در برقراری ارتباط است؟

۱. عقب ماندگی ۲. اختلالات اضطراب جدایی ۳. اختلالات عاداتی ۴. اوتیسم یا اختلالات فراگیر رشد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام تست برای تشخیص اختلال در زبان بیانی از رایج ترین تست ها می باشد که برای ارزیابی اصول زبان مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. بندر گشتالت ۲. وکسلر ۳. تست باطری ۴. تست بینه

۱۱- در کدام اختلال کودک به طور مداوم قادر نیست اصول تکلمی برخی حروف بی صدا را به نحوی متناسب با رشد بکار گیرد؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان بیانی ۴. اختلال زبان دریافتی

۱۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد چند درصد می باشد؟

۱. 12 درصد ۲. 3 درصد ۳. 5 درصد ۴. 10 درصد

۱۳- کدام فرضیه بر آن استوار است که اختلال در زبان بیانی به رشد غیرطبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به روند حافظه می باشد؟

۱. نقص روندی ۲. نقص در ساختار ۳. صدمات ظریف مغزی ۴. نقص در دستور زبان

۱۴- کدام یک از موارد زیر در دسته اختلالات خوردن بزرگسالان قرار می گیرد؟

۱. نشخوارگی ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پیکا

۱۵- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. 18-24 ماهگی ۲. 12-24 ماهگی ۳. 2-3 سالگی ۴. 8-12 ماهگی

۱۶- الگوی خانوادگی در هم تنیده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. مینوچین ۲. یونگ ۳. ویتمر ۴. فروید

۱۷- ویژگی اساسی کدام اختلال برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه است؟

۱. هرزه خواری ۲. بی اشتهایی روانی ۳. پرخوری ۴. نشخوارگری

۱۸- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

۱. رفتاری-شناختی ۲. رفتار دیالکتیکی ۳. بین فردی ۴. دارو درمانی

۱۹- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام عامل است؟

۱. نحوه مطالعه ۲. عوامل خانوادگی ۳. مشکلات خواندن ۴. مشکلات تدریس معلمان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۰- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام بخش مغز است؟

۱. ناحیه پیشانی
۲. ناحیه آهیانه ای
۳. ناحیه پس سری
۴. ناحیه گیجگاهی-آهیانه ای

۲۱- نارسایی در کدام اختلال به دلیل ناتوانی در پردازش اعداد مبنا می باشد؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال خواندن
۳. اختلال آواشناختی
۴. اختلال ریاضی

۲۲- در کدام اختلال نارسایی در سیالی گفتار به اندازه ای است که بر پیشرفت تحصیلی یا شغلی و یا ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. لکنت زبان
۲. آواشناختی
۳. اختلال نوشتاری
۴. اختلال ریاضی

۲۳- حداقل سن برای تشخیص اختلال بی اختیاری ادرار چه سنی است؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۳ سالگی
۳. ۴ سالگی
۴. ۲ سالگی

۲۴- در کدام اختلال بچه هرگز دوره طولانی از کنترل مدفوع را تجربه نکرده است؟

۱. بی اختیاری مدفوع
۲. بی اختیاری مدفوع ثانویه
۳. بی اختیاری مدفوع ثالث
۴. بی اختیاری مدفوع اولیه

۲۵- کدام مورد زیر از علل روانشناختی ابتلا به بی اختیاری مدفوع نیست؟

۱. سوء رفتار جنسی
۲. تنبیه
۳. ابتلا به اختلال روانی
۴. اجتناب از درد هنگام حرکات روده

۲۶- مؤثرترین و مشهورترین برنامه درمان بی اختیاری شب ادراری کدام گزینه می باشد؟

۱. دارو درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. دستگاه حساس به ادرار(تشک)
۴. رفتاری- شناختی

۲۷- کدام اختلال فراگیر رشد مربوط به جنس مؤنث است؟

۱. آسپرگر
۲. رت
۳. اتیسم
۴. بیش فعالی

۲۸- کودکان مبتلا به کدام اختلال همزمان دچار اختلال اسکیزوفرنی نیز می شوند؟

۱. درخودماندگی
۲. بیش فعالی
۳. آسپرگر
۴. رت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۹- برخی افراد مبتلا به اختلال آسپرگر ممکن است الگوهای رفتاری کدام اختلال را نشان دهند؟

۱. اختلال وسواس فکری-عملی

۲. اختلال شخصیت مرزی

۳. اختلال اسکیزوفرنی

۳۰- بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری سه مشکل اصلی کدام اختلال است؟

۱. اتیسم

۲. بیش فعالی

۳. اختلال رت

۴. آسپرگر



جامع ترین کانال پیام نوری
برای عضویت بزن روی عکس

@LOTUS_PNU

1217243 - 97-98-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	ج	عادي
۳	ب	عادي
۴	د	عادي
۵	الف	عادي
۶	د	عادي
۷	ج	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ج	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	الف	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ج	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ج	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی ۲. عاداتی- خلقی ۳. خلقی- اضطرابی ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مشاهده ۲. نقاشی ۳. مصاحبه ۴. بازی

۳- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک ۲. تشخیص ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۴- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر ۲. دشوار و پیچیده تر ۳. مهمتر و حساس تر ۴. اولویت دار تر و سخت تر

۵- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی ۲. روان آزمایی ۳. شرح حال ۴. بازی و نقاشی

۶- در سال اول زندگی کودک رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی ۲. عصبی ۳. شناختی ۴. عاطفی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۱۰ درصد ۲. ۵ درصد ۳. ۱۲ درصد ۴. ۱۵ درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی ۲. دریافتی- بیانی ۳. ارتباطی نامشخص ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ، ویژگی اصلی کدام اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی ۲. ارتباطی نامشخص ۳. دریافتی- بیانی ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزو مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی ۲. لکنت زبان ۳. ارتباطی نامشخص ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولا نابهنجار تلقی می شود؟

۱. ۱۸ ماهگی ۲. ۲۰ ماهگی ۳. ۱۲ ماهگی ۴. ۲۴ ماهگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. خواب آور ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی ۲. روان درمانی حمایتی ۳. خانواده درمانی ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه ۲. نوشتن ۳. شنیدن ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. کلینیک ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن ۲. ریاضی ۳. نوشتن ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. ۱ تا ۳ سالگی ۲. ۲ تا ۳ سالگی ۳. ۳ تا ۵ سالگی ۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. اختلال ارتباط بیانی
۳. اختلال ارتباط اجتماعی
۴. درماندگی آموخته شده

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی - آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین مشکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تفکر را چه می نامند؟

۱. کم توجهی
۲. نوروزگرایی
۳. تکانشگری
۴. کم فعالی

۲۸- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۶ سالگی
۳. ۴ سالگی
۴. ۷ سالگی

1217243 - 97-98-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	ب	عادي
۵	ب	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	د	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰:

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰:

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- انگشت مکیدن و مدرسه گریزی جزء کدام واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. خلقی-عاداتی ۲. عاداتی- خلقی ۳. خلقی- اضطرابی ۴. اضطرابی- خلقی

۲- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی در مورد کودکان کدام است؟

۱. مصاحبه ۲. مشاهده ۳. نقاشی ۴. بازی

۳- در سال اول زندگی کودک، رشد کدام بعد سریع تر است؟

۱. جسمی ۲. عصبی ۳. شناختی ۴. عاطفی

۴- ویژگی مشترک همه انواع روان درمانی های کودکان چیست؟

۱. تکنیک ۲. تشخیص ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۵- تشخیص بهنجاری از نابهنجاری در کودکان نسبت به بزرگسالان چگونه است؟

۱. ساده و روان تر ۲. دشوار و پیچیده تر ۳. مهمتر و حساس تر ۴. اولویت دارتر و سخت تر

۶- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات کودکان و نوجوانان چیست؟

۱. معاینه وضعیت روانی ۲. روان آزمایی ۳. شرح حال ۴. بازی و نقاشی

۷- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 10 درصد ۲. 5 درصد ۳. 12 درصد ۴. 15 درصد

۸- تست باطری از رایج ترین تست های تشخیصی کدام اختلال زبانی است؟

۱. بیانی ۲. دریافتی- بیانی ۳. ارتباطی نامشخص ۴. واج شناختی

۹- نقص در تلفظ ویژگی اصلی چه اختلال زبانی است؟

۱. آواشناختی ۲. ارتباطی نامشخص ۳. دریافتی- بیانی ۴. بیانی

۱۰- تکنیک تنفس دیافراگی جزء مداخلات درمانی کدام اختلال ارتباطی است؟

۱. بیانی ۲. لکنت زبان ۳. ارتباطی نامشخص ۴. آواشناختی

۱۱- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. 18 ماهگی ۲. 20 ماهگی ۳. 12 ماهگی ۴. 24 ماهگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۲- مداخلات رفتاری مانند چکاندن آب لیمو در درمان شیرخوار دارای کدام اختلال تغذیه مفید است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی ۴. پرخوری

۱۳- نقص اساسی در وظیفه هیپوتالاموس درباره کدام اختلال خوردن آمده است؟

۱. پرخوری ۲. هرزه خواری ۳. بی اشتهایی روانی ۴. نشخوار

۱۴- پژوهش های اخیر در درمان بی اشتهایی روانی به چه داروهایی تاکید داشته اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. خواب آور ۴. اشتها آور

۱۵- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی کدام است؟

۱. دارو درمانی ۲. روان درمانی حمایتی ۳. خانواده درمانی ۴. رفتار درمانی

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مربوط به کدام حوزه اکتسابات آموزشگاهی است؟

۱. محاسبه ۲. نوشتن ۳. شنیدن ۴. خواندن

۱۷- معمولاً مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی کجا است؟

۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. کلینیک ۴. مهد کودک

۱۸- بالاترین میزان شیوع نارسایی های یادگیری متعلق به کدام حوزه است؟

۱. خواندن ۲. ریاضی ۳. نوشتن ۴. شنیدن

۱۹- اکثر کودکان در چه سنی توانایی کنترل مثانه را به دست می آورند؟

۱. ۱ تا ۳ سالگی ۲. ۲ تا ۳ سالگی ۳. ۳ تا ۵ سالگی ۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- این اختلال دفعی با عوامل روانشناختی از قبیل جدایی والدین و یا عدم توافق آنها همراه است؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

۲۱- کدام اختلال دفعی با شیوه های فرزند پروری خشن و تنبیه گرایانه و میزان خصومت ارتباط دارد؟

۱. بی اختیاری ادرار اولیه ۲. بی اختیاری دفع اولیه ۳. بی اختیاری ادرار ثانویه ۴. بی اختیاری دفع ثانویه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- کانر شکل شدید آسیب شناسی روانی کودک را چه نامیده است؟

۱. اتیسم اولیه کودکی
۲. اختلال ارتباط بیانی
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. درماندگی آموخته شده

۲۳- میزان کدام اختلال دوران رشد کودکی در خانواده های دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا بیشتر گزارش شده است؟

۱. زبان بیانی
۲. بی اختیاری ادرار اولیه
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

۲۴- اصطلاح "والدین سرد" در حیطه کدام اختلال مطرح شده است؟

۱. درخودمانده
۲. زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. پرخوری

۲۵- کدام روش درمانی - آموزشی در درمان اختلال درخودماندگی جدید تر است؟

۱. تحلیل رفتار کاربردی
۲. مداخله رفتاری فشرده اولیه
۳. مداخلات ارتباطی
۴. درمان پاسخ محوری

۲۶- مهمترین شکل توجه در کودکان کدام است؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. توجه فعال
۴. توجه مبسوط

۲۷- صاحب نظران معمولاً رفتار بدون تکرار را چه می نامند؟

۱. تکانشگری
۲. کم فعالی
۳. کم توجهی
۴. نوروز گرایی

۲۸- سن معیار برای تشخیص نشانه های فقدان توجه و بیش فعالی چیست؟

۱. ۵ سالگی
۲. ۷ سالگی
۳. ۶ سالگی
۴. ۴ سالگی

۲۹- در ارتباط با کدام روش های درمانی ADHD مطالعات بیشتری انجام شده است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی-رفتاری
۳. درمان چند الگویی
۴. خانواده درمانی

۳۰- مداخله های مربوط به والدین شامل آموزش رفتاری و در صورت لزوم خانواده درمانی، در درمان کدام اختلال اهمیت بیشتری دارد؟

۱. سلوک
۲. نافرمانی مقابله ای
۳. درخودماندگی
۴. بی اشتهاهی روانی

1217243 - 97-98-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
۱	ب	عادي
۲	الف	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	ب	عادي
۶	ب	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت، کیست؟

۱. سکواين
۲. هال
۳. ماير
۴. بينه

۲- در گذشته اکثر اختلالات در چند گروه جای داده می شد؟

۱. 2
۲. 3
۳. 4
۴. 5

۳- تأکید دیدگاه آماری در تعیین بهنجاری بر کدام مورد است؟

۱. باید ها و ارزش های ایده آل جامعه
۲. وجود یا نبود علائم بیماری
۳. میانگین و شیوع علائم
۴. ملاک های فرهنگی

۴- "مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری و بد رفتاری" به کدام مقوله واکنش های سازگاری کودکان تعلق دارد؟

۱. اختلالات عاداتی
۲. ویژگی های اضطرابی
۳. اختلالات شخصیت
۴. اختلالات خلقی

۵- کدام گزینه یکی از مفاهیم کلیدی الگوی روان پویایی محسوب می شود؟

۱. هورمون ها
۲. اضطراب
۳. فراموشی
۴. محرک های محیطی

۶- بازنگری چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی انجمن روان پزشکی امریکا شامل چند محور ارزیابی است؟

۱. 2
۲. 3
۳. 4
۴. 5

۷- یکی از مهمترین روش ها برای سنجش افراد دچار معلولیت رشدی و یا کودکان خیلی خردسال چیست؟

۱. مشاهده رفتار
۲. مصاحبه بالینی
۳. بازی های غیر ساخت دار
۴. روان درمانی

۸- ثبات و پایایی علائم مشکل رفتاری در طول زمان نشانگر کدام اصل تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. شدت رفتار
۲. تداوم رفتار
۳. فراوانی رفتار
۴. شایستگی سنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- کدام یک از آزمون های زیر، آزمون بینایی است؟

۱. وکسلر
۲. لینکلن - اوزرتسکی
۳. بینه
۴. بندر - گشتالت

۱۰- برای ایجاد یک رابطه درمانی کدام مورد زیر لازم است؟

۱. استفاده از نقاشی
۲. به کار بردن تکنیک
۳. ابزارهای نمایش
۴. انجام مشاوره

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 5 درصد
۲. 2 درصد
۳. 3 درصد
۴. 10 درصد

۱۲- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم
۲. شنیدن
۳. هوش
۴. پیشرفت تحصیلی

۱۳- ویژگی اصلی اختلال واج شناختی چیست؟

۱. اختلال خواندن
۲. نقص در تلفظ
۳. اختلال مختلط در زبان دریافتی
۴. ورم مزمن گوش میانی

۱۴- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. تقاضاهای محیطی
۲. مهد کودک ها
۳. ژنتیک
۴. استعداد بیولوژیک

۱۵- آپراکسی گفتار عموماً با چه چیزی مرتبط است؟

۱. فقدان شنوایی
۲. فشار زبان
۳. صدمه مغزی
۴. عقب ماندگی ذهنی

۱۶- طبق برخی پژوهش ها، مؤثرترین و سریع ترین درمان اختلال نشخوار چیست؟

۱. درمان محیط روانی - اجتماعی
۲. بهبود تعامل بین مادر و شیرخوار
۳. دارو درمانی
۴. درمان رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ : تستی : تشریحی : ۰

تعداد سوالات: ۳۰ : تستی : ۰ : تشریحی

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۷- اختلال تغذیه ای شیرخوارگی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. دو سالگی
۲. سه سالگی
۳. پنج سالگی
۴. شش سالگی

۱۸- در مبتلایان به کدام نوع بی اشتهایی روانی، احتمال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۱. مزمن
۲. محدود کننده
۳. تخلیه ای
۴. حاد

۱۹- کدام داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تأثیر گذار بوده اند؟

۱. ضد اضطراب
۲. ضد روان پریشی
۳. ضد افسردگی
۴. سایمتیدین

۲۰- محدودیت در واژگان، دشواری در بازیابی کلمات یا ساختن جمله، از مشخصه های کدام نارسایی یادگیری است؟

۱. واج شناختی
۲. نوشتن بیانی
۳. زبان بیانی
۴. محاسبه پریشی

۲۱- به نظر برخی از متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس چیست؟

۱. مشکلات خواندن
۲. مشکلات شنوایی
۳. اختلال نوشتن
۴. لکنت زبان عمومی

۲۲- میزان شیوع نارسایی ریاضی در کودکان مدرسه رو چقدر است؟

۱. پنج درصد
۲. چهار درصد
۳. سه درصد
۴. یک درصد

۲۳- در کدام الگوی رفتاری برای درمان لکنت زبان از روش هایی مانند کنترل وابستگی و پرت کردن حواس استفاده می شود؟

۱. رفتارگرایی کلاسیک
۲. گفتاردرمانگری
۳. شناخت درمانگری
۴. روان درمانگری

۲۴- اثربخشی کدام روش رفتاری درمان شب ادراری مورد تردید است؟

۱. درمان دارویی
۲. آموزش روزانه اتساع مثانه
۳. استفاده از دستگاه های حساس و هشدار دهنده
۴. شرطی سازی کلاسیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۵- عامل روانشناختی مؤثر بر بی اختیاری ادراری کدام است؟

۱. مثانه بیش فعال
۲. تأخیر در شاخص های رشد فیزیکی
۳. بیماری های مزمن کلیوی
۴. بیکاری در خانواده

۲۶- کودکان مبتلا به کدام اختلال زیر از تماس جسمانی و برخورد نگاه اجتناب کرده و ترجیح می دهند تنها باشند؟

۱. از هم پاشیدگی
۲. اوتیسم
۳. رت
۴. آسپرگر

۲۷- کدام شیوه درمان اختلال در خودماندگی موجب رشد مهارت های ارتباطی می شود؟

۱. دارو درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. شیمی درمانی
۴. رژیم درمانی

۲۸- کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟

۱. اوتیسم
۲. رت
۳. آسپرگر
۴. شخصیت اسکیزوئید

۲۹- سه مشکل اصلی در اختلال کمبود توجه / بیش فعالی چیست؟

۱. بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری
۲. برانگیختگی، بیش فعالی و تکانشگری
۳. پر جنبشی، بیش فعالی و تکانشگری
۴. بی توجهی، انحراف توجه و تکانشگری

۳۰- کدام اختلال زیر " الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوان " نامیده می شود؟

۱. رفتار ایدایی
۲. سلوک
۳. نافرمانی
۴. بیش فعالی

1217243 - 96-97-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	الف	عادي
۳	ج	عادي
۴	د	عادي
۵	ب	عادي
۶	د	عادي
۷	الف	عادي
۸	ب	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	ب	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	ج	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱- در دیدگاه بهنجاری به منزله فرآیند رفتار بهنجاری نتیجه نهایی چه مواردی است؟

۱. سیستم های ساختاری ۲. سیستم های متعامل ۳. سیستم های رابطه ای ۴. سیستم های متعادل

۲- بر اساس نظر ساروک (2007) مشخصه اصلی اختلال مزمن روان نژندی چیست؟

۱. وسواس فکری ۲. وسواس عملی ۳. اضطراب ۴. کژ کاری جنسی

۳- در سال (1390) برای عملکرد بهتر تحصیلی چه موردی تجویز می گردد؟

۱. ریتالین ۲. فلوکستین ۳. بنزدترین ۴. باربیتورات

۴- از نظر باندورا علت اصلی بیماریهای روانی چیست؟

۱. نبود خویشتن داری ۲. در ارتباط با دیگران ۳. تجارب ارتباطی از وقوع عینی ارتباطات ۴. اضطراب اساسی

۵- کدامیک از موارد زیر شامل ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. جداسازی ۲. عملیاتی کردن ۳. وضعیت جسمی ۴. تشخیص

۶- در سنجش رفتاری ، کدامیک از موارد زیر بعنوان فن اصلی استفاده می گردد؟

۱. تشخیص ۲. ارزیابی ۳. معاینه ۴. مشاهده

۷- بنابر اصل شایستگی ، برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرآیند تحول باید چه مواردی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی ۲. ایفای نقش ۳. انتظارات سنی ۴. کم جراتی

۸- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 6 درصد ۲. 5 درصد ۳. 8 درصد ۴. 4 درصد

۹- کدامیک از موارد زیر شامل نشانه هایی است که در سنین پیش از دبستان در اختلال رشد هماهنگی دیده می شود؟

۱. ضعف در نوشتن ۲. مشکل در غذا خوردن ۳. ضعف در بغل کردن ۴. ناهماهنگی حرکتی در تمام زمانها

۱۰- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً شامل چه برنامه هایی می باشد؟

۱. برنامه های آموزشی حسی ۲. برنامه های آموزشی رفتاری ۳. برنامه های آموزشی حرکتی ۴. برنامه های آموزشی جسمانی و حسی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- در چند درصد کودکان زیر ۳ سال، تاخیرهای زبانی بسیار رایج است؟

۱. ۸ تا ۱۵ درصد ۲. ۱۰ تا ۱۵ درصد ۳. ۱۱ تا ۱۵ درصد ۴. ۸ تا ۱۸ درصد

۱۲- پیش آگهی اختلال در زبان بیانی با کدام مورد زیر ارتباط دارد؟

۱. تشخیص اختلال ۲. مداخله اختلال ۳. طبیعت اختلال ۴. شدت اختلال

۱۳- آپراکسی گفتار عموماً با چه صدمه ای مرتبط است؟

۱. صدمه عملکردی ۲. صدمه مغزی ۳. صدمه صوتی ۴. صدمه دهانی

۱۴- در کودکان پیش دبستانی مبتلا به لکنت زبان بروز کدام مورد زیر شایع تر است؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. فوبی از فضای بسته ۳. ناخن جویدن ۴. شب ادراری

۱۵- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می گردد؟

۱. ۱۳ ماهگی ۲. ۱۸ ماهگی ۳. ۱۴ ماهگی ۴. ۲۴ ماهگی

۱۶- سن شروع نشخوارکنندگی معمولاً چند ماهگی است؟

۱. ۵ ماهگی ۲. ۷ ماهگی ۳. بین ۳ تا ۱۲ ماهگی ۴. بین ۴ تا ۱۲ ماهگی

۱۷- پرخوری معمولاً در چه زمانی شروع می گردد؟

۱. فقط در اوایل نوجوانی ۲. فقط در اوایل بزرگسالی ۳. در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی ۴. در اواخر پیری

۱۸- کدام شیوه درمانی، در درمان مبتلایان به اختلال پرخوری از پرداختن به موضوعات مربوط به وزن و شکل بدن اجتناب می کند؟

۱. بین فردی ۲. دارو درمانی ۳. شناختی-رفتاری ۴. رفتار دیالکتیکی

۱۹- کدام نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال در تولید گفتار نام داشته است؟

۱. آواشناختی ۲. لکنت زبان ۳. زبان بیانی ۴. دیسلکسی

۲۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً در چند سالگی اتفاق می افتد؟

۱. ۴ تا ۱۰ سالگی ۲. ۵ تا ۷ سالگی ۳. ۲ تا ۷ سالگی ۴. ۳ تا ۸ سالگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۳۰ تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- بر اساس دیدگاه رفتارگرایی کلاسیک لکنت زبان چگونه رفتاری است؟

۱. آموخته شده ۲. رغبتی ۳. شرطی ۴. غیر شرطی

۲۲- شب ادراری اولیه عموماً با چه موردی همراه است؟

۱. تاخیر بلوغ و وزن پایین زمان تولد ۲. تاخیر بلوغ و وزن بالای زمان تولد
۳. ناخن جویدن ۴. گریه نابهنگام

۲۳- وقوع نارسایی دفع در نتیجه تعامل چه عواملی می باشد؟

۱. روحی و جسمانی ۲. روانشناختی و جسمانی
۳. روانشناختی و حرکتی ۴. حرکتی

۲۴- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادرار، مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. ریتالین ۲. کلوزاپین ۳. توفرانیل ۴. هالوپریدول

۲۵- اسکیزوفرنی در چه سنی در کودکان نادر است؟

۱. زیر ۷ سال ۲. زیر ۸ سال ۳. زیر ۵ سال ۴. زیر ۶ سال

۲۶- روش های درمان گری اختلالات رت بر چه آموزشهایی متمرکز می شوند؟

۱. مهارتهای درمانی و تعدیلی ۲. مهارتهای درمانی و کششی
۳. مهارتهای خودیاری و ارتباطی ۴. مهارتهای دیگران یاری و ارتباطی

۲۷- اختلال در خودماندگی معمولاً در چه سنی ظاهر می گردد؟

۱. قبل از ۵ سالگی ۲. قبل از ۴ سالگی ۳. قبل از ۷ سالگی ۴. قبل از ۳ سالگی

۲۸- اختلال کمبود توجه /بیش فعالی روی کدام مشکل اصلی زیر متمرکز است؟

۱. کم فعالی ۲. تکانش گری ۳. بی تکلیفی ۴. توجه زیاد

۲۹- کدامیک از شیوه های زیر جزء روش های رفتاری است؟

۱. مجاورت ۲. کنترل فرد ۳. مهارت حل مسئله ۴. بازی درمانی

۳۰- طبق نظریه روانکاوی کلاسیک ، علت اختلال نافرمانی مقابله جویانه چیست؟

۱. تعارضات حل نشده در دوران مقعدی ۲. تعارضات حل نشده در دوران دهانی
۳. تعارضات حل نشده در دوران آلتی ۴. تعارضات حل نشده در دوران کمنون

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: ۳۰ تستی: ۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

Soalatpnu.ir

قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۷۵۰ تومان

مستقیماً از سایت ما خرید کنید

1217243 - 96-97-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	الف	عادي
۵	د	عادي
۶	د	عادي
۷	ج	عادي
۸	ب	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	د	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	ب	عادي
۱۴	الف	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	ج	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	الف	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- اولین فردی که به مطالعه کودکان عقب مانده و روش های آموزشی برای این کودکان پرداخت که بود؟

۱. ادوارد سکواين
۲. ویلیام هیلی
۳. آلفرد بینه
۴. آدولف مایر

۲- اختلال مزمنی است که مشخصه ی اصلی آن اضطراب می باشد و ممکن است به صورت علائمی چون وسواس فکری و عملی و غیره بروز کند.

۱. روان پریشی
۲. سندرم های مغزی
۳. اختلال های شخصیت
۴. روان نژندی

۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری، بدرفتاری و غیره در کدام طبقه از اختلالات طبقه بندی جدید قرار دارد؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات عاداتی
۳. اختلالات اضطرابی
۴. اختلالات شخصیتی

۴- کدام یک از نظریه پردازان مکتب روان پویایی، معتقد است که شخصیت کودک تحت تاثیر چگونگی مقابله وی با اضطراب اساسی است که از احساس جدایی ناشی می شود؟

۱. فروید
۲. آدلر
۳. کارن هورنای
۴. سالیوان

۵- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های الگوی شناختی می باشد؟

۱. در این دیدگاه محرک های محیطی با رعایت قوانین محرکی و پاسخی می توانند هر گونه رفتاری را در انسان ایجاد کند
۲. این رویکرد به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد
۳. در این دیدگاه به نقش عوامل بدنی در ایجاد بیماری های روانی تاکید می شود
۴. این دیدگاه بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تاکید می کند

۶- اولین و بنیادی ترین گام در سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان چیست؟

۱. توانایی اجرای یک مصاحبه ی بالینی جامع
۲. توانایی برقراری یک ارتباط صحیح بین کودک و مصاحبه گر
۳. سنجش وضعیت روحی و روانی کودک
۴. شناخت توانایی ها و نقاط ضعف کودک

۷- اصلی ترین فن در سنجش رفتار چیست؟

۱. مصاحبه
۲. پرسشنامه
۳. مشاهده
۴. گرفتن آزمون

۸- از چه ابزاری جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری استفاده می شود؟

۱. آزمون وکسلر
۲. آزمون برتری طرفی
۳. آزمون رشد حرکتی لینکلن - اوزرتسکی
۴. آزمون های پیشرفت تحصیلی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- طبقه بندی خصیصه های نابهنجار به دو طبقه ی درون ساخت و برون ساخت توسط چه کسی صورت گرفت؟

۱. آنا فروید ۲. ایکن باخ ۳. فروید ۴. وکسلر

۱۰- کدام اصل برای تشخیص رفتارها نابهنجار در فرآیند تحول رشد، انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی ۲. اصل شایستگی ۳. اصل شدت ۴. اصل تداوم

۱۱- بر اساس نظریه پیاژه، کودکان در چه سنینی در مرحله ی حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. پیش دبستان ۲. دبستان ۳. خردسالی ۴. دوره ی شیرخوارگی و کودکی اول

۱۲- مشخصه ی اولین سال زندگی کودک چیست؟

۱. تولید زبان و گفتار ۲. به حرکت درآمدن ۳. رشد جسمانی سریع ۴. وابستگی شدید به شیر مادر

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در کودکان سنین مدرسه چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. ۸ درصد ۲. ۷ درصد ۳. ۶ درصد ۴. ۵ درصد

۱۴- در کدام یک از انواع اختلالات، کودکان از جنبه ی هماهنگی حرکتی و پیشرفت تحصیلی به طور قابل ملاحظه ای از گروه همسن و سال خود ضعیف ترند؟

۱. اختلال ارتباطی ۲. اختلال اضطرابی ۳. اختلال رشد هماهنگی ۴. اختلال فراگیر مربوط به رشد

۱۵- یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند و می آموزد، چیست؟

۱. زبان ۲. حرکت ۳. هوش ۴. احساس

۱۶- استفاده ی مادر از الکل، کوکائین و نیکوتین باعث بروز کدام یک از علل اختلال رشد هماهنگی می شود؟

۱. نارس بودن ۲. وزن کم هنگام تولد ۳. هیپوکسی ۴. سوء تغذیه در دوران پیش از تولد

۱۷- کدام گزینه به عنوان علل زمینه ای اختلال در زبان بیانی در نظر گرفته می شود؟

۱. تاخیر در پیشرفت گفتار ۲. آپراکسی گفتار که عموماً با صدمه مغزی مرتبط است ۳. صدمات ظریف مغزی و تاخیر در بالندگی مغز ۴. مشکلات ارگانیکی و ساختاری از قبیل شکاف کام و ...

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۸- مهم ترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است و در تعامل های اجتماعی، ارتباط دوطرفه و بازی های سمبولیک و خلاق نیز مشکل دارند.

۱. عقب ماندگی ذهنی

۲. اوتیسم

۳. اختلال شنوایی

۴. اختلال در زبان دریافتی

۱۹- کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، ممکن است به صورت اکتسابی یا ناشی از رشد باشد؟

۱. اختلال در زبان دریافتی- بیانی

۲. اختلال در زبان بیانی

۳. اختلال واج شناسی

۴. اختلال ارتباطی نامشخص

۲۰- لکنت زبان معمولاً در چه گروه سنی شایع است؟

۱. خردسال

۲. نوجوانان

۳. تا سن ۱۲ سالگی

۴. جوانان

۲۱- کدام گزینه از مشخصه های اختلال هول (پانیک) می باشد؟

۱. ترس از تنها بودن در اماکن عمومی

۲. همواره بلافاصله در رویارویی با نشانه موقعیتی یا راه انداز یا به لحاظ پیش بینی آن روی می دهد

۳. حمله ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع

۴. میزان شیوع آن در جمعیت کلی 7.17 درصد می باشد

۲۲- کدام یک از اختلالات اضطرابی در گروه اندکی از کودکان با عفونت استرپتوکوکی بتاهمولیتیک همراه باشد؟

۱. بازارهراسی یا آگورافوبیا

۲. اختلال هول

۳. اختلال تورث

۴. اختلال وسواس فکری - عملی

۲۳- بر اساس کدام نظریه، اختلال وسواسی - جبری، نوعی واپس روی از مرحله ادیپی به مرحله مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شد؟

۱. نظریه روان کاوی سنتی

۲. دیدگاه رفتارگرایی

۳. نظریه زیستی

۴. نظریه شناختی

۲۴- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد ؟

۱. اختلال رت

۲. اختلال هراس اجتماعی

۳. اختلال اضطراب اجتماعی

۴. اختلال وسواسی - جبری

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰
سری سوال: ۱ یک
عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۵- کدام یک از اختلالات اضطرابی پس از سانحه PTSD رخ می دهد؟

۱. اختلال اضطراب جدایی
۲. اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان
۳. اختلال وحشت زدگی
۴. اختلال اضطراب فراگیر

۲۶- کدام گزینه از خصوصیات افراد با خلق بالا می باشد؟

۱. پرش افکار
۲. احساس گناه
۳. دشوار شدن تمرکز
۴. افکار مرگ

۲۷- دوره ی افسردگی اساسی باید حداقل چقدر طول بکشد؟

۱. چهار هفته
۲. دو ماه
۳. سه هفته
۴. دو هفته

۲۸- کدام گزینه مربوط به افسرده خویی نمی باشد؟

۱. مشخصه ی آن وجود علائمی کم شدت تر از علائم افسردگی اساسی است
۲. فرد باید حداقل دو سال خلق افسرده داشته باشد
۳. به اختلال دیس تایمی معروف است
۴. در این اختلال، خلق دائما به شکل غیرطبیعی بالا، گشاده و تحریک پذیر است

۲۹- در بین اختلالات روان پزشکی، بالاترین شیوع طول عمر مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسردگی اساسی
۲. اختلال دو قطبی محور I
۳. اختلال دو قطبی محور II
۴. اختلال سیکلوتایمی

۳۰- عوامل سایکودینامیک در افسردگی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ملانی کلاین
۲. زیگموند فروید
۳. ادوارد بیرینگ
۴. هاینس کوهوت

۳۱- در طبقه بندی اختلال های تغذیه و خوردن، کدام گزینه از انواع اختلال های خوردن محسوب می شود؟

۱. هرزه خواری
۲. نشخوارگی
۳. بی اشتهاهی روانی
۴. اختلال تغذیه ای اوایل کودکی

۳۲- در مورد کودکانی که علت هرزه خواری آن ها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است، کدام روش درمانی هرزه خواری مفید می باشد؟

۱. روش رفتاری
۲. روش محیطی
۳. روش های روانی و اجتماعی
۴. راهنمایی خانوادگی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۳- سن شروع نشخوارگری معمولاً در چه زمانی اتفاق می افتد؟

۱. ۳ تا ۱۲ ماهگی
۲. ۵ تا ۱۰ ماهگی
۳. ۲ تا ۸ ماهگی
۴. ۳ تا ۱۳ ماهگی

۳۴- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علایم اختلال پرخوری تاثیر گذراند؟

۱. فنوباربینال
۲. منوآمین اکسیداز
۳. ریتالین
۴. هالوپریدول

۳۵- الگوی خانوادگی درهم تنیده توسط چه کسی نامگذاری شده است؟

۱. هارلسون
۲. اندرلیچ
۳. گاردنر
۴. مینوچین

۳۶- علت اصلی خوانش پریشی، وجود ناهنجاری هایی در کدام بخش از مغز است؟

۱. گیجگاهی - پیشانی
۲. پیش پیشانی - پس سری
۳. آهیانه ای - پیش پیشانی
۴. گیجگاهی - آهیانه ای

۳۷- بر اساس پژوهش های انجام شده، در سبب شناسی کدام نارسایی عوامل پیش از تولد نظیر اختلال جنین الکلی و وزن کم هنگام تولد نقش دارد؟

۱. اختلال خواندن
۲. اختلال بیان نوشتاری
۳. اختلال ریاضی
۴. اختلال آواشناسی

۳۸- مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی معمولاً کجاست؟

۱. محیط مدرسه
۲. محیط خانواده
۳. کلینیک های روان درمانی
۴. گفتاردرمانی

۳۹- روش درمانی دیستار، در درمان کدام یک از اختلالات بکار می رود؟

۱. نارسایی های تغذیه
۲. نارسایی های خلقی
۳. اختلالات اضطرابی
۴. نارسایی های یادگیری

۴۰- کدام یک از انواع اختلالات یادگیری را دیسلکسی می گویند؟

۱. نارسایی در محاسبه
۲. نارسایی خوانش پریشی
۳. نارسایی زبان بیانی
۴. نارسایی آواشناسی

1217243 - 95-96-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
۱	الف	عادي
۲	د	عادي
۳	الف	عادي
۴	ج	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	ج	عادي
۸	الف	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	د	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	الف، ب، ج، د	عادي
۱۸	ب	عادي
۱۹	الف، ب، ج، د	عادي
۲۰	الف	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي
۳۱	ج	عادي
۳۲	الف، ب، ج، د	عادي
۳۳	الف	عادي
۳۴	ب	عادي
۳۵	الف، ب، ج، د	عادي
۳۶	د	عادي
۳۷	ج	عادي
۳۸	الف	عادي
۳۹	د	عادي
۴۰	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- بهنجاری به منزله سلامت به چه معنی بکار برده می شود؟

۱. موفقیت آمیز بودن ملاک ها
۲. متناسب با تغییرات
۳. نبودن بیماری
۴. هماهنگی مطلوب بین اجزای گوناگون دستگاه روانی

۲- اختلال مزمنی که مشخصه اصلی آن اضطراب است در طبقه بندی قدیم جزء کدام دسته از اختلالات قرار گرفته است؟

۱. سندرم های مغزی
۲. روان پریشی
۳. روان نژندها
۴. اختلال شخصیت

۳- کدامیک از اختلالات زیر جزء اختلالات خلقی می باشد؟

۱. کج خلقی
۲. خرابکاری
۳. عدم کنترل ادارار
۴. انگشت مکیدن

۴- در کدامیک از الگو های اختلال های روانی کودکان ، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده و مواردی چون حافظه ، فرآیندهای یادگیری ، فراموشی از مفاهیم مطرح و اساسی این دیدگاه می باشد؟

۱. الگوهای شناختی
۲. الگوهای یادگیری
۳. روان پویایی
۴. زیست شناختی

۵- برای اجرای یک فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان ، توانایی در اجرای کدام یک از روش های زیر نخستین و بنیادی ترین گام است؟

۱. مشاهده
۲. پرسشنامه
۳. مصاحبه بالینی
۴. تحقیق میدانی

۶- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید بیانگر کدامیک از ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. رابطه
۲. تکنیک
۳. وضعیت روانی
۴. تشخیص

۷- در سنجش رفتاری کدامیک از روش های زیر به عنوان فن اصلی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. پرسشنامه
۲. مصاحبه
۳. تحقیق میدانی
۴. مشاهده

۸- ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان بیانگر کدام اصل می باشد؟

۱. تداوم یک رفتار
۲. فراوانی یک رفتار
۳. شایستگی
۴. شدت رفتار

۹- کودکان سالمی که خوب تغذیه شوند از تولد تا یک سالگی چند درصد به قدشان اضافه می شود؟

۱. ۱۰٪
۲. ۲۰٪
۳. ۳۵٪
۴. ۵۰٪

۱۰- اختلال مهارت های حرکتی معمولاً در چه سنی مورد توجه قرار می گیرند؟

۱. ۵ تا ۱۱ سالگی
۲. ۳ تا ۵ سالگی
۳. ۱ تا ۳ سالگی
۴. بدو تولد تا یک سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- اختلال در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات بیان کننده کدامیک از اختلال های ارتباطی می باشد؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال ارتباطی نامشخص
۳. اختلال در زبان بیانی
۴. اختلال واج شناختی

۱۲- در کدامیک از اختلال های ارتباطی کودک تمایل دارد بسیار کوتاه و مختصر صحبت نماید؟

۱. اختلال در زبان بیانی
۲. واج شناختی
۳. اختلال ارتباطی نامشخص
۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۱۳- کدامیک از موارد زیر جزء ملاک های تشخیص لکنت زبان نمی باشد؟

۱. تکرار اصوات یا سیلاب ها
۲. ذخیره محدود واژگان
۳. طولانی کردن اصوات
۴. عبارات تعجبی

۱۴- ترس کودک از جدایی از والدین در چه سنی اتفاق می افتد؟

۱. ۷ ماهگی
۲. ۲ سالگی
۳. ۱ سالگی
۴. ۹ تا ۱۲ سالگی

۱۵- حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع بیانگر کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال وسواسی
۲. اختلال هراس
۳. اختلال هول
۴. اختلال استرس

۱۶- منظم کردن مکرر، بازیابی تکراری، تکرار نماز خواندن بدون علت واقعی بیانگر کدام اختلال می باشد؟

۱. اضطراب
۲. وسواس های عملی
۳. هراس
۴. اختلال هول

۱۷- سندرم توره با کدامیک از اختلال های زیر ارتباط نزدیک دارد؟

۱. وسواسی - جبری
۲. استرس
۳. اضطراب
۴. هراس

۱۸- «پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید که از گانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می کند» بیانگر کدام گزینه است؟

۱. ترس
۲. هراس
۳. استرس
۴. اضطراب

۱۹- اضطراب جدایی معمولاً با کدام اختلال همراه است؟

۱. اضطراب
۲. استرس
۳. ترس
۴. هراس

۲۰- دوره هیپومانیا حداقل چه مدت طول می کشد؟

۱. دو هفته
۲. یک هفته
۳. ۵ روز
۴. چهار روز

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- نظریه درماندگی آموخته شده پدیده های افسردگی را مربوط به کدام عامل می دانند ؟

۱. تحریف های شناختی خاص
۲. تجربه رویدادهای قابل کنترل
۳. تجربه رویدادهای غیر قابل کنترل
۴. تحریف های رفتاری

۲۲- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار نشانه کدام اختلال می باشد ؟

۱. پرخوری
۲. هرزه خواری
۳. نشخوارگی
۴. بی اشتهایی روانی

۲۳- استفاده از دارو های ضد روان پریشی نظیر هالوپریدول در درمان کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقیت آمیز نیز داشته است ؟

۱. پرخوری
۲. هرزه خواری
۳. نشخوارگی
۴. بی اشتهایی

۲۴- اختلال پر خوری در چه سنی بروز می کند ؟

۱. ۱۵ تا ۱۹ سالگی
۲. ۱۰ تا ۱۵ سالگی
۳. ۵ تا ۱۰ سالگی
۴. ۲ تا ۵ سالگی

۲۵- درمان رفتار دیالکتیکی یا جدلی در کدامیک از اختلال های زیر مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مثبت خود را نشان داده است ؟

۱. نشخوارگی
۲. بی اشتهایی
۳. پرخوری
۴. خوردن نامعین

۲۶- ساده ترین نشانه ای که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه های تحصیلی پیش بینی کرد ؟

۱. اختلال زبان بیانی
۲. نارسایی خواندن
۳. اختلال نوشتاری
۴. اختلال آوا شناختی

۲۷- غلط های انشایی مضاعفی، عدم توجه به نقطه گذاری و جا انداختن گهگاه بخشی از کلمه، نشان دهنده کدامیک از اختلال های زیر می باشد ؟

۱. بیان نوشتاری
۲. نارسایی خواندن
۳. زبان بیانی
۴. آوا شناسی

۲۸- با توجه به تخمین های زده شده چند درصد از کودکان مدرسه رو به نارسایی در ریاضی مبتلا هستند ؟

۱. ۴٪
۲. ۳٪
۳. ۲٪
۴. ۱٪

۲۹- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً در چه سنی اتفاق می افتد؟

۱. ۲ تا ۷ سالگی
۲. ۲ تا ۸ سالگی
۳. ۵ تا ۷ سالگی
۴. ۷ تا ۹ سالگی

۳۰- شیوه کنترل سرعت گفتار یا کش دادن گفتار برای درمان کدام اختلال مورد استفاده قرار می گیرد ؟

۱. بیان نوشتاری
۲. ریاضی
۳. لکنت زبان
۴. آوا شناسی

1217243 - 95-96-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ج	عادي
۲	ج	عادي
۳	ب	عادي
۴	الف	عادي
۵	ج	عادي
۶	ب	عادي
۷	د	عادي
۸	الف	عادي
۹	د	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ج	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	ب	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	الف	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ج	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳ -

۱- اولین درمانگاه روانشناسی که توسط ویتمر در سال ۱۸۹۶، در پنسیلوانیا تاسیس شد، جهت درمان کدام موارد بوده است؟

۱. اختلالات یادگیری و خلقی
۲. بزهکاری و لکنت زبان
۳. لکنت زبان و اختلالات یادگیری
۴. روان نژندی و سندرم های مغزی
- ۲- در طبقه بندی ایکن باخ، کدام مورد زیر بنای داخلی دارد و زیر عنوان درون ساخت آمده است؟
۱. فرار از مدرسه
۲. دزدی
۳. تهوع
۴. اعتیاد به الکل

۳- رشد طبیعی به کدام عامل بستگی دارد؟

۱. کنترل هیجانات توسط فرد
۲. محیط و کنترل احساسات توسط فرد
۳. تعامل عملکرد فرد در زمینه های شناختی، هوشی و فیزیکی حرکتی
۴. هماهنگی رشد و تفکیک رفتارهای عادی

۴- شیوع اختلال در زبان بیانی در سن آغاز دبستان تقریباً چند درصد می باشد؟

۱. ۱ تا ۳ درصد
۲. ۲ تا ۵ درصد
۳. ۳ تا ۷ درصد
۴. ۵ تا ۱۰ درصد

۵- اختلال آواشناختی با کدام اختلال تداخل پیدا می کند؟

۱. اختلال بیش فعالی
۲. اختلال کنش پریشی
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. اختلال رشد هماهنگی

۶- کدام دیدگاه اولین مطالعات علمی را به خود اختصاص داده است؟

۱. زیستی
۲. رفتار گرایی
۳. روانکاوی
۴. شناختی

۷- میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی - جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد می باشد؟

۱. ۲ تا ۳ درصد
۲. ۳ تا ۵ درصد
۳. ۵ تا ۱۰ درصد
۴. ۳ تا ۱۳ درصد

۸- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد؟

۱. آگورافوبی
۲. هراس
۳. PTSD
۴. وسواسی - جبری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- افراد مبتلا به کدام اختلال معمولاً بیش از اندازه خواهان تایید بوده و نیازمند اطمینان بخشی مفرط درباره عملکردشان و سایر نگرانی هایشان هستند؟

۱. هراس اجتماعی ۲. هراس ۳. اضطراب جدایی ۴. اضطراب فراگیر

۱۰- اختلال دو قطبی محور II، که گونه ای از اختلال دو قطبی می باشد، با کدام دوره ها مشخص می گردد؟

۱. مانیا و هیپومانیا ۲. افسردگی و مانیا
۳. افسردگی اساسی و هیپومانیا ۴. مانیا و دیس تایمی

۱۱- روش های سازماندهی و تفسیر تجارب تعریف کدام عنصر شناختی محسوب می شود؟

۱. شخصی سازی ۲. طرح کلی ۳. تعمیم افراطی ۴. انتزاع اختصاصی

۱۲- برای درمان کودکانی که علت هرزه خواری آنها والدین و روش های ارتباطی والدین با کودک است کدام روش مناسب تری می باشد؟

۱. روش محیطی ۲. روش های روانی-اجتماعی
۳. روش رفتاری ۴. روان درمانی بیانی-حمایتی پویشی

۱۳- هارلسون و همکاران در سال ۲۰۱۰، برای درمان قطعی بی اشتهایی روانی کدام مورد را پیشنهاد کردند؟

۱. کار کردن با خانواده های مبتلایان ۲. درمان شناختی - رفتاری
۳. دارو درمانی ۴. روان درمانی پویشی

۱۴- مبتلایان به کدام اختلال بر این باورند که فاقد مهارت های اجتماعی متناسب هستند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پرخوری روانی ۳. نشخوار گری ۴. هرزه خواری

۱۵- کدام شیوه درمانی، درمان مبتلایان به اختلال پرخوری، از پرداختن به موضوعات مربوط به وزن و شکل بدن اجتناب می کند؟

۱. بین فردی ۲. دارو درمانی ۳. شناختی - رفتاری ۴. رفتار دیالکتیکی

۱۶- در کدام مرحله خواب مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. چهارم

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۷- پانیک جزء علایم کدام اختلال خواب محسوب می شود؟

۱. آینه
۲. نارکولپسی
۳. وحشت شبانه
۴. خواب زدگی

۱۸- بر طبق پژوهش های صورت گرفته با FMRI، کدام بخش از مغز بچه های کوچک مبتلا به دیسلکسی، فعالیت کمتری را در هنگام خواندن نسبت به کودکان عادی نشان می دهد؟

۱. لوب گیجگاهی تحتانی
۲. لوب پیشانی فوقانی
۳. لوب پیشانی تحتانی
۴. لوب پیش پیشانی فوقانی

۱۹- کدام نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال در تولید گفتار نام داشته است؟

۱. آواشناختی
۲. لکنت زبان
۳. زبان بیانی
۴. دیسلکسی

۲۰- کدام مورد به مکان اصلی درمان نارسایی های تحولی اشاره دارد؟

۱. خانواده
۲. مرکز مشاوره
۳. مرکز گفتار درمانی
۴. مدرسه

۲۱- در کدام روش، بر رابطه نماد با صدا تمرکز می شود؟

۱. تاثیر عصبی
۲. دیستار
۳. آوایی-دیداری
۴. الفبایی

۲۲- کدام دارو در درمان بی اختیاری ادرار، مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. هالوپریدول
۲. توفرانیل
۳. ریتالین
۴. کلوزاپین

۲۳- چند درصد از کودکان در خودمانده، کارکردی در حد کم توان ذهنی عمیق دارند؟

۱. ۳۰ درصد
۲. ۲۵ تا ۴۰ درصد
۳. ۴۵ تا ۵۰ درصد
۴. ۵۵ تا ۶۵ درصد

۲۴- سندرم X شکننده که یک بیماری ژنتیکی است با کدام اختلال ارتباط دارد؟

۱. از هم پاشیدگی کودکی
۲. در خودماندگی
۳. رت
۴. آسپرگر

۲۵- داروی فن فلورامین، که در درمان برخی از کودکان در خود مانده موثر می باشد، باعث ایجاد کدام عملکرد در سطح خون می شود؟

۱. سطح نور اپی نفرین خون را کاهش می دهد.
۲. سطح سروتونین خون را افزایش می دهد.
۳. سطح دو پامین خون را کاهش می دهد.
۴. سطح سروتونین خون را کاهش می دهد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۶- کدام اختلال از طریق جهش هایی در ژن گردانی پروتئین میتل سی پی جی ایجاد می شود؟

۱. فراگیر رشد نامعین
۲. آسپرگر
۳. اوتیسم
۴. رت

۲۷- با توجه به نوارهای مغزی و اسکن های مغزی که از کودکان مبتلا به ADHD در مورد نقش عوامل عصبی - فیزیولوژیایی به عمل آمده است کدام مورد با افزایش انگیزتگی همراه است؟

۱. کاهش درصد نوار دلتا
۲. کاهش درصد نوار بتا
۳. افزایش درصد نوار آلفا
۴. افزایش درصد نوار دلتا

۲۸- کدامیک از شیوه های زیر جزء روش های رفتاری است؟

۱. مجاورت
۲. کنترل خود
۳. مهارت حل مسئله
۴. بازی درمانی

۲۹- در برخی از کودکان مبتلا به اختلال سلوک میزان کدام آنزیم پایین است؟

۱. آنزیمی که سروتونین را به استیل کولین تبدیل کند.
۲. آنزیمی که دوپامین را به سروتونین تبدیل کند.
۳. آنزیمی که نوراپی نفرین را به دوپامین تبدیل کند.
۴. آنزیمی که دوپامین را به نوراپی نفرین تبدیل کند.

۳۰- کدام اختلال شامل الگوی پایداری از رفتارهای منفی گرایانه، خصومت آمیز و گستاخانه بدون وجود نقض جدی هنجارهای اجتماعی یا حقوق دیگران می باشد؟

۱. ADHD
۲. ODD
۳. سلوک
۴. رفتار ایدایی نامعین

1217243 - 95-96-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
۱	ج	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	ج	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	الف	عادي
۸	د	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ج	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	الف، ب، ج، د	عادي
۲۲	الف، ب، ج، د	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	الف، ب، ج، د	عادي
۲۷	الف	عادي
۲۸	الف، ب، ج، د	عادي
۲۹	د	عادي
۳۰	الف، ب، ج، د	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳، ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- انجام عملی بر خلاف وجدان و ارزش های مورد قبول فرد مربوط به کدامیک از انواع اضطراب بر اساس نظر فروید می باشد؟

۱. واقعی ۲. اخلاقی ۳. نوروتیک ۴. سایکوتیک

۲- آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام یک از آزمون های زیر می باشد؟

۱. آزمونهای شنوایی ۲. آزمونهای پیشرفت تحصیلی
۳. آزمونهای بینایی ۴. آزمون رشد حرکتی

۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد ۲. ۷ درصد ۳. ۳ درصد ۴. ۲ درصد

۴- کودک دارای این اختلال تمایل دارد بسیار کوتاه و مختصر صحبت نماید که با حذف کردن بعضی از اشکال دستور زبان مانند ماضی گذشته همراه می باشد؟

۱. واج شناختی ۲. لکنت زبان
۳. اختلال در زبان بیانی ۴. اختلال در زبان دریافتی - بیانی

۵- ویژگی اصلی کدام یک از اختلالات ارتباطی زیر نقص در تلفظ می باشد؟

۱. ارتباطی نامشخص ۲. موتیسم ۳. آواشناختی ۴. لکنت زبان

۶- OCD مربوط به کدام یک از اختلال های اضطرابی زیر می باشد؟

۱. پانیک ۲. وسواسی - جبری ۳. استرس پس از سانحه ۴. اضطراب جدایی

۷- ترس شدید از محرک یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند تعریف کدام اختلال زیر است؟

۱. هراس ۲. هراس اجتماعی ۳. وسواسی - جبری ۴. هول

۸- دروه افسردگی اساسی باید لااقل چند هفته طول بکشد تا اختلال افسردگی اساسی محسوب گردد؟

۱. ۳ هفته ۲. ۲ هفته ۳. ۵ هفته ۴. ۶ هفته

۹- دوره مشخص از خلق که دائما به شکل غیر طبیعی بالا ، گشاده یا تحریک پذیر می باشد چه نام دارد؟

۱. افسردگی ۲. هیپومانی ۳. شیدایی ۴. خلق ادواری

۱۰- برگرداندن مکرر غذا به دهان بر اساس انقباض معده ای و نشخوار طولانی آن از ویژگی های اصلی کدام اختلال زیر است؟

۱. بی اشتهاهی عصبی ۲. نشخوار ۳. هرزه خواری ۴. پر اشتهاهی عصبی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- اختلال تغذیه ای شیر خوارگی یا اوایل کودکی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. قبل از ۶ سالگی ۲. قبل از ۲ سالگی ۳. قبل از ۴ سالگی ۴. قبل از ۵ سالگی

۱۲- پژوهش های اخیر بر استفاده کدام یک از داروها در درمان بی اشتهایی عصبی تاکید کرده اند؟

۱. ضد اضطراب ۲. ضد افسردگی ۳. محرک ۴. ضد التهاب

۱۳- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود؟

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۱۴- ناركولپسی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. حمله خواب ۲. وقفه تنفسی ۳. خوابگردی ۴. بی خوابی

۱۵- در نخستین هفته های زندگی ، آهنگ بیداری - خواب از توالی چرخه های چند دقیقه ای تشکیل شده است؟

۱. ۹۰ دقیقه ای ۲. ۷۰ دقیقه ای ۳. ۴۵ دقیقه ای ۴. ۲۵ دقیقه ای

۱۶- کدام یک از مراحل خواب مربوط به نمایان شدن دوک ها می باشد؟

۱. چهارم ۲. دوم ۳. پنجم ۴. سوم

۱۷- بنا به نظر برخی متخصصین کدام یک از گزینه های زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس به حساب می آید؟

۱. نارسایی زبان بیانی ۲. نارسایی در محاسبه ۳. نارسایی نوشتن ۴. نارسایی خواندن

۱۸- دیسکلکولی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. نارسایی در محاسبه ۲. نارسایی در نوشتن ۳. نارسایی در خواندن ۴. نارسایی در شنیدن

۱۹- بیشترین وقوع لکنت زبان را در چند سالگی برآورد کرده اند؟

۱. ۳ سالگی ۲. ۷ سالگی ۳. ۲ سالگی ۴. ۵ سالگی

۲۰- بر اساس دیدگاه رفتار گرایی کلاسیک لکنت زیان چگونه رفتاری می باشد؟

۱. ذاتی ۲. اکتسابی ۳. شناختی ۴. بازتابی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۱- وقتی رفتارهای لجبازی و نافرمانی یا اختلال سلوک ظاهر می شود و با ملاک های اختلال سلوک یا اختلال نافرمانی مقابله جویانه مطابقت ندارد تشخیص کدام اختلال داده می شود؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله جویانه
۲. اختلال سلوک
۳. مبتلایان به اختلال کم توجهی - بیش فعالی
۴. اختلال رفتار ایدایی نامعین

۲۲- در کدام دوران اهمیت آموزش رسمی به مفهوم رشد برای اغلب کودکانی که دارای معلولیت های ذهنی یا جسمی بودند مورد توجه بیشتری قرار گرفت؟

۱. رنسانس در اروپا
۲. قرون وسطی
۳. دهه اول قرن بیستم
۴. رنسانس

۲۳- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها کدام مورد زیر است؟

۱. بررسی رویاها
۲. تشخیص
۳. رابطه
۴. آزمون ها

۲۴- کودکان دارای اختلال رشد هماهنگی به دلیل اینکه در بازی کردن و ورزش از سایر کودکان هم سن و سال خود ضعیف تر هستند از افسردگی رنج می برند زیرا؟

۱. این کودکان ژنتیکی از افسردگی رنج می برند.
۲. این کودکان به دلیل اختلال در سیستم عصبی حرکتی دارای افسردگی هستند.
۳. از طرف همسالان خود آنچنان که باید پذیرفته نمی شوند.
۴. به دلیل افسردگی والدین این کودکان نیز دارای افسردگی هستند.

۲۵- اکثر کودکان کنترل مثانه را بین چند سالگی بدست می آورند؟

۱. ۱ تا ۲ سالگی
۲. ۲ تا ۳ سالگی
۳. ۳ تا ۴ سالگی
۴. ۲/۵ تا ۳/۵ سالگی

۲۶- بر اساس DSM - IV - TR تقریباً چند درصد از کودکان ۵ ساله بی اختیاری مدفوع دارند؟

۱. ۵
۲. ۳
۳. ۲
۴. ۱

۲۷- کدام مورد درمانی زیر ، در درمان اختلال در خودماندگی باعث به دست آوردن نمرات برتر هوشی می شود؟

۱. شیمی درمانی
۲. رفتار درمانی
۳. رژیم درمانی
۴. دارو درمانی

۲۸- کدام یک از اختلال های زیر بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود؟

۱. آسپرجر
۲. اوتیسم
۳. رت
۴. از هم پاشیدگی دوران کودکی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۹- مشخصه کدام یک از اختلال های زیر پسرفت بارز در زمینه های متعدد عملکردی پس از ۲ سال رشد ظاهرا طبیعی می باشد؟

۱. رت
۲. از هم پاشیدگی دوران کودکی
۳. آسپرجر
۴. اوتیسم

۳۰- رفتار بدون تفکر مربوط به کدام یک از نشانه های ADHD می باشد؟

۱. بی توجهی
۲. بیش فعالی
۳. عدم تمرکز
۴. تکانش گری

کانال اطلاع رسانه پیام نور - و تویس
بروزترین اخبار پیام نوری
پرسش و پاسخ دانشجویی
کتاب جزوه و نمونه سوالات درسی

برای ورود به کانال روی عکس کلیک کنید ..

1217243 - 94-95-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ج	عادي
۳	الف	عادي
۴	د	عادي
۵	ج	عادي
۶	ب	عادي
۷	الف	عادي
۸	ب	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	د	عادي
۱۴	الف	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ب	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	ج	عادي
۲۹	ب	عادي
۳۰	د	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳، ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- در طبقه بندی جدید اختلالات روانی کدام گزینه مربوط به اختلالات خلقی می باشد؟

۱. عدم کنترل ادرار ۲. انگشت مکیدن ۳. مدرسه گریزی ۴. تیک های عصبی

۲- در نظریه فروید اضطراب در ایجاد بیماری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و به سه نوع تقسیم می شود. عدم تعادل بین عناصر شخصیتی (من-نهاد-من برتر) جزء کدام نوع اضطراب است؟

۱. اضطراب واقعی ۲. اضطراب نروتیک ۳. اضطراب اخلاقی ۴. اضطراب شخصیتی

۳- از کدام گزینه به عنوان فن اصلی در سنجش رفتاری استفاده می شود؟

۱. مصاحبه بالینی ۲. مشاهده رفتار ۳. ارزیابی شخصیت ۴. طبقه بندی اختلالات

۴- شیوه هایی که مصاحبه گر استفاده می کند تا رابطه درمانی را ایجاد نموده و اطلاعات را کسب نماید؟

۱. رابطه ۲. تکنیک ۳. تشخیص ۴. وضعیت روانی

۵- کدام گزینه در همه گیرشناسی نشانه های اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

۱. نشانه های آن در سنین ۱۱-۵ سال مورد توجه قرار می گیرد.
۲. در ۱۵٪ از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.
۳. دخترها بیشتر از پسرها به این اختلال مبتلا می شوند.
۴. کودکان مبتلا در بازی و ورزش قوی تر از همسالان خود هستند.

۶- روش درمانی مناسب برای اختلال رشد هماهنگی می باشد؟

۱. برنامه های توان بخشی ۲. برنامه های آموزش جسمانی
۳. برنامه های آموزش حسی ۴. برنامه های آموزش جسمانی و حسی

۷- شیوع اختلال در زبان بیانی در چه سنینی ۷،۴ در صد بر آورد شده است؟

۱. ۴-۶ سال ۲. ۳-۵ سال ۳. ۲-۴ سال ۴. ۵-۶ سال

۸- نوعی اختلال گفتاری است که مشکل عمده در آن عدم توانایی برقراری ارتباط به شکل آسان، با سرعت مناسب، و بطور پیوسته می باشد؟

۱. اختلال در زبان بیانی ۲. لکنت زبان
۳. اختلال ارتباطی نامشخص ۴. اختلال واج شناسی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۹- نوعی از اختلالات زبانی که کودک در برقراری ارتباط، تعامل اجتماعی دو طرفه، بازی های سمبولیک و خلاق مشکل دارد.

۱. عقب ماندگی ذهنی
۲. اختلال شنوایی
۳. اوتیسم
۴. اختلال بینایی

۱۰- از شایع ترین طبقات اختلالات روانی می باشد، به نحوی که از هر چهار نفر یک نفر واجد ملاک های تشخیصی آن است؟

۱. اختلالات اضطرابی
۲. اختلالات مهارتهای حرکتی
۳. اختلالات ارتباطی
۴. اختلالات خلقی

۱۱- ترس از تنها بودن در اماکن عمومی چه نوع اختلال روانی می باشد؟

۱. اختلال پانیک
۲. اختلال وحشتزدگی
۳. اختلال بازار هراسی
۴. اختلال تور

۱۲- مبتلایان به کدام اختلال اضطرابی، می ترسند که دیگران آنها را به عنوان افرادی مضطرب، ناتوان، آشفته یا گیج قلمداد کنند؟

۱. اختلال هراس اجتماعی
۲. اختلال وسواس اجباری
۳. اختلال اضطراب فراگیر
۴. اختلال پانیک

۱۳- چه چیزی اساس عملکرد ما را تشکیل می دهد و بدون آنها ما انگیزه و توانی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

۱. خلق و هیجان ها
۲. تفکر و هیجان ها
۳. خلق و شخصیت
۴. هیجان ها و اختلالات

۱۴- به حالت ناراحتی فراگیر، نوعی احساس اندوه، غم و دلتنگی گفته می شود. از جهت شیوع آن به سرماخوردگی بیماری های روانی تشبیه شده است؟

۱. افسردگی
۲. شیدایی
۳. اضطراب
۴. اختلالات خلقی

۱۵- هارلسون و همکاران درمان قطعی بی اشتهایی روانی را چه روشی می دانند؟

۱. درمان شناختی-رفتاری
۲. دارو درمانی
۳. روان درمان پویایی
۴. کار کردن با خانواده های مبتلایان

۱۶- نوعی اختلال تغذیه ای است که در خلال نوجوانی بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی بروز می کند؟

۱. اختلال نشخوار
۲. اختلال هرزه خواری
۳. اختلال بی اشتهایی روانی
۴. اختلال پرخوری

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۷- ویژگی مرحله سوم و چهارم خواب می باشد؟

۱. حرکات سریع چشم ها
۲. امواج سریع مغزی
۳. حالتی بین خواب و بیداری
۴. خواب عمیق

۱۸- نوعی از اختلال خواب که در آن تنفس شخص در خواب قطع می شود، این عارضه در اطفال و سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد چاق رایج است؟

۱. آپنه
۲. حمله خواب
۳. خوابگردی
۴. بی خوابی

۱۹- بد ادراری های مکرر همراه با ترس به همراه یادآوری ترس ها در نیمه شب، علایم کدام اختلال خواب است؟

۱. اختلال حمله خواب
۲. اختلال وحشت در خواب
۳. اختلال کابوس
۴. اختلال خواب گردی

۲۰- مشکلات در کدام نارسایی یادگیری، اساسی ترین عامل شکست تحصیلی مدارس می باشد؟

۱. نارسایی خواندن
۲. نارسایی نوشتن
۳. نارسایی ریاضی
۴. نارسایی زبان بیانی

۲۱- کدام گزینه در خصوص کودکان دارای نارسایی ریاضی صحیح می باشد؟

۱. تشخیص نمادهای عددی
۲. دارای هوش بهر، و حافظه کوتاه مدت خوب
۳. مهارت در ادراک فضایی
۴. رعایت توالی مراحل محاسبه

۲۲- آغاز ناگهانی لکنت زبان در چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۲-۳ سالگی
۲. ۲-۷ سالگی
۳. ۵-۷ سالگی
۴. ۶-۱۱ سالگی

۲۳- این اختلال در برگیرنده خطاهایی در تولید آوا می باشد؟

۱. لکنت زبان
۲. نارسایی واج شناسی
۳. نارسایی یادگیری
۴. نارسایی بیانی

۲۴- OCD مربوط به کدام یک از اختلال های زیر می باشد؟

۱. افسردگی
۲. بی اشتهاهی روانی
۳. اضطراب
۴. وسواس

۲۵- اکثر کودکان با بی اختیاری ادراری چه مشکلاتی دارند؟

۱. مشکلات روان شناختی
۲. مشکلات عاطفی
۳. مشکلات عضوی
۴. مشکلات فیزیولوژیکی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۶- از روش های رفتاری برای درمان نارسایی بی اختیاری ادرار است؟

۱. تنبیه
۲. آموزش اتساع مثانه
۳. استفاده از داروهای ضد افسردگی
۴. استفاده از مسهل ها

۲۷- کودکانی که به افراد و محیط واکنش نشان نمی دهند، و در آغوش والدینشان آرام نمی گیرند، دچار کدام اختلال روانی می باشند؟

۱. اختلال اوتیسم
۲. اختلال رت
۳. اختلال اسپرگر
۴. اختلال از هم پاشیدگی

۲۸- کودکان مبتلا به این اختلال تا حدود ۳ سالگی رشد طبیعی دارند؟

۱. رت
۲. اوتیسم
۳. اسپرگر
۴. از هم پاشیدگی کودک

۲۹- مهمترین مشکل توجه در کودکان است و به فرد کمک می کند که محرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد؟

۱. توجه پایدار
۲. توجه انتخابی
۳. بی توجهی
۴. کم توجهی

۳۰- از نشانه های بیش فعالی کودکان مبتلا به ADHD است؟

۱. غالبا زیاد حرف می زنند.
۲. کارهایشان را با بی دقتی انجام می دهند.
۳. غالبا اشیا انجام تکالیف را گم می کنند.
۴. غالبا فراموش کار هستند.

1217243 - 94-95-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليل
1	ج	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	الف	عادي
6	د	عادي
7	الف	عادي
8	ب	عادي
9	ج	عادي
10	الف	عادي
11	ج	عادي
12	الف	عادي
13	الف	عادي
14	الف	عادي
15	د	عادي
16	د	عادي
17	د	عادي
18	الف	عادي
19	ج	عادي
20	الف	عادي
21	ب	عادي
22	ب	عادي
23	ب	عادي
24	د	عادي
25	ب	عادي
26	ب	عادي
27	الف	عادي
28	ج	عادي
29	الف	عادي
30	الف	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳، ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدام یک از افراد زیر بر عقده حقارت معتقد بود .

۱. فروید ۲. آدلر ۳. یونگ ۴. انا فروید

۲- مواردی همچون حافظه ، فرایندهای یادگیری ، فراموشی ، تصمیم گیری و ... از مفاهیم مطرح و اساس این دیدگاه می باشد.

۱. الگوی شناختی ۲. الگوی یادگیری ۳. الگوی رفتاری ۴. الگوی روان کاوی

۳- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام گزینه می باشد.

۱. رابطه ۲. تشخیص ۳. وضعیت روانی ۴. تکنیک

۴- آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. آزمون شنوایی ۲. آزمون روان شناختی ۳. آزمون پیشرفت تحصیلی ۴. آزمون بینایی

۵- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود.

۱. ۲۰ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۱۰ درصد ۴. ۵ درصد

۶- کناره گیری اجتماعی و برخی اختلالات روانی مانند نارسایی توجه ، بیش فعالی ، دیسلکسی و اوتیسم عموماً با این اختلال همراه است .

۱. رشد هماهنگی ۲. رشد زبان بیانی ۳. فراگیر رشد ۴. رشد دریافتی

۷- مهمترین مشکل این کودکان نقص در برقراری ارتباط است .

۱. اوتیسم ۲. لکنت زبان ۳. موتسیم ۴. تنها

۸- ویژگی اصلی این اختلال نقص در تلفظ می باشد.

۱. بیانی ۲. واج شناختی ۳. دریافتی ۴. فراگیر رشد

۹- نقطه اوج لکنت زبان در چند سالگی است.

۱. ۶ ۲. ۵ ۳. ۴-۳ ۴. ۳-۲

۱۰- اگر اگورا فوبیا مربوط به کدام گزینه می باشد.

۱. پانیک ۲. ترس از بلندی ۳. وحشت زدگی ۴. بازار هراسی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- OCD علامت اختصاری کدام اختلال می باشد.

۱. پانیک ۲. وسواسی - جبری ۳. رشد فراگیر ۴. اضطرابی

۱۲- کدام یک از اختلال های زیر ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد

۱. ترس ۲. اضطراب ۳. وسواسی جبری ۴. رت

۱۳- اضطراب نامناسبی است با سن ، شدید، ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین دوری از خانه بروز می کند

۱. هراس ۲. اضطراب جدایی ۳. اضطراب فراگیر ۴. اضطراب اجتماعی

۱۴- بقراط مالیخولیا را به عنوان نوعی افسردگی ناشی از غلبه کدام مزاج ذکر کرده است.

۱. بلغم ۲. سودا ۳. دمو ۴. صفرا

۱۵- کدام یک از اختلالات خلق به جهت شیوع به سرماخوردگی بیماریهای روانی نیز معرفی می شود.

۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. دو قطبی ۴. خلق ادواری

۱۶- منظور از این اصطلاح جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار است.

۱. پراشتهایی عصبی ۲. بی اشتهایی عصبی ۳. نشخواری ۴. هزه خواری

۱۷- این اختلال بر اساس بر انگیزختی ناگهانی، مقاومت نا پذیر و مهار شدنی نسبت به خوردن مشخص می شود و مدت آن محدود می باشد.

۱. بی اشتهایی روانی ۲. اختلال پرخوری ۳. هزه خواری ۴. نشخواری

۱۸- خواب به طور اختصاصی به چند مرحله تقسیم می شود.

۱. ۲ ۲. ۳ ۳. ۴ ۴. ۵

۱۹- اختلالی است که در آن تنفس اشخاص در خواب قطع می شود ، چون نای بسته می شود.

۱. آپنه ۲. حمله خواب ۳. بی خوابی ۴. خوابگردی

۲۰- این نارسایی در ویرایش های قبلی راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM) اختلال در تولید گفتار نام دارد.

۱. لکنت زبان ۲. نارسایی آواشناختی ۳. نارسا خوانی ۴. میان نوشتاری

۲۱- کدام یک از سندرم های زیر بیشتر به سن بالای مادر ارتباط دارد.

۱. داون ۲. X شکننده ۳. تی ساکس ۴. فنیل کتو نور یا

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۲- PKU مربوط به کدام یک از سندرم های زیر می باشد.

۱. داون ۲. X شکننده ۳. فنیل کتو نوریا ۴. تی ساکس

۲۳- کودکانی که از این بیماری رنج می برد معمولا رشد کندی دارند ، نارسایی ذهن داشته و هیکل کوچکی دارند.

۱. کرتینیسیم ۲. اکرومگالی ۳. نانسیسم ۴. ژیگانتیسیم

۲۴- بی اختیاری ادرار باید حداقل چند بار در هفته و به مدت لااقل چند ماه اتفاق بیافتد.

۱. ۱ بار - ۲ ماه ۲. ۲ بار - ۳ ماه ۳. ۳ بار - ۴ ماه ۴. ۲ بار ۵ ماه

۲۵- سن تقویمی برای بی اختیاری مدفوع کدام گزینه می باشد.

۱. ۲ سالگی ۲. ۵ سالگی ۳. ۴ سالگی ۴. ۳ سالگی

۲۶- عبارت است از اختلال در رفتار اجتماعی ، تکلم ، و زبان ، رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی ، ناهنجاریهایی در پاسخ به محیط فیزیکی ، عاطفه نامناسب

۱. موتسیم ۲. اتیستیک ۳. لکنت زبان ۴. بیانی - دریافتی

۲۷- این اختلال بسیار نادر بوده و بیشتر در دختران دیده می شود.

۱. اسپر گر ۲. اوتسیم ۳. رت ۴. اوتسیم

۳. از هم پاشیدگی کودکی

۲۸- درمان این نوع اختلال به عملکرد انطباقی فرد مبتلا بستگی دارد.

۱. اسپر گر ۲. رت ۳. اسکیزوفرنی ۴. افسردگی

۲۹- در اختلال کم توجهی / بیش فعالی صاحب نظران معمولا کدام گزینه را رفتار تفکر در نظر می گیرند

۱. بی توجهی ۲. تکانش گری ۳. بیش فعالی ۴. کمبود توجه

۳۰- این اختلال معمولا به الگوی رفتار ضد اجتماعی غیر قابل کنترل کودک یا نوجوانان اطلاق می شود.

۱. رفتار ایدایی ۲. بیش فعالی ۳. نافرمانی ۴. سلوک

1217243 - 94-95-1

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليلد
1	ب	عادي
2	الف	عادي
3	ب	عادي
4	د	عادي
5	د	عادي
6	ب	عادي
7	الف	عادي
8	ب	عادي
9	ج	عادي
10	د	عادي
11	ب	عادي
12	ج	عادي
13	ب	عادي
14	د	عادي
15	ب	عادي
16	د	عادي
17	ب	عادي
18	د	عادي
19	الف	عادي
20	ب	عادي
21	الف	عادي
22	ج	عادي
23	الف	عادي
24	ب	عادي
25	ج	عادي
26	ب	عادي
27	د	عادي
28	الف	عادي
29	ب	عادي
30	د	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳، ۱۲۱۷۱۸۷ -

۱- کدام محور زیر بیماری فرد را بر اساس راهنمای DSM-IV TR ارزیابی نمی کند؟

۱. تشخیص بیماریها
۲. تشخیص اختلال شخصیت
۳. تشخیص بیماری های خانوادگی
۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۲- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر کدام نوع اضطراب را نشان می دهد؟

۱. اضطراب واقعی
۲. اضطراب نروتیک
۳. اضطراب اخلاقی
۴. اضطراب شناور

۳- از نظر فروید مکانیزم های دفاعی برای چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند؟

۱. کاهش افسردگی
۲. کاهش اضطراب
۳. کاهش دردهای جسمی
۴. کاهش اختلالات

۴- کدام الگوی زیر در خصوص رشد شخصیت بر انسان و فرایندهای ذهنی وی تاکید می کند؟

۱. الگوی یادگیری
۲. الگوی روان پویایی
۳. الگوی زیست شناختی
۴. الگوی شناختی

۵- کدام دارو در حال حاضر بیش از ۶٪ داروهای تجویز شده برای کودکان را تشکیل می دهد؟

۱. بنزدیرین
۲. فلوکسیدین
۳. ریتالین
۴. ایمی پرامین

۶- به چه دلیل مصاحبه را می توان مهم ترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی دانست؟

۱. وجود عناصری مانند مشاهده و صحبت کردن و گوش دادن
۲. وجود عناصری مانند مشاهده و پرسش و گوش دادن
۳. وجود عناصری مانند دیدن و گوش دادن
۴. وجود عناصری مانند ارزیابی و صحبت کردن و گوش دادن

۷- کدام مورد زیر در سنجش رفتاری به عنوان فن اصلی استفاده می شود؟

۱. تکنیک
۲. آزمون
۳. رابطه
۴. مشاهده

۸- اساس تشخیص بسیاری از اختلالات شخصیت، اختلالات رشدی و اختلالات هوشی کدام مورد زیر است؟

۱. مصاحبه
۲. تکنیک
۳. رابطه
۴. آزمون ها

۹- آزمون بندر گشتالت در کدام دسته از آزمون ها قرار می گیرد؟

۱. شنیداری
۲. بینایی
۳. پیشرفت تحصیلی
۴. حرکتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۰- کدام موارد زیر در کودکانی که دچار اختلال رشد هماهنگی هستند بیشتر دیده می شود؟

۱. بیش فعالی - اوتیسم
۲. رت - اوتیسم
۳. بیش فعالی - ناتوانی ذهنی
۴. اختلالات تکلم و زبان - اختلالات بیش فعالی

۱۱- اختلال در زبان بیانی از نوع اکتسابی در نتیجه کدام مورد زیر می تواند بوجود آید؟

۱. بیماری اوتیسم
۲. بیماری عصبی
۳. بیماری وراثتی
۴. بیماری بیش فعالی

۱۲- مهمترین مشکل کودکان اتیسم کدام مورد زیر است؟

۱. اختلال در بینایی
۲. اختلال در حرکت
۳. نقص در برقراری ارتباط
۴. اختلال شنیداری

۱۳- کدام مورد زیر با صدمه مغزی در ارتباط است؟

۱. آپراکسی
۲. چاقی
۳. افسردگی
۴. اضطراب

۱۴- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد و در جمعیت کلی به ترتیب حدود چند درصد برآورد شده است؟

۱. ۵ درصد و ۲ درصد
۲. ۳ درصد و ۶ درصد
۳. ۵ درصد و ۱ درصد
۴. ۴ درصد و ۳ درصد

۱۵- از نظر کدام دیدگاه شرایطی مانند مجاورت می تواند منجر به یادگیری علائم اضطراب در ارگانیزم موجود زنده شود؟

۱. شناختی
۲. زیستی
۳. رفتارگرایی
۴. روان پویایی

۱۶- کدام مورد زیر در بروز اختلال وسواس فکری و عملی دخیل هستند؟

۱. کژتنظیمی آدرنالین
۲. کژتنظیمی تیروکسین
۳. کژتنظیمی سروتونین
۴. کژتنظیمی دوپامین

۱۷- مدت دوره مانیا چقدر است؟

۱. لااقل یک ماه
۲. کمتر از دو ماه
۳. لااقل یک هفته
۴. کمتر از یک ماه و نیم

۱۸- کدام اختلال در بین اختلالات روانپزشکی بالاترین شیوع طول عمر (حدود ۱۷ درصد) را دارد؟

۱. اختلالات اضطرابی
۲. اختلالات خلقی
۳. اختلالات شخصیت
۴. عقب ماندگی ذهنی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۹- در کدام اختلال زیر اهمیت نوع تعامل بین شیرخوار و مراقب را نشان می دهد؟

۱. اوتیسم کودکی
۲. اختلالات تغذیه ای در دوره شیرخواری
۳. رت
۴. MR

۲۰- کدام اختلال زیر گذرا است و معمولاً چند ماه طول می کشد؟

۱. اوتیسم
۲. هرزه خواری
۳. رت
۴. MR

۲۱- کدام دسته از اختلالات زیر مشکلات خواب دارند؟

۱. افسردگی
۲. اوتیسم
۳. رت
۴. نشخواری

۲۲- در کدام اختلال زیر تنفس اشخاص در خواب قطع می شود؟

۱. کابوس
۲. خوابگردی
۳. آپنه
۴. نارکولپسی

۲۳- ویژگی هایی مانند جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص مربوط به کدام اختلال زیر است؟

۱. اوتیسم
۲. نارسایی خواندن
۳. نارسایی نوشتن
۴. نارسایی در محاسبه

۲۴- نارسایی زبان بیانی از کدام سنین قابل تشخیص است؟

۱. ۵ تا ۷ سالگی
۲. ۴ تا ۶ سالگی
۳. ۳ تا ۴ سالگی
۴. ۲ تا ۳ سالگی

۲۵- کدام بیماری زیر یک نوع اختلال متابولیکی محسوب می شود؟

۱. اوتیسم
۲. نشخواری
۳. آپنه
۴. تائید سس

۲۶- نشانه هایی مانند چشمان کج، بینی کوتاه، پلک های افتاده از نشانگان کدام مورد زیر است؟

۱. فنیل کتونوریا
۲. کرتینیسم
۳. جنین الکلی
۴. تائید ساکس

۲۷- در درمان اختلال بی اختیاری دفع کدام داروهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند؟

۱. داروهای ضد اضطراب
۲. داروهای ضد افسردگی
۳. ریتالین
۴. دیازپام

۲۸- پژواک گویی تاخیری در کدام اختلال زیر دیده می شود؟

۱. تائید ساکس
۲. اوتیسم
۳. فنیل کتونوریا
۴. آپنه

۲۹- رژیم غذایی فاقد گلوتهین و کازئین برای درمان کدام اختلال استفاده می شود؟

۱. نارکولپسی
۲. آپنه
۳. کرتینیسم
۴. در خود ماندگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۰- رایج ترین دارویی که برای کودکان دارای اختلال کم توجهی/ بیش فعالی مورد استفاده قرار می گیرد کدام است؟

۱. فلوکسیدین ۲. ریتالین ۳. دیازپام ۴. آلپرازولام

SoalatPNU.ir
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۷۵۰ تومان
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

1217243 - 93-94-3

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
1	ج	عادي
2	ب	عادي
3	ب	عادي
4	د	عادي
5	ج	عادي
6	ب	عادي
7	د	عادي
8	د	عادي
9	ب	عادي
10	د	عادي
11	ب	عادي
12	ج	عادي
13	الف	عادي
14	ج	عادي
15	ج	عادي
16	ج	عادي
17	ج	عادي
18	ب	عادي
19	ب	عادي
20	ب	عادي
21	الف	عادي
22	ج	عادي
23	ب	عادي
24	د	عادي
25	د	عادي
26	ج	عادي
27	ب	عادي
28	ب	عادي
29	د	عادي
30	ب	عادي

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳، ۱۲۱۷۱۸۷

- ۱- کدامیک از دیدگاه های زیر در خصوص بهنجاری به وجود یا عدم وجود علایم بیماری تاکید کرده است؟
 ۱. دیدگاه مرضی
 ۲. آرمان گر
 ۳. فرهنگی
 ۴. آماری
- ۲- کدامیک از رفتارهای زیر جزء اختلالات عاداتی محسوب می شود؟
 ۱. عدم کنترل ادرار
 ۲. مدرسه گریزی
 ۳. استفاده از الکل
 ۴. خرابکاری
- ۳- در کدامیک از الگوهای اختلال های روانی کودکان، برانسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید شده و مواردی چون حافظه، یادگیری و فراموشی اساس این دیدگاه می باشد؟
 ۱. یادگیری
 ۲. شناختی
 ۳. روان پویایی
 ۴. زیست شناختی
- ۴- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
 ۱. رابطه
 ۲. تشخیص
 ۳. تکنیک
 ۴. وضعیت روانی
- ۵- تعداد و میزان انجام یک رفتار بیانگر کدام اصل می باشد؟
 ۱. شایستگی سنی
 ۲. شدت یک رفتار
 ۳. فراوانی یک رفتار
 ۴. تداوم یک رفتار
- ۶- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدامیک از رفتارهای مرضی زیر به عنوان خصایص " برون ساخت " تعریف شده اند؟
 ۱. تهوع
 ۲. تمایل به کناره گیری
 ۳. فوبی
 ۴. دزدی
- ۷- چنانچه کودکی در حین اجرای فعالیت های روزمره که نیاز به هماهنگی حرکتی دارد به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار مقدار بهره هوشی و سن تقویمی خود عمل نماید نشاندهنده چه نوع اختلالی می باشد؟
 ۱. ارتباطی
 ۲. رشد هماهنگی
 ۳. روانی
 ۴. یادگیری
- ۸- تاخیر های زبانی در چه سنی بسیار رایج است؟
 ۱. کودکان زیر ۳ سال
 ۲. آغاز دبستان
 ۳. کودکان ۴ تا ۶ سال
 ۴. ۱۰ سال به بالا
- ۹- افرادی که دارای اشکال اساسی در درک و بیان زبان هستند دارای کدام اختلال ارتباطی می باشند؟
 ۱. زبان بیانی
 ۲. دریافتی - بیانی
 ۳. واج شناختی
 ۴. لکنت زبان
- ۱۰- عدم توانایی در برقراری ارتباط به شکل آسان و با سرعت مناسب و به طور پیوسته از مشخصات کدام اختلال می باشد؟
 ۱. لکنت زبان
 ۲. اختلال واج شناختی
 ۳. اختلال در زبان بیانی
 ۴. اختلال آمیخته در زبان دریافتی بیانی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۱۱- کدامیک از اختلال های زیر بیشترین فراوانی را در سطح کل جمعیت در سال های اخیر نشان داده است ؟

۱. مهارتی ۲. ارتباطی ۳. اضطرابی ۴. کمبود توجه

۱۲- "احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است" تعریف کدام گزینه زیرمی باشد ؟

۱. نگرانی ۲. ترس ۳. اضطراب ۴. وسواس

۱۳- خانمی که به علت ترس از فضای بسته سوار آسانسور نمی شود دچار چه نوع اختلالی می باشد ؟

۱. وسواس فکری ۲. ترس ۳. هراس ۴. اضطراب

۱۴- برای درمان اختلال جدایی کدامیک از موارد زیر رایج تر و موثرتر است ؟

۱. حساسیت زدایی تدریجی ۲. دارو درمانی ۳. درمان شناختی ۴. درمان ترکیبی

۱۵- در کدامیک از نظریه های زیر افسردگی را به تجربه رویداد های غیر قابل کنترل مربوط می کنند ؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. زیستی ۴. درماندگی آموخته شده

۱۶- جذب مواد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجاری یعنی بالاتر از سنی که در خلال آن کودک هر چیز را به نشانه نخستین وسیله شناخت جهان به دهان می برد بیانگر کدامیک از اختلال های تغذیه می باشد ؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. بی اشتهایی روانی

۱۷- کدامیک از اختلال های تغذیه ای زیر در کودکان بین ۳ ماه تا ۱ سال و بزرگسالان دچار کم توانی ذهنی شایع تر است ؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. خوردن ۴. پرخوری

۱۸- در شیر خواران برای پایین آمدن کدام اختلال تغذیه به او اجازه می دهند تا هر قدر دلشان می خواهد غذا بخورند ؟

۱. هرزه خواری ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. بی اشتهایی

۱۹- کامل ترین نوع درمان بی اشتهایی روانی از دیدگاه پژوهشگران چیست ؟

۱. دارو درمانی ۲. درمان شناختی - رفتاری ۳. روان درمانی پویایی ۴. خانواده درمانی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰: زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰: سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک
رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۲۰- کدامیک از داروهای زیر در کاهش علائم اختلال پر خوری تاثیر گذراند؟

۱. فنوباریتال ۲. منو امین اکسیداز ۳. ریتالین ۴. هالوپریدول

۲۱- کدام مرحله از خواب را خواب عمیق می نامند؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. سوم و چهارم

۲۲- خوابگردی غالباً در کدام مراحل از خواب اتفاق می افتد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. سوم و چهارم

۲۳- زمانی که فرد به جای طی کردن ۴ مرحله اولیه خواب یک راست وارد مرحله خواب حرکت سریع چشم می شود دچار کدام اختلال خواب می باشد؟

۱. خوابگردی ۲. کابوس و وحشت در خواب ۳. حمله خواب ۴. وقفه تنفسی در خواب

۲۴- مقاومت در برابر به بستر رفتن در فاصله چه سن به اوج خود می رسد؟

۱. ۶ ماهگی تا ۱ سالگی ۲. ۱ تا ۲ سالگی ۳. ۲ تا ۳ سالگی ۴. ۳ تا ۴ سالگی

۲۵- بیشتر کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری در کدام زمینه با مشکل اساسی رو به رو هستند؟

۱. خواندن ۲. نوشتن ۳. واج شناختی ۴. ریاضی

۲۶- کودکی که به جای "سیب زمینی" کلمه "تیب زمینی" را به کار می برد دچار کدام نارسایی یادگیری می باشد؟

۱. خواندن ۲. زبان بیانی ۳. آواشناختی ۴. لکنت زبان

۲۷- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سنی بر آورده شده است؟

۱. ۲ سالگی ۲. ۳ سالگی ۳. ۴ سالگی ۴. ۵ سالگی

۲۸- اگر فردی دارای IQ بین ۳۵ تا ۵۵ باشد در کدام دسته از نارسایی های ذهنی قرار می گیرد؟

۱. خفیف ۲. شدید ۳. متوسط ۴. عمیق

۲۹- کدامیک از اختلالات زیر با گنجاندن ید در نمک های خوراکی قابل درمان می باشد؟

۱. کرتینیسم ۲. فنل کتونوریا ۳. سوخت و سازی ۴. سندرم X شکننده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۰- بی اختیاری ادراری ثانویه غالباً با چه عواملی همراه می باشد ؟

۱. زیست شناختی
۲. روان شناختی
۳. اجتماعی
۴. ژنتیک

۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزء اختلال فراگیر مربوط به رشد در کودکان نمی باشد ؟

۱. آسپرگر
۲. رت
۳. اتیسم
۴. سلوک

۳۲- کدامیک از روش های درمان در خود ماندگی ، با اهداف ایجاد آرامش ، افزایش توجه ، کمک به تولید گفتار هدفمند و تقویت حرکات انجام می شود ؟

۱. حیوان درمانی
۲. انزجار درمانی
۳. موسیقی درمانی
۴. ماساژ درمانی

۳۳- کدامیک از اختلال های زیر تنها در دختران شناسایی شده است ؟

۱. آسپرگر
۲. لکنت زبان
۳. رت
۴. در خود ماندگی

۳۴- کدامیک از اختلالات زیر در مردان شایع تر از زنان می باشد ؟

۱. رت
۲. آسپرگر
۳. در خود ماندگی
۴. اختلال فراگیر رشد نامعین

۳۵- این اختلال شامل فعالیت ها ، علایق و رفتار های قالبی و تخریبی فراگیر و شدید در تعامل اجتماعی یا مهارت های ارتباطی است ؟

۱. در خود ماندگی کودک
۲. آسپرگر
۳. فراگیر رشد نامعین
۴. سلوک

۳۶- کدامیک از اختلالات زیر رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روان شناختی کودکان می باشد که در پسران شیوع بیشتری دارد ؟

۱. در خود ماندگی کودک
۲. کم توجهی
۳. سلوک
۴. نافرمانی مقابله جویانه

۳۷- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های اصلی اختلال کمبود توجه نمی باشد ؟

۱. بی توجهی
۲. بیش فعالی
۳. تکانش گری
۴. افسردگی

۳۸- رایج ترین داروی محرک جهت کودک بیش فعال کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

۱. ریتالین
۲. هالوپریدول
۳. فنو باربیتال
۴. منو آمین اکسیداز ۱۳

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/کد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۳

۳۹- در کدامیک از اختلالات زیر کودک مرتب اعمال خشونت بار شدید انجام می دهد و ممکن است سبب آسیب جسمی به خود یا دیگران شود و اغلب حقوق دیگران را زیر پا می گذارد؟

۲. سلوک

۱. نافرمانی مقابله جویانه

۴. آسپرگر

۳. کم توجهی

۴۰- از کوره در رفتن، خشمگین شدن و رنجیده خاطر و زود رنج بودن از ویژگی کدامیک از اختلال های زیر می باشد؟

۲. رت

۱. آسپرگر

۴. نافرمانی مقابله جویانه

۳. بیش فعال

1217243 - 93-94-2

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعيت کليد
1	الف	عادي
2	الف	عادي
3	ب	عادي
4	ب	عادي
5	ج	عادي
6	د	عادي
7	ب	عادي
8	الف	عادي
9	ب	عادي
10	الف	عادي
11	ج	عادي
12	ج	عادي
13	ج	عادي
14	الف	عادي
15	د	عادي
16	الف	عادي
17	ب	عادي
18	ج	عادي
19	د	عادي
20	ب	عادي
21	د	عادي
22	د	عادي
23	ج	عادي
24	ب	عادي
25	الف	عادي
26	ج	عادي
27	د	عادي
28	ج	عادي
29	الف	عادي
30	ب	عادي
31	د	عادي
32	د	عادي
33	ج	عادي
34	ب	عادي
35	ج	عادي
36	ب	عادي
37	د	عادي
38	الف	عادي
39	ب	عادي
40	د	عادي

ویژه‌ی #پیام_نوریه‌ها
برای عضویت بزن روی عکس



@LOTUS_PNU