АКВАЦИПРО-Д

Режим дозирования

Бактериальные воспалительные заболевания глаза и его придатков	
Взрослым и детям старше 1 года	По 1-2 капли закапывают в конъюнктивальный мешок каждые 4-6 ч, при тяжелой инфекции по 2 капли каждый час
При кератитах	2 – 4 недели
При острых бактериальных конъюнктивитах, блефаритах	от 5 до 14 дней
Для профилактики воспалительных заболеваний после хирургических вмешательств с перфорацией глазного яблока	от 5 дней до 1 месяца

Бактериальные воспалительные заболевания уха	
Взрослым и детям старше 6 месяцев	По 4 капли в наружный слуховой проход пораженного уха 3 раза в день, в течение 7 дней
Не следует менять положение головы в течение 60 сек для полного проникновения препарата в слуховой проход	
Перед применением ушных капель следует провести санацию наружного слухового прохода (промыть и осушить наружный слуховой проход)	

Противопоказания к применению

- Повышенная чувствительность к действующему веществу препарата или к каким-либо вспомогательным ингредиентам, входящим в состав данной лекарственной формы препарата;
- Герпетический кератит и другие вирусные поражения роговицы и конъюнктивы;
- Туберкулез глаз;
- Грибковые поражения глаз;
- Вирусные инфекции слухового прохода;
- Детский возраст до 1 года при лечении бактериальных воспалительных заболеваний глаза и его придатков;
- Детский возраст до 6 месяцев при лечении бактериальных воспалительных заболеваний уха.

Побочное действие

- Со стороны органа зрения: роговичные инфильтраты, жжение, покраснение, зуд глаз, сухость глаза, отек век, гиперемия конъюнктивы.
- Со стороны органа слуха: дискомфорт и боль в ухе, зуд в ухе, заложенность уха

Особые указания

- Пациентам, использующим контактные линзы, следует снимать их перед инстилляцией препарата и надевать вновь лишь спустя 20 мин, поскольку консервант, содержащийся в препарате, может оказать неблагоприятное воздействие на ткани глаза

Производитель:«East African (India) Overseas», Индия

АКВАЦИПРО-Д



Капли глазные и ушные

Состав:

1 мл раствора содержит:

Ципрофлоксацин – 3.3 мг

Дексаметазон – 1 мг



Фармакологическое действие

Ципрофлоксацин (спектр антибактериального действия)

- Грамотрицательные микроорганизмы: Esherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Morganella morganii, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Haemophilus influenzae, Pasteurella multocida, Pseudomonas spp., Gardnerella spp., Legionella pneumophila, Neisseria spp., Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Brucella spp., Chlamidia spp.
- грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocitogenes.

Дексаметазон

- При местном применении терапевтическая активность дексаметазона обусловлена противовоспалительным, противоаллергическим и антипролиферативным действием. Он уменьшает проницаемость и пролиферацию капилляров, локальную экссудацию.

Показания к применению

Бактериальные воспалительные заболевания глаза и его придатков:


острый и подострый конъюнктивит

кератит

блефарит

профилактика и лечение инфекционных осложнений после ранений глаза и при операциях на глазном яблоке


склерит и эписклерит

передний увеит

Бактериальные воспалительные заболевания уха:

острый средний отит при шунте барабанной перепонки

острый наружный отит