Ангисем 100 мл

Показания



Неврология

Нарушения мозгового кровообращения (последствия церебрального атеросклероза, такие как нарушение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти), ишемический инсульт, ДЭ, последствия инсульта

Сосудистая хирургия

Окклюзионная болезнь периферических артерий атеросклеротического или диабетического генеза (например, перемежающаяся хромота, диабетическая ангиопатия); Болезнь Рейно.Трофические нарушения (например, трофические язвы голеней, гангрена)





Офтальмология

Нарушения кровообращения в сетчатой и сосудистой оболочке глаза

ЛОР заболевания

Отосклероз, дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха и снижения слуха



Эндокринология

Диабетическая ангиопатия и полинейропатия

Способ применения и дозирование

Доза и способ назначения определяются врачом в зависимости от тяжести нарушений кровообращения и индивидуальной переносимости лекарственного средства	Лекарственное средство вводят внутривенно капельно 1-2 раза в сутки по 100-200 мг Максимально до 400 мг в сутки
Рекомендуется вводить со скоростью не более 100 мг/час	У лиц пожилого возраста целесообразно уменьшить дозу и контролировать артериальное давление, особенно при одновременном назначении с гипотензивными и сосудорасширяющими лекарственными средствами
Лечение может быть начато малыми дозами у пациентов с низким АД, а также у пациентов, находящихся в группе риска ввиду возможного снижения АД (пациенты с тяжелой формой ИБС или с гемодинамически значимыми стенозами сосудов головного мозга). В этих случаях доза может быть увеличена только постепенно	

Побочное действие

- Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение
- Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, снижение АД
- Со стороны кожи и подкожных тканей: кожный зуд, кожная сыпь, эритема

Противопоказания к применению

- массивное кровотечение (риск усиления кровотечения);
- обширное кровоизлияние в сетчатую оболочку глаза (риск усиления кровотечения);
- кровоизлияние в головной мозг;
- острый инфаркт миокарда.

Производитель: «СП ООО Samarkand England Eco-Medical» SEEM Innovation. Health of the nation.

Ангисем 100 мл

Действующее вещество (МНН): пентоксифиллин

Форма выпуска: раствор для инфузий по 100, 250 мл

Состав:
1 мл раствора содержит:
активное вещество: пентоксифиллина – 0,5 мг.

Фармакотерапевтическая группа:
Периферические вазодилататоры.

Фармакологическое действие

- Снижение вязкости крови
- Уменьшение агрегации форменных элементов крови, с преимущественным действием на эритроциты
- Уменьшение уровня фибриногена плазмы
- Увеличение эластичности эритроцитов
- Блокада действия воспалительных цитокинов и выработки ряда гуморальных факторов, способствующих повреждению сосудистой стенки в условиях ишемии
- Вазодилятация

Ангисем увеличивает местный и общий мозговой кровоток

Пентоксифиллин 1200 мг/сутки увеличивает местный и общий мозговой кровоток



Важные особенности действия:
Нет синдрома обкарадывания

Максимальный эффект в зоне ишемии

Особенности антиагрегантного действия Ангисем