Показания

- Непереносимость или нежелание принимать пероральные препараты железа;
- Плохое усвоение железа (операции на желудочно-кишечном тракте, воспалительные заболевания кишечника);
- Железодефицитная анемия, когда есть необходимость быстрого восполнения железа для стимулирования эритропоэза
- После-операционные или послеродовые периоды

Железодефицитные состояния (в том числе железодефицитная и острая постгеморрагическая анемия) у пациентов при необходимости быстрого восполнения железа;

Способ применения и дозы

Бронікс - вводится только внутривенно (медленно струйно или капельно), а также в венозный участок диализной системы, и не предназначен для внутримышечного введения.

Перед введением первой терапевтической дозы, необходимо ввести тест-дозу

Если в течение периода наблюдения возникли явления непереносимости, введение препарата следует немедленно прекратить.

Стандартная дозировка

Взрослым и пожилым больным	5-10 мл Бронікс (100-200 мг железа) 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина
Дети старше 3 лет	Не более 0,15 мл препарата Бронікс (3 мг железа) на кг массы тела 1–3 раза в неделю в зависимости от уровня гемоглобина.

Бронікс можно смешивать в одном шприце только со стерильным физиологическим раствором!

Противопоказания
- анемия не связанная с дефицитом железа;
- перегрузки железом (гемосидероз, гемохроматоз) или нарушение процесса его утилизации;

С осторожностью
- больным бронхиальной астмой, экземой, поливалентной аллергией, аллергическими реакциями на другие парентеральные препараты железа .

ALWIN DMD PHARMACEUTICALS *Производитель: “Alwin DMD Pharmaceutical” ,Индия*

Бронікс

БРОНИКС

Действующее вещество (МНН): железа (III) гидроксид сахарозный комплекс

Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения

Состав

Каждая ампула препарата содержит:

активное вещество: концентрат железа (III) гидроксида сахарозного комплекса (эквивалентного элементарному железу) – 100 мг.

Ампулы по 5 мл

Преимущества Бронікса

1. *Эффективен - быстро метаболизируется и становится доступным для эритропоэза*
2. *Безопасен - большая часть железа из Бронікса откладывается в ретикуло- эндотелиальной системе (РЭС), а не в паренхиме печени.*
3. *Стабильность комплекса железа в Брониксе,обеспечивает отсутствие риска аллергических реакций.*
4. *Доставляет железо в составе комплекса из сыворотки крови к эндогенным железосвязывающим белкам.*

Физико – химические свойства

- Бронікс - железо(III)-гидроксид сахарозный комплекс, состоящий из полинуклеарного комплекса железа, аналогичного ферритину.
- В Брониксе (в отличие от ферритина) белок – лиганд, апоферритин, замещен углеводным компонентом (полисахарид). Это замещение снижает иммуногенность молекулы (и риск аллергических реакций).

Схема железо(III)-гидроксид сахарозного комплекса

- Ядра полинуклеарного железо(III) – гидроксидного комплекса снаружи окружены большим количеством нековалентно связанных молекул сахарозы.
- Стабильность комплекса идеально соответствует физиологическим процессам утилизации железа и гарантирует отсутствие высвобождения свободных ионов железа в физиологических условиях. Поэтому местные реакции и другие нежелательные явления возникают редко (Geisser с соавт., 1992).

Молекулы гидроксида железа

Молекулы сахарозы

$[(Na_{2,3}[Fe_5O_8(OH)_{1,3}(OH_2)_{2,7}][C_{12}H_{22}O_{11}]_{13,05}) + 0,9\ NaOH + 0,1\ NaCl]_n$

$n = 43/5$