ДОУНАРИН

Показания к применению

АКУШЕРСТВО
- Преэклампсия
- Эклампсия
- Задержка развития плода

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
- Атеро - склероз сосудов нижних и верхних конечностей
- Диабетическая ангиопатия

НЕВРОЛОГИЯ
- Дисцир - куляторная энцефалопатия
- ОНМК

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ
- Гипоксические состояния
- Астения после перенесенных инфекционных заболеваний
- Подготовка к оперативным вмешатель - ствам

ГЕПАТОЛОГИЯ
- Острые и хронические гепатиты различной этиологии

КАРДИОЛОГИЯ
- ИБС (ОИМ,ПИКС)
- Кардиомиопатия
- Атеросклероз
- Артериальная гипертензия
- ХСН

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат вводят внутривенно капельно со скоростью 10 капель в минуту в течение первых 10–15 мин, затем скорость введения можно увеличить до 30 капель в минуту.
Суточная доза — 100 мл

Взаимодействие	Противопоказания	Побочные действия
Глюкокортикоиды спос обствуют накоплению в тканях (кроме печени), другие анаболики усиливают эффект.	Гиперчувствительность, гиперхлоремический а цидоз, применение калийсберегающих диуретиков	Болевые ощущения в эпигастральной области, диспептическ ие явления, мышечная слабость.

ДОУНАРИН



Действующие вещества (МНН):

Аргинина гидрохлорид, левокарнитин

Лекарственная форма:

раствор для инфузий 100 мл

Преимущества Доунарина

1. Улучшает состояние жизненно важных органов
2. Поддерживает способность организма преодолевать высокие нагрузки
3. Активирует иммунную систему
4. Повышает стрессоустойчивость, стимулирует деятельность мозга и нервной системы
5. Ускоряет восстановление организма после нагрузок, заболеваний и операций

Доунарин, назначенный в первые часы пребывания в стационаре пациентам с ОКС, позволяет дополнить эффекты базисной терапии:

Улучшить электрофизио-логические свойства миокарда



Уменьшить проявления эндотелиальной дисфункции



Предупредить проявления временных нарушений **ЭКГ**

Роль L – карнитина в организме

L-карнитин обеспечивает перенос жирных кислот через мембраны митохондрии для расщепления (окисления).
Расщепление сопровождается выделением энергии, которая частично рассеивается в форме тепла, частично - запасается.
От количества L-карнитина в организме зависит скорость утилизации жиров.