Зотокам

Фармакологические свойства

Тазобактам – пенициллинат сульфон, структурно похож на сульбактам. Тазобактам ингибирует все бета-лактамазы, которые может ингибировать клавулановая кислота и, кроме того, он обладает определенной активностью в отношении индуцированных ферментов бактерий Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens и Pseudomonas aeruginosa.

Области применения



Приготовление раствора для введения

Для внутримышечного введения	растворяют содержимое флакона 1000 мг (в пересчете на цефтриаксон) в 3,5 мл 1% раствора лидокаина или 5 мл 0,5% раствора новокаина. Если есть противопоказания к препаратам новокаин и лидокаин, Зотокам растворяют в 3-5 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 3-5 мл воды для инъекций. Вводят глубоко в мышцу.
Для внутривенного струйного введения	растворяют содержимое флакона с дозировкой 1,0 г (в пересчете на цефтриаксон) – в 10 мл воды для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Вводят медленно в течение 2-5 минут.
Для внутривенного капельного введения	1 - 2 флакона препарата Зотокам разводят в 50-200 мл 0,9% раствора натрия хлорида или в 5-10% растворе глюкозы. Продолжительность в/в инфузии – не менее 30 мин.

Противопоказания
- Гиперчувствительность к другим β -лактамным антибиотикам в анамнезе.
- Индивидуальная непереносимость.
- Печёночная недостаточность.

Побочные действия
- Реакции гиперчувствительности: сыпь, крапивница.
- Редко - диспепсические явления

Производитель:«ZEISS PHARMACEUTICALS PVT.LTD» AQUARIUS

Зотокам

Зотокам– препарат выбора для лечения и профилактики гнойно-септических осложнений

Действующее вещество (МНН): цефтриаксон, тазобактам.
Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для инъекций.
Состав:
В одном флаконе содержится:
активные вещества:
цефтриаксон натрия эквивалентный цефтриаксону – 1000 мг, тазобактам натрия эквивалентный тазобактаму – 125 мг.

Преимущества Зотокама

- Широкий спектр действия
- Обладает бактерицидным действием, in vitro подавляет рост большинства Грам+ и Грам- микроорганизмов.
- Присутствие тазобактама в Зотокаме усиливает и расширяет антимикробный спектр цефтриаксона, включая бактерии, продуцирующие бета-лактамазы, которые обычно нечувствительные к нему и другим бета-лактамным антибиотикам.
- Удобство применения 1 раз в сутки
- Высокое проникновение в ткани
- Препарат выбора для профилактики и лечения гнойно-септических осложнений
- Высокая безопасность, хорошая переносимость, в том числе у детей, можно назначать беременным со 2-го триместра.

Чувствительность различных возбудителей к антибиотикам



Спектр действия Зотокама

Грамотрицательные бактерии
- E.coli,
- Haemophilus influenzae
- Klebsiella spp. (Kl. pneumoniae)
- Moraxella spp.
- Morganella morganii
- Neisseria gonorrhoeae
- Neisseria meningitidis
- Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella spp. (в том числе, S. typhi)



Грамположительные бактерии
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу)
- Streptococcus agalactiae
- Streptococcus bovis
- Streptococcus pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Streptococcus viridans.

Зотокам

Показания

- Сепсис и бактериальная септицемия
- Заболевания кожи и мягких тканей
- Неосложненная гонорея
- Пиелит, острый и хронический пиелонефрит, цистит, простатит, эпидидимит
- Перитонит, панкреатит
- Бактериальный менингит
- Острый и хронический бронхит,пневмония, внебольничная пневмония,острый бактериальный отит)
- Профилактика после-операционных инфекционных осложнений
- Инфекции у больных с ослабленным иммунитетом
- Гинекологические инфекции

Способ применения и дозирование

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет	1000/125 мг-2000/250 мг 1 раз в сутки	При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых обладают только умеренной чувствительностью к цефтриаксону, суточную дозу можно увеличивать до 4000/500 мг
Дети в возрасте 2 — 12 лет	20–80 мг/кг массы тела (в пересчете на цефтриаксон) 1 раз в сутки	
Для профилактики послеоперационных инфекций в хирургии	в зависимости от степени опасности заражения вводить разовую дозу 1–2 г (цефтриаксона) за 30–90 мин до начала операции	При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное (но отдельное) введение Зотокама и одного из 5-нитроимидазолов, например, орнидазола.
Менингит	При бактериальном менингите у детей в возрасте 2 — 12 лет лечение начинают с дозы 100 мг/кг (по цефтриаксону)	Продолжительность лечения в среднем 7 дней
Обычно общая продолжительность лечения составляет 4–14 дней		

Терапевтическая эффективность при инфекциях МВП

Зотокам максимальная элиминация возбудителя



Зотокам –по 1,125 г в сутки 4 – 7 дней

Острая гонорея – 1,125 г однократно
Осложненная гонорея 1,125 г 3 – 5 дней