КАРДИСЕМ

Показания

Для устранения дефицита калия и магния в качестве вспомогательного средства при:

- Ишемической болезни сердца
- Остром инфаркте миокарда
- Нарушениях ритма сердца
- Хронической недостаточности кровообращения
- Сахарный диабет
- Диарея, рвота, анорексия, усиленная потливость, лихорадка

Способ применения и дозы

- Кардисем вводят внутривенно - капельно.
- В/в введение следует проводить медленно. Быстрое в/в введение препарата противопоказано из-за риска гиперкалиемии и гипермагниемии с возникновением угрожающих жизни пациента аритмий.
- Доза и длительность введения препарата определяется индивидуально в зависимости от показаний к применению и степени гипокалиемии.
- Взрослым, как правило, назначают в/в капельно по 250 - 500 мл раствора 1-2 раза в сутки со скоростью 15-30 капель в минуту.
- За неделю до кардиохирургического вмешательства, в течение недели после операции вводят в/в капельно со скоростью 20-25 капель в минуту по 250-500 мл в сутки ежедневно

Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату (в том числе к сорбитолу), острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гипермагниемия, недостаточность коры надпочечников, шок, атриовентрикулярная блокада I-III степени, олигурия - анурия, острый метаболический ацидоз, дегидратация

Побочное действие
При соблюдении рекомендованной скорости капельного введения побочных явлений не наблюдалось.

Производитель: «СП ООО Samarkand England Eco-Medical» SEEM

КАРДИСЕМ



Действующие вещества (МНН):
калия и магния аспарагинат.

Форма выпуска:
раствор для инфузий 100мл во флаконах

Состав:

1 мл раствора содержит:
Активные вещества:
калия аспарагината – 10,98 мг
магния аспарагината – 8,05 мг
Вспомогательные вещества:
сорбит - 20 мг, вода для инъекций – до 1 мл

Фармакологическое действие ионов калия

Стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина и др	Обладают отрицательным хроно и батмотропным действием,в высоких дозах – отрицательное ино- и дромотропное действие
В малых дозах ионы калия расширяют коронарные артерии, а в больших - суживают	Оказывают также умеренное диуретическое действие
Аспарагинат - способствует проникновению ионов магния и калия во внутриклеточное пространство, стимулирует межклеточный синтез фосфатов	

Фармакологическое действие ионов магния

Уменьшают возбудимость нейронов, замедляют нервно-мышечную передачу	Участвуют во многих ферментативных реакциях, в балансе электролитов
Ограничивает и предупреждает чрезмерное высвобождение катехоламина при стрессе, уменьшает возможный липолиз и высвобождение свободных жирных кислот	Сорбит в маленьких дозах оказывает реологическое действие
Оказывает антиишемическое действие на ткани миокарда: снижает напряжение сокращения и частоту сердечного ритма приводя к снижению потребности миокарда в кислороде, вызывает вазодилатацию, в том числе и коронарных сосудов	

Влияние на САД и ДАД

Метаанализ 15 рандомизированных исследований



Нормализация уровня Калия значительно снижает САД и ДАД
В большей степени при исходно повышенном АД