Неодексон

Акушерство

- Преэклампсия
- Эклампсия
- Задержка развития плода

Сосудистая хирургия

- Атеросклероз сосудов нижних конечностей
- Диабетическая ангиопатия

Гепатология

- Острые и хронические гепатиты различной этиологии

Способ применения и дозирование

- Раствор вводится внутривенно капельно при начальной скорости 10 капель/мин.
- Через 20 минут от начала введения скорость увеличивают до 30 капель/мин.
- Суточная дозировка препарата составляет 4,2 грамма, то есть 100 мл.
- Курс лечения составляет 2 недели.

Неодексон

- Гипоам-монимическое действие
- Улучшает утилизацию глюкозы
- Стимулятор образования оксида азота
- Защищает миокард при ишемии
- Антиоксидант

Побочные действия

Внутривенное введение может вызывать ощущение жжения и жара в теле, головную боль, локальное воспаление вены в месте инъекции, в отдельных случаях возможно возникновение аллергических реакций, как правило, в виде крапивницы.

Побочные действия

Индивидуальная непереносимость препарата – реакции гиперчувствительности, тяжелая печеночная и почечная недостаточность, гиперхлоремический ацидоз, детский возраст до трех лет.

Производитель: «СП ООО Samarkand England Eco-Medical» SEEM Innovation. Health of the nation.

Неодексон

Действующее вещество (МНН): L-аргинин гидрохлорид

Лекарственная форма: раствор для инфузий

Состав:

1 мл раствора содержит:

Активное вещество: L- аргинина гидрохлорид

(эквивалентно аргинину) – 42,0 мг;

Образование и механизм действия NO



Показания

Кардиология

- ИБС
- Артериальная гипертония
- Состояние после перенесенного ОИМ
- Кардиомиопатии
- ХСН

Пульмонология

- ХОБЛ
- Хронический бронхит
- КОВИД
- Пневмонии

Неврология

- Состояние после перенесенного ОНМК
- Дисциркуляторная энцефалопатия