Показания

Кардиология



В комплексной терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда);
Хроническая сердечная недостаточность;
Дисгормональная кардиомиопатия

Офтальмология

Гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии;
Тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;
Ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая)

Неврология

В комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабжения головного мозга (инсульт и цереброваскулярная недостаточность)

Общая терапия

Сниженная работоспособность;
Умственное и физическое перенапряжение (в т.ч. у спортсменов)
Период восстановления после перенесенных заболеваний

Наркология

Синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).

Способ применения и дозирование

Ввиду возможного развития возбуждающего эффекта, применяют в первой половине дня. В/м, в/в и парабульбарно

При ИБС (инфаркт миокарда)	**в/в струйно по 0.5-1.0 г/сут**
При ИБС (стабильная стенокардия) и дисгормональной кардиомиопатии	в/в струйно по 0.5-1.0 г/сут или в/м по 0.5 г 1-2 раза/сут
В комплексной терапии ОНМК	по 0.5 г 1 раз/сут в/в в течение 10 дней
При ХНМК (дисциркуляторной энцефалопатии)	по 0.5 г в/м или в/в 1 раз/сут в течение 10 дней
При гемофтальме и кровоизлияниях в сетчатку различной этиологии, ретинопатии **(диабетическая, гипертоническая)**	по 0.05 г (0.5 мл препарата РАНГОР) парабульбарно в течение 10 дней
При умственном и физическом перенапряжении	по 0.5 г в/м или в/в 1 раз/сут. Курс лечения: 10-14 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Редко - аллергические реакции (покраснение, высыпания, зуд, отек), а также диспепсические явления, тахикардия, изменения артериального давления, возбуждение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока и внутричерепных опухолях);

- Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
- Беременность;
- Период лактации

С осторожностью: заболевания печени и/или почек

5 мл

Производитель: **СП ООО «REKA-MED FARM»**

РАНГОР

Действующее вещество (МНН): Мельдоний
Лекарственная форма: раствор для инъекций 100 мг/мл.
Ампулы по 5 мл

- **Повышение работоспособности**
- **Выносливости**
- **Уменьшение симптомов перенапряжения**

РАНГОР

Гипогликемическое действие

- Усиливает утилизацию глюкозы
- Позволяет уменьшить дозы сахароснижающих препаратов

Сосудистое и Реологическое действие

- Перераспределение кровотока мозга в пользу очагов ишемии
- Устранение ангиоспазма
- Уменьшение агрегации тромбоцитов

Ноотропное действие

- Улучшает когнитивные функции (память,внимание,мышление)
- Тонизирующее действие на ЦНС
- Быстрый регресс очаговой симптоматики

Механизм действия мельдония

5 мл