Дозировка

Неосложненные интраабдоминальные инфекции.Инфекции малого таза. Инфекции почек и МВП	Взрослым по 1,5 г с интервалом 12 часов
Осложненные формы абдоминальных хирургических инфекций.	Взрослым по 3 г с интервалом 12 часов
Инфекции нижних отделов дыхательных путей, инфекции ЛОР – органов.	Взрослым по 1,5 г с интервалом 12 часов
Инфекции костей и суставов. Инфекции кожи и мягких тканей.	Взрослым по 1,5 г с интервалом 12 часов
Инфекции на фоне нейтропении и др.иммунодефицитных состояний. Менингиты,септицемия.	Взрослым по 3 г с интервалом 12 часов

Правила приготовления раствора

Для в/в капельных инфузий	• Разводят содержимое 1 флакона в начальном объеме 6.7 мл одного из следующих инфузионных растворов: 5% раствор декстрозы, 0.9% раствор хлорида натрия или стерильная вода для инъекций, а затем разбавляют до 20 - 50 мл начальным раствором. • Препарат вводят инфузионно на протяжении 15-60 минут.
Для в/в инъекции	• содержимое каждого флакона следует растворить в 6.7 мл в одном из растворителей, как указано выше, и вводить в течение минимум 3 мин.
Для в/м введения	• можно использовать 2% раствор лидокаина, однако его нельзя применять для первоначального растворения, учитывая их несовместимость. Совместимости можно добиться путем двухэтапного приготовления раствора – первоначально порошок растворяют в воде для инъекций, а затем разводят 2% раствором лидокаина гидрохлорида. Суммарный объем растворителя составляет 6.7 мл. (2 мл лидокаина + 4,7 мл воды для инъекций)

Противопоказания
- Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата и/или пенициллинам, цефалоспоринам.

Побочные действия
- Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, рвота.
- Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, подергивания мышц.
- Аллергические реакции: макулопапулезная сыпь, зуд, лихорадка

Производитель: “Synapse pharmatech” Synapse PHARMATECH

Синаперазон С



Синаперазон С

Состав и форма выпуска:
Порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе, № 1.Цефоперазон натрий- 1000 мг. Сульбактам натрий- 500мг.

Синаперазон С

- Ингибиторозащищенный цефалоспорин 3 – го поколения
- Высокая активность против нозокомиальной инфекции
- Наличие сульбактама потенцирует эффект цефоперазона против грамотрицательных бактерий до 60%
- Сохранение активности и клинической эффективности против грамотрицательных бактерий, устойчивых к цефалоспоринам III поколения.
- Появление клинически значимой активности против анаэробных бактерий и возможности применения при смешанных аэробно-анаэробных инфекциях в монотерапии без добавления антианаэробных препаратов
- Высокая безопасность и хорошая переносимость больными

Фармакологическое действие

Цефаперазон – цефалоспорин III поколения:
- Обладает бактерицидным действием
- Нарушает синтез пептидогликана (опорный полимер клеточной стенки бактерий)

Сульбактам – ингибитор β – лактамазы:
- Увеличивает бактерицидную активность цефаперазона, так как обладает синергизмом.
- Микроорганизмы устойчивые к цефаперазону становятся чувствительными к нему,при совместном применении с сульбактамом

Сульбактам

- Сульбактам - потенцирует эффект цефаперазона против грам(-) бактерий, увеличивая его с 5% до 40 - 60% [I].

Механизм действия



Синаперазон С

Показания

Неосложненная хирургическая инфекция

Осложненные хирургические инфекции



Синаперазон С

Инфекции ЛОР- органов

Синаперазон – способ применения дети

- 20 – 40 мг/кг/ сут (в пересчете на цефоперазон)
- Вводят каждые 6-12 часов равномерно распределёнными дозами.
- В тяжёлых случаях доза повышается до 80 мг/кг массы тела в сутки(в пересчете на цефоперазон). И распределена на 2 - 4 равные дозы.
- Грудным детям 1-й недели жизни препарат нужно вводить каждые 12 часов.
- Максимальная суточная доза для грудных детей не более 80 мг/кг/ сут.

Для детей до 3-х лет:

- Используют воду для инъекций или физраствор