Способ применения и дозирование

- **Рекомендуемые дневные разовые дозы, в зависимости от тяжести заболевания, составляют от 1,4 мл/кг до 3,2 мл/кг готового к употреблению раствора.**
- **Максимально допустимая разовая доза препарата составляет 250 мг/кг массы тела.**

Способ применения и дозирование

При лечении шоковых состояний, ишемии и острого инфаркта миокарда	суточная доза препарата составляет 20-30 г, продолжительность введения – от 2 до 7 дней
Пациентам, при процедуре экстракорпорального кровообращения (ЭКК)	суточная доза составляет 10 г препарата в течение 5-7 дней
Пациентам в тяжелом состоянии, находящимся на парентеральном питании	суточная доза составляет 10-20 г препарата в течение 3-7 дней введения.
При трансфузионной терапии (многократном переливании крови)	суточная доза составляет 10-20 г препарата в течение 3-7 дней введения.

Побочные действия

- Очень редко: гиперфосфатемия (при несбалансированных дозах); аллергические реакции разной степени тяжести, вплоть до анафилактического шока.
- Возможны: покраснение кожных покровов, учащенное сердцебиение.

Противопоказания

- гиперфосфатемия
- почечная недостаточность
- детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
- гиперхлоремический ацидоз;
- аллергические реакции в анамнезе
- беременность и период лактации (ввиду отсутствия данных по безопасности и эффективности);
- применение калий сберегающих диуретиков, а также спиронолактона;

Производитель: «TEMUR MED FARM»

СОФИН

СОФИН

Лекарственная форма: раствор для инфузий
Состав:
активное вещество: D-фруктозо-1,6-дифосфат натриевой соли гидрата – 5,0 г;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит - 0,01 г, вода для инъекций - до 100 мл.

Механизм действия

Эффекты воздействия Софина на миокард на клеточном уровне:

- Увеличивает соотношение величин внутриклеточного и внеклеточного pH (противодействуя процессу ацидоза и улучшая сократимость миокарда);
- Увеличивает соотношение содержания внутриклеточного и внеклеточного K+(противодействуя процессу деполяризации и увеличивая частоту сокращений);
- Усиливает активность фосфофруктокиназы, синтез АТФ как в ишемизированном, так и в миокарде с нормальным кровоснабжением;
- Подавляет образование свободных радикалов кислорода (в основном за счет предотвращения распада АТФ) в кардиомицитах.

Софин в кардиологии

- Кардиоциркул яторный эффект и улучшение гемодинамики
- Увеличение сердечного индекса и ударного объема крови
- Повышает переносимость физических нагрузок и эффективность работы сердца
- Ограничивает зону некроза при окклюзии коронарных артерий
- Улучшает сократительную функцию миокарда при хронической сердечной недостаточности
- Поддерживает запасы АТФ и креатинфосфата при ишемии миокарда

Спортивная медицина

Для восстановления энергии после интенсивной нагрузки

Профилактика развития синдрома физического перенапряжения, улучшение адаптации к экстремальным физическим нагрузкам

Неотложная медицина

Шоковые состояния при травмах, кровотечениях, инсультах и тяжелых инфекциях

Ишемия и нарушения метаболизма

Ишемия различной локализации (в том числе тяжелая ишемия нижних конечностей)

Диабетическая ангиопатия

Гипофосфатемия, вызванная нарушениями метаболизма (алкогольная зависимость, истощение, дыхательная недостаточность, снижение оксигенации крови, передозировка нейролептиками).

Пульмонология

хроническая обструктивная болезнь легких

интерстициальная пневмония

идиопатическая легочная гипертензия,

хроническая постэмболическая легочная гипертензия

Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга
Атеросклероз периферических сосудов, в том числе с проявлениями перемежающейся хромоты

Острый и хронический гепатит различной этиологии

СОФИН

ПОКАЗАНИЯ

Кардиология

ишемическая болезнь сердца

артериальная гипертензия

состояния после перенесенных острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения

миокардиопатия

гиперхолестеринемия

хроническая сердечная недостаточность

стенокардия



Хирургия

массивная трансфузия и при экстракорпоральном кровообращении при операциях на сердце, парентеральном питании, операциях на печени, тяжелых ожогах

при хирургических вмешательствах для профилактики осложнений, таких как гипотензия или снижение оксигенации тканей, при пересадке органов (почек, печени)

Неврология

ОНМК